2019

SE PRÉPARER
À PASSER
UN CONCOURS

JE RÉUSSIS MON CONCOURS !

Je prépare

1 ÉRE ÉDITION

www.ispits.net

QCM EN SOINS INFIRMIERS

(Option: Infirmier Polyvalent)

Concours de recrutement
Examens d'aptitude professionnelle
CHUs

DE 2008 À 2019

ELOUALI ALAMI MOULAY Aicha
Infirmière polyvalente
Hôpital De Proximte Romani

« Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n’abandonnent jamais. »

Feu-Hassan II

Sommaire :

INTRODUCTION 01

2019 ..... 02 à 19

1) Concours de recrutement (Session du 3 Mars 2019) 02

2018 ..... 20 à 109

1) EAP (Session de 16 Decembre 2018) ..... 20 à 55
   - 2ème Épreuve 20
   - 1ère Épreuve 38
2) Concours de recrutement (Session de 10 Juin 2018) 56
3) Concours de recrutement (Session de 18 Mars 2018) 74
4) Concours de recrutement CHU Mohamed VI - Oujda (Session de 09 Decembre 2018) 92

2017 ..... 110 à 145

1) EAP - 2ème Grade (Session de 17 Septembre 2017) 110
2) EAP - 1er Grade (Session de 17 Septembre 2017) 128

2016 ..... 146 à 155

1) Concours de recrutement (Session de 25 Septembre 2016) 146

2015 ..... 156 à 173

1) Concours de recrutement (Session de 08 Janvier 2015) 156

2014 ..... 174 à 203

1) Concours de recrutement (Session de 31 Août 2014) 174
2) Concours de recrutement CHU Mohamed VI - Oujda (Session de 27 Avril 2014) 190

2013 ..... 204 à 217

1) Concours de recrutement (Session de 24 Mars 2013) 204

2012 ..... 218 à 229

1) Concours de recrutement (Session de 03 Mars 2012) 218

2011 ..... 230 à 245

1) Concours de recrutement (Session de 12 Février 2011) 230

2010 ..... **246 à 253**

1) **Concours de recrutement (Session de 13 Fevrier 2010)** **246**

2009 ..... **254 à 273**

1) **Concours de recrutement (Session de 21 Novembre 2009)** **254**
2) **Concours de recrutement (Session de 15 Fevrier 2009)** **264**

2008 ..... **274 à 319**

1) **Concours de recrutement (Session de 21 Juin 2008)** **274**
2) **Concours de recrutement CHU Ibn Rochd - Casa (Session de 18 Mai 2008)** **284**
3) **Concours de recrutement CHU Mohamed VI - Marrakech (Session de 2008)** **310**

Introduction

Ce document est destiné aux lauréats de l'institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, particulièrement aux infirmiers(es) polyvalents(es) qui sont qualifiés à passer le concours de recrutement de la fonction publique (Etat – CHUs) ou examen d'aptitude professionnelle (EAP), ce document donne la possibilité à son usager d'accéder à une panoplie d'anciens concours qui lui sont proposés au fur et à mesure.

"**Je prépare**" comporte une série de documents permettront, sans aucun doute, à ses usagers d'acquérir une méthode appropriée de préparation afin d'obtenir des résultats favorables à partir d'une série de QCM.

"**Je prépare**" QCM en soins infirmiers (option : infirmier polyvalent) constitue une base de rappels à travers des questionnaires à choix multiples et examens corrigés en conformité aux nouveaux changements induits par le ministère de la santé et au programme d'études des professions infirmières et techniques de la santé.

Son objectif est de :

- Préparer efficacement les lauréats aux concours de recrutement ;
- Faciliter l'accès à de nombreux QCM en soins infirmiers.

"**Je prépare**" se veut un moyen d'accompagner les lauréats dans leur parcours de préparation aux concours de recrutement pour des résultats favorables, alors n'hésitez pas à le recourir régulièrement.

2019

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 3

(دورة 03 مارس 2019) www.ispits.net

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La démarche de soins correspond à :

A) Un processus dynamique de résolution de problème centré sur la personne soignée ;	☐
B) Instrument de travail qui se traduit par un plan de soin ;	☐
C) Une suite ordonnée d'opération finalisée, une prestation de soins individualisés ;	☐
D) Un outil qui assure les transmissions infirmières.	☐

2) Dans la planification des soins, il faut tenir compte de :

A) Besoins fondamentaux insatisfaits ;	☐
B) Signes cliniques ;	☐
C) Diagnostic infirmier ;	☐
D) Diagnostic médical.	☐

3) Les étapes de la démarche de soins infirmier sont essentiellement :

A) Recueil et analyse de données ;	☐
B) Formulation des objectifs de soins ;	☐
C) Mise en œuvre des actions appropriées ;	☐
D) Evaluation des actions en vue des réajustements nécessaires.	☐

4) Le dossier infirmier permet de :

A) Diagnostiquer les problèmes du patient : Diagnostic Infirmier ;	☐
B) Identifier les besoins du patient ;	☐
C) Planifier les soins ;	☐
D) Contrôler la présence du personnel infirmier.	☐

5) Les principes fondamentaux de l'éthique professionnelle en soins infirmiers sont :

A) Le respect de l'autonomie ;	☐
B) La bienfaisance ;	☐
C) La malfaisance ;	☐
D) La justice.	☐

6) Durant l'année 2009, pour une population de 50.000 habitants, il y a eu 70 nouveaux cas de méningite à pneumocoque. Parmi les victimes, deux décès sont directement attributions à la maladie :

A) La prévalence de la maladie est de 14/10.000 habitants en 2009 ;	☐
B) L'incidence est de 14/10.000 habitants en 2009 ;	☐
C) La mortalité par méningite à pneumocoque est de 2,8% ;	☐
D) La létalité par méningite à pneumocoque est de 2,8%.	☐

7) L'atteinte brusque et massive de la population par une maladie épidémique correspond à :

A) Une pandémie ;	☐
B) Une épidémie ;	☐
C) Une endémie ;	☐
D) Un cas sporadique.	☐

8) La numération formule sanguine (NFS) renseigne sur :

A) Les maladies cardiaques ;	☐
B) Les maladies du sang ;	☐
C) Les maladies hépatiques ;	☐
D) Les maladies infectieuses.	☐

9) Devant une diarrhée avec selles glaireuses et sanglantes le médecin suspecte une amibiase colique. Quels examens permettent de faire le diagnostic :

A) L'hémoculture ;	☐
B) La coproculture des selles ;	☐
C) L'examen parasitologique des selles ;	☐
D) La sérologie de l'amibiase.	☐

10) La voie de transmission de la bilharziose est :

A) La transmission par contact direct entre la personne infectée et l'hôte réceptif ;	☐
B) La transmission hydrique ;	☐
C) La transmission par la voie aérienne ;	☐
D) La transmission par un vecteur animal.	☐

11) L'homme développe le kyste hydatique par :

A) La consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) La consommation d'une eau contaminée par 1 œuf de parasite ;	☐
C) L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans déchets du chien ;	☐
D) La consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite.	☐

12) Pour le lavage simple des mains, le savonnage doit se faire pendant :

A) 10 à 20 secondes ;	☐
B) 20 à 30 secondes ;	☐
C) 5 minutes ;	☐
D) 10 minutes ;	☐

13) Les fonctions excrétrices du rein sont :

A) Eliminer des déchets ;	☐
B) Eliminer les liquides en excès ;	☐
C) Réguler la pression artérielle grâce à la rénine ;	☐
D) Régler les taux d'électrolytes.	☐

14) La colonne vertébrale ou rachis est composé de :

A) 7 vertèbres cervicales ;	☐
B) 11 vertèbres dorsales ;	☐
C) 6 vertèbres lombaires ;	☐
D) Sacrum.	☐

15) Les éléments de surveillance chez un patient porteur d'une sonde vésicale sont :

A) La perméabilité de la sonde ;	☐
B) L'aspect des urines ;	☐
C) La température du corps ;	☐
D) Le pouls et la tension artérielle.	☐

16) Les paramètres cliniques à surveiller pendant la transfusion sanguine :

A) La tension artérielle ;	☐
B) La diurèse ;	☐
C) L'état de conscience ;	☐
D) La fréquence respiratoire.	☐

17) Le nombre de gouttes correspondant à 1 ml de soluté pour calculer le débit d'une perfusion :

A) 8 gouttes ;	☐
B) 10 gouttes ;	☐
C) 20 gouttes ;	☐
D) 30 gouttes.	☐

18) On parle d'une diarrhée persistante lorsqu'elle dure :

A) 7 jours et plus ;	☐
B) 10 jours et plus ;	☐
C) 14 jours et plus ;	☐
D) 15 jours et plus.	☐

19) Les paramètres qui doivent être surveillés dans les premières heures d'une réhydratation chez un nourrisson présentant une déshydratation avec collapsus sont :

A) La modification du pli cutané ;	☐
B) La fréquence des selles ;	☐
C) La tension artérielle ;	☐
D) La diurèse.	☐

20) Quels vaccins donnez-vous à un enfant âgé de 10 mois qui est amené à la consultation pour une toux sans fièvre et qui n'a jamais être vacciné :

A) BCG, poli 1 et penta 1 ;	☐
B) Polio 0 et HB1 ;	☐
C) RR ;	☐
D) Ne pas vacciner et attendre la guérison de l'enfant.	☐

21) La vaccination par le BCG et contre indiquée en cas de :

A) Diabète ;	☐
B) Eczéma en période suivante ;	☐
C) SIDA maladie ;	☐
D) Réaction cutanée tuberculinique positive.	☐

22) Les gestes à éviter face à une hémorragie avec corps étranges :

A) Retirer le corps étranges ;	☐
B) Faire une compression locale directe suffisante pour arrêter le saignement ;	☐
C) Faire une compression au niveau d'un axe artériel principal en amont de la lésion ;	☐
D) Allonger la victime en position dorsale.	☐

23) Les précautions à prendre pour la conservation de l'eau javellisée :

A) Mettre l'eau de javel dans un flacon opaque ;	☐
B) Ne pas conserver l'eau javellisée diluée plus d'une semaine ;	☐
C) Ne pas mélanger l'eau javellisée avec d'autre détergents ;	☐
D) Toute les propositions sont valides.	☐

24) Conduite à tenir devant une victime inconsciente et ne respire pas :

A) Assurer la liberté des voies respiratoires ;	☐
B) Position latérale de sécurité ;	☐
C) Respiration artificielle ;	☐
D) Massage en cas d'arrêt cardiaque associé à une ventilation artificielle.	☐

25) La position latérale de sécurité est une :

A) Position dans laquelle le blessé est installé sur le côté droit ou gauche selon son état ;	☐
B) Position dans laquelle le blessé est installé sur le côté droit selon son état ;	☐
C) Position dans laquelle le blessé est installé sur le côté gauche selon son état ;	☐
D) Position dans laquelle le blessé est installé sur le dos selon son état.	☐

26) Les dangers d'un apport excessif de liquide par voie veineuse (perfusion) comprennent :

A) Trouble électrolytiques ;	☐
B) Œdème aigu pulmonaire ;	☐
C) Trouble de conscience ;	☐
D) Insuffisance rénale.	☐

27) Quelles sont les contre-indications formelles à la pose d'une perfusion veineuse périphérique ?

A) Bras hémiplégique ;	☐
B) Curage axillaire ganglionnaire ;	☐
C) Patient porteur d'une prothèse orthopédique ou vasculaire :	☐
D) Lésions infectieuse ou suintantes en regard des sites de ponction.	☐

28) Pour un patient groupe sanguin A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous utilisez :

A) Le plasma frais congelé AB ;	☐
B) Le plasma frais congelé O ;	☐
C) Indifféremment AB ou O ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste ;	☐

29) Dans le cas des pathologies cardiovasculaires les diurétiques servent à :

A) Augmenter la diurèse ;	☐
B) Fondre les œdèmes ;	☐
C) Diminuer la rétention de sel et de l'eau ;	☐
D) Augmenter la tension artérielle.	☐

30) Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, vomissements, diarrhée profuse, … accident transfusionnel s'agit-t-il ? :

A) Un accident de surcharge ;	☐
B) Un accident de contamination ;	☐
C) Un accident de transfusion ;	☐
D) Un accident d'hémolyse.	☐

31) Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte :

A) Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 10 gouttes ;	☐
B) Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 15 gouttes ;	☐
C) Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 20 gouttes ;	☐
D) Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 30 gouttes.	☐

32) Selon la règle des neuf de Wallace les surfaces des brulures sont estimées à :

A) 10% tête et cou ;	☐
B) 9% pour le membre supérieur ;	☐
C) 27% pour les faces antérieurs et postérieurs du tronc ;	☐
D) 9% pour les organes génitaux.	☐

33) En cas de blessure ou contact direct avec un liquide biologique sur peau lésée (accident d'exposition au sang), il faut :

A) Terminer l'activité en cours ;	☐
B) Nettoyer immédiatement la zone cutanée lésée à l'eau et au savon ;	☐
C) Désinfecter au Dakin stabilisé la zone cutané concernée ;	☐
D) Désinfecter avec l'alcool à 70° avec un temps de contact d'au moins 5 min.	☐

34) Devant un accident transfusionnel, l'infirmier doit :

A) Arrêter la transfusion ;	☐
B) Retirer la voie veineuse et appeler le médecin ;	☐
C) Poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion ;	☐
D) Se référer à la procédure d'hémovigilance.	☐

35) Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie ?

A) Tremblement ;	☐
B) Sueur ;	☐
C) Troubles de comportement ;	☐
D) Haleine acétonique.	☐

36) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) Après la toilette des organes génitaux externes ;	☐
C) En recueillant les urines du premier jet ;	☐
D) Après avoir éliminé le premier jet contaminant.	☐

37) Les affections de longue durée comprennent :

A) Les néphropathies chroniques graves et syndrome néphrotique primitif ;	☐
B) Traumatismes crâniens invalidants avec séquelles ;	☐
C) Le diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ;	☐
D) Les accidents vasculaires cérébraux invalidants ;	☐

38) Un malade se présente au service des urgences avec un état général altéré : fièvre d'installation brutale, céphalées, vomissements en jet, photophobie : raideur de la nuque s'agit-il d'une :

A) Appendicite ;	☐
B) Intoxication alimentaire ;	☐
C) Péritonite ;	☐
D) Méningite ;	☐

39) Le programme de surveillance de la grossesse et de l'accouchement (PSGA) préconise 4 consultations prénatales :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

40) Une infection nosocomiale peut se décaler chez le malade hospitalier 48 heures après sa sortie de l'hôpital :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 3

(دورة 03 مارس 2019) www.ispits.net

Correction proposée :

1) La démarche de soins correspond à :

A) Un processus dynamique de résolution de problème centré sur la personne soignée ;	☒
B) Instrument de travail qui se traduit par un plan de soin ;	☒
C) Une suite ordonnée d'opération finalisée, une prestation de soins individualisés ;	☒
D) Un outil qui assure les transmissions infirmières.	☒

2) Dans la planification des soins, il faut tenir compte de :

A) Besoins fondamentaux insatisfaits ;	☒
B) Signes cliniques ;	☒
C) Diagnostic infirmier ;	☒
D) Diagnostic médical.	☐

3) Les étapes de la démarche de soins infirmier sont essentiellement :

A) Recueil et analyse de données ;	☒
B) Formulation des objectifs de soins ;	☒
C) Mise en œuvre des actions appropriées ;	☒
D) Evaluation des actions en vue des réajustements nécessaires.	☒

4) Le dossier infirmier permet de :

A) Diagnostiquer les problèmes du patient : Diagnostic Infirmier ;	☒
B) Identifier les besoins du patient ;	☒
C) Planifier les soins ;	☒
D) Contrôler la présence du personnel infirmier.	☐

5) Les principes fondamentaux de l'éthique professionnelle en soins infirmiers sont :

A) Le respect de l'autonomie ;	☒
B) La bienfaisance ;	☒
C) La malfaisance ;	☐
D) La justice.	☒

6) Durant l'année 2009, pour une population de 50.000 habitants, il y a eu 70 nouveaux cas de méningite à pneumocoque. Parmi les victimes, deux décès sont directement attributions à la maladie :

A) La prévalence de la maladie est de 14/10.000 habitants en 2009 ;	☐
B) L'incidence est de 14/10.000 habitants en 2009 ;	☒
C) La mortalité par méningite à pneumocoque est de 2,8% ;	☐
D) La létalité par méningite à pneumocoque est de 2,8%.	☒

7) L'atteinte brusque et massive de la population par une maladie épidémique correspond à :

A) Une pandémie ;	☐
B) Une épidémie ;	☒
C) Une endémie ;	☐
D) Un cas sporadique.	☐

8) La numération formule sanguine (NFS) renseigne sur :

A) Les maladies cardiaques ;	☐
B) Les maladies du sang ;	☒
C) Les maladies hépatiques ;	☐
D) Les maladies infectieuses.	☐

9) Devant une diarrhée avec selles glaireuses et sanglantes le médecin suspecte une amibiase colique. Quels examens permettent de faire le diagnostic :

A) L'hémoculture ;	☐
B) La coproculture des selles ;	☐
C) L'examen parasitologique des selles ;	☒
D) La sérologie de l'amibiase.	☒

10) La voie de transmission de la bilharziose est :

A) La transmission par contact direct entre la personne infectée et l'hôte réceptif ;	☐
B) **La transmission hydrique ;**	☒
C) La transmission par la voie aérienne ;	☐
D) La transmission par un vecteur animal.	☐

11) L'homme développe le kyste hydatique par :

A) La consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) **La consommation d'une eau contaminée par 1 œuf de parasite ;**	☒
C) **L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans déchets du chien ;**	☒
D) La consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite.	☐

12) Pour le lavage simple des mains, le savonnage doit se faire pendant :

A) 10 à 20 secondes ;	☐
B) **20 à 30 secondes ;**	☒
C) 5 minutes ;	☐
D) 10 minutes ;	☐

13) Les fonctions excrétrices du rein sont :

A) **Eliminer des déchets ;**	☒
B) **Eliminer les liquides en excès ;**	☒
C) Réguler la pression artérielle grâce à la rénine ;	☐
D) **Régler les taux d'électrolytes.**	☒

14) La colonne vertébrale ou rachis est composé de :

A) **7 vertèbres cervicales ;**	☒
B) 11 vertèbres dorsales ;	☐
C) 6 vertèbres lombaires ;	☐
D) **Sacrum.**	☒

15) Les éléments de surveillance chez un patient porteur d'une sonde vésicale sont :

A) La perméabilité de la sonde ;	☒
B) L'aspect des urines ;	☒
C) La température du corps ;	☒
D) Le pouls et la tension artérielle.	☐

16) Les paramètres cliniques à surveiller pendant la transfusion sanguine :

A) La tension artérielle ;	☒
B) La diurèse ;	☐
C) L'état de conscience ;	☒
D) La fréquence respiratoire.	☒

17) Le nombre de gouttes correspondant à 1 ml de soluté pour calculer le débit d'une perfusion :

A) 8 gouttes ;	☐
B) 10 gouttes ;	☐
C) 20 gouttes ;	☒
D) 30 gouttes.	☐

18) On parle d'une diarrhée persistante lorsqu'elle dure :

A) 7 jours et plus ;	☐
B) 10 jours et plus ;	☐
C) 14 jours et plus ;	☒
D) 15 jours et plus.	☐

19) Les paramètres qui doivent être surveillés dans les premières heures d'une réhydratation chez un nourrisson présentant une déshydratation avec collapsus sont :

A) La modification du pli cutané ;	☒
B) La fréquence des selles ;	☐
C) La tension artérielle ;	☒
D) La diurèse.	☐

20) Quels vaccins donnez-vous à un enfant âgé de 10 mois qui est amené à la consultation pour une toux sans fièvre et qui n'a jamais être vacciné :

A) **BCG, poli 1 et penta 1 ;**	☒
B) Polio 0 et HB1 ;	☐
C) **RR ;**	☒
D) Ne pas vacciner et attendre la guérison de l'enfant.	☐

21) La vaccination par le BCG et contre indiquée en cas de :

A) Diabète ;	☐
B) Eczéma en période suivante ;	☐
C) **SIDA maladie ;**	☒
D) **Réaction cutanée tuberculinique positive.**	☒

22) Les gestes à éviter face à une hémorragie avec corps étranges :

A) **Retirer le corps étranges ;**	☒
B) **Faire une compression locale directe suffisante pour arrêter le saignement ;**	☒
C) Faire une compression au niveau d'un axe artériel principal en amont de la lésion ;	☐
D) **Allonger la victime en position dorsale.**	☒

23) Les précautions à prendre pour la conservation de l'eau javellisée :

A) Mettre l'eau de javel dans un flacon opaque ;	☐
B) Ne pas conserver l'eau javellisée diluée plus d'une semaine ;	☐
C) Ne pas mélanger l'eau javellisée avec d'autre détergents ;	☐
D) **Toute les propositions sont valides.**	☒

24) Conduite à tenir devant une victime inconsciente et ne respire pas :

A) **Assurer la liberté des voies respiratoires ;**	☒
B) Position latérale de sécurité ;	☐
C) **Respiration artificielle ;**	☒
D) **Massage en cas d'arrêt cardiaque associé à une ventilation artificielle.**	☒

25) La position latérale de sécurité est une :

A) **Position dans laquelle le blessé est installé sur le côté droit ou gauche selon son état ;**	☒
B) Position dans laquelle le blessé est installé sur le côté droit selon son état ;	☐
C) Position dans laquelle le blessé est installé sur le côté gauche selon son état ;	☐
D) Position dans laquelle le blessé est installé sur le dos selon son état.	☐

26) Les dangers d'un apport excessif de liquide par voie veineuse (perfusion) comprennent :

A) **Trouble électrolytiques ;**	☒
B) **Œdème aigu pulmonaire ;**	☒
C) Trouble de conscience ;	☐
D) Insuffisance rénale.	☐

27) Quelles sont les contre-indications formelles à la pose d'une perfusion veineuse périphérique ?

A) **Bras hémiplégique ;**	☒
B) **Curage axillaire ganglionnaire ;**	☒
C) **Patient porteur d'une prothèse orthopédique ou vasculaire :**	☒
D) **Lésions infectieuse ou suintantes en regard des sites de ponction.**	☒

28) Pour un patient groupe sanguin A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous utilisez :

A) **Le plasma frais congelé AB ;**	☒
B) Le plasma frais congelé O ;	☐
C) Indifféremment AB ou O ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste ;	☐

29) Dans le cas des pathologies cardiovasculaires les diurétiques servent à :

A) **Augmenter la diurèse ;**	☒
B) **Fondre les œdèmes ;**	☒
C) **Diminuer la rétention de sel et de l'eau ;**	☒
D) Augmenter la tension artérielle.	☐

30) Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, vomissements, diarrhée profuse, … accident transfusionnel s'agit-t-il ? :

A) Un accident de surcharge ;	☐
B) **Un accident de contamination ;**	☒
C) Un accident de transfusion ;	☐
D) Un accident d'hémolyse.	☐

31) Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte :

A) Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 10 gouttes ;	☐
B) **Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 15 gouttes ;**	☒
C) Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 20 gouttes ;	☐
D) Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 30 gouttes.	☐

32) Selon la règle des neuf de Wallace les surfaces des brulures sont estimées à :

A) 10% tête et cou ;	☐
B) **9% pour le membre supérieur ;**	☒
C) 27% pour les faces antérieurs et postérieurs du tronc ;	☐
D) 9% pour les organes génitaux.	☐

33) En cas de blessure ou contact direct avec un liquide biologique sur peau lésée (accident d'exposition au sang), il faut :

A) Terminer l'activité en cours ;	☐
B) **Nettoyer immédiatement la zone cutanée lésée à l'eau et au savon ;**	☒
C) **Désinfecter au Dakin stabilisé la zone cutané concernée ;**	☒
D) Désinfecter avec l'alcool à 70° avec un temps de contact d'au moins 5 min.	☐

34) Devant un accident transfusionnel, l'infirmier doit :

A) **Arrêter la transfusion ;**	☒
B) Retirer la voie veineuse et appeler le médecin ;	☐
C) Poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion ;	☐
D) **Se référer à la procédure d'hémovigilance.**	☒

35) Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie ?

A) **Tremblement ;**	☒
B) **Sueur ;**	☒
C) **Troubles de comportement ;**	☒
D) Haleine acétonique.	☐

36) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) **Après la toilette des organes génitaux externes ;**	☒
C) En recueillant les urines du premier jet ;	☐
D) **Après avoir éliminé le premier jet contaminant.**	☒

37) Les affections de longue durée comprennent :

A) **Les néphropathies chroniques graves et syndrome néphrotique primitif ;**	☒
B) Traumatismes crâniens invalidants avec séquelles ;	☐
C) **Le diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ;**	☒
D) **Les accidents vasculaires cérébraux invalidants ;**	☒

38) Un malade se présente au service des urgences avec un état général altéré : fièvre d'installation brutale, céphalées, vomissements en jet, photophobie : raideur de la nuque s'agit-il d'une :

A) Appendicite ;	☐
B) Intoxication alimentaire ;	☐
C) Péritonite ;	☐
D) **Méningite ;**	☒

39) Le programme de surveillance de la grossesse et de l'accouchement (PSGA) préconise 4 consultations prénatales :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

40) Une infection nosocomiale peut se décaler chez le malade hospitalier 48 heures après sa sortie de l'hôpital :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

2018

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 2

(دورة 16 دجنبر 2018) www.ispits.net

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) **Parmi les produits suivants, lesquels sont considérés comme des médicaments ?**

A) Les produits homéopathiques ;	☐
B) Les produits pour prothèse dentaire ;	☐
C) Les produits de contraste d'imagerie cérébrale ;	☐
D) Les vitamines.	☐

2) **Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?**

A) Les excipients n'ont pas d'effet thérapeutique ;	☐
B) Les vaccins sont considérés comme des médicaments ;	☐
C) Les excipients sont rarement la cause des effets indésirables ;	☐
D) Un médicament se compose toujours d'un principe actif et d'un excipient.	☐

3) **Que regroupe-t-on sous le terme « médicaments de forme galénique » ?**

A) Les gélules ;	☐
B) Les transfusions ;	☐
C) Les ampoules ;	☐
D) Les suppositoires.	☐

4) Parmi ces voies d'administration, laquelle ne permet pas de « court-circuiter » le foie ?

A) La voie sublinguale ;	☐
B) La voie rectale ;	☐
C) La voie intraveineuse ;	☐
D) La voie per os.	☐

5) L'hémovigilance porte sur :

A) Les procédures de surveillance et d'évaluation des incidents transfusionnels ;	☐
B) La surveillance des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les récepteurs du sang ;	☐
C) La phase de collecte des produits sanguins labiles ;	☐
D) Le suivi épidémiologique des donneurs.	☐

6) Que signifie le sigle CLIN :

A) Comité de Lutte contre les affectations nosocomiales ;	☐
B) Comité de lutte contre les infections nosocomiales ;	☐
C) Comité chargé de l'hygiène hospitalière ;	☐
D) Comité pilote du projet d'établissement hospitalier.	☐

7) La mission du CLIN est de :

A) Élaborer un rapport d'activité d'hygiène hospitalière ;	☐
B) Élaborer un programme d'actions qui sera mis en œuvre par l'ensemble des professionnels ;	☐
C) Coordonner l'action de la prévention et la surveillance des infections nosocomiales ;	☐
D) Mettre en œuvre les actions de prévention et de surveillance des infections.	☐

8) Quel est le de type d'infection la plus répandu en milieu hospitalier :

A) Les infections sur le site opératoire ;	☐
B) Les pneumopathies ;	☐
C) Les infections urinaires ;	☐
D) Les infections génitales.	☐

9) Dans le diabète de type I, l'insuline est donc un médicament exogène, quel est son effet :

A) L'hyperglycémie ;	☐
B) L'hypoglycémie ;	☐
C) L'hypercalcémie ;	☐
D) L'hypotension.	☐

10) Concernant le diabète de type 2, quelles sont les propositions vraies ?

A) Il y a souvent une surproduction d'insuline par le pancréas jusqu'à épuisement ;	☐
B) Les médicaments antidiabétiques sont oraux ;	☐
C) Les médicaments antidiabétiques ont pour effet d'augmenter la sensibilité l'insuline ;	☐
D) Les médicaments antidiabétiques ont pour effet de freiner la libération de l'insuline.	☐

11) Selon le calendrier vaccinal de 2018, à l'âge de 4 mois les vaccins administrés sont :

A) La dose 3 de l'anti-polio oral et la dose 1 de l'anti-polio inactivé ;	☐
B) La dose 3 du vaccin anti-Pneumococcique ;	☐
C) La dose 3 du vaccin anti-Rotavirus ;	☐
D) La dose 3 du vaccin pentavalent.	☐

12) Selon le calendrier vaccinal de 2018, le Vaccin anti-polio oral est rappelé l'âge de :

A) 12 mois ;	☐
B) 18 mois ;	☐
C) 24 mois ;	☐
D) 5 ans.	☐

13) Selon le calendrier vaccinal de 2018, le vaccin anti-Hépatite B est administré :

A) Dans les 24h de la naissance ;	☐
B) Durant le premier mois si non pris à la naissance ;	☐
C) En rappel au $2^{ème}$, $3^{ème}$ et $4^{ème}$ mois ;	☐
D) En rappel au $9^{ème}$ mois.	☐

14) Les indications de la trachéotomie transitoires sont :

A) Ventilation artificielle prolongée ;	☐
B) Insuffisance respiratoire chronique évoluée, surtout de type restrictif ;	☐
C) Difficultés de sevrage de la ventilation mécanique ;	☐
D) Obstacle laryngé troubles de déglutition avec inhalation.	☐

15) Les indications de la trachéotomie définitives sont :

A) Traumatisme facial ;	☐
B) Anomalies définitives du carrefour oro-pharyngé avec troubles de déglutition ;	☐
C) Maladies neuromusculaires ;	☐
D) Insuffisance respiratoire chronique évoluée, surtout de type restrictif.	☐

16) Les soins locaux d'une trachéotomie :

A) Nécessitent un lavage chirurgical des mains pendant les premières 48h ;	☐
B) Se font à la demande du patient ;	☐
C) Nécessitent un lavage antiseptique après les premières 48h ;	☐
D) Se font 1 à 2 fois par jour.	☐

17) Parmi les risques d'une trachéotomie, on note :

A) Décanulation accidentelle ;	☐
B) Obstruction de la canule par un bouchon muqueux ;	☐
C) Fausses routes par inhalation ;	☐
D) Lésion de la trachée.	☐

18) Le lavage vésical est un nettoyage mécanique d'une vessie contenant des :

A) Dépôts lithiasiques ;	☐
B) Débris épithéliaux ;	☐
C) Urines ;	☐
D) Caillots de sang.	☐

19) Les contre-indications du lavage vésical sont :

A) La rupture traumatique de l'urètre ;	☐
B) L'infection urétrale ;	☐
C) L'infection vésicale ;	☐
D) L'âge.	☐

20) Les indications du lavage vésical sont :

A) Post-opératoire aptes une chirurgie sanglante ;	☐
B) Résection trans-urélrale de la prostate ;	☐
C) Résection trans-urétrale de ta vessie ;	☐
D) Hématuries.	☐

21) Parmi les 4 cancers suivants, lequel est le plus fréquent chez la femme au Maroc :

A) Cancer du sein ;	☐
B) Cancer du col utérin ;	☐
C) Cancer de la thyroïde ;	☐
D) Cancer de l'ovaire.	☐

22) Parmi les 4 cancers suivants, lequel est le plus fréquent chez l'homme au Maroc :

A) Poumon ;	☐
B) Prostate ;	☐
C) Lymphome ;	☐
D) Larynx.	☐

23) Lesquelles des actions suivantes sont prévues dans le plan national de lutte et de contrôle du cancer pour la prévention :

A) Assurer l'accès aux programmes de détection précoce ;	☐
B) Lutter contre le tabagisme ;	☐
C) Lutter contre les risques environnementaux ;	☐
D) Renforcer la protection des consommateurs.	☐

24) Lesquelles des actions suivantes sont prévues dans le plan national de lutte et de Du cancer, pour la détection :

A) Mettre en place une stratégie de dépistage ;	☐
B) Mettre en place une stratégie de diagnostic précoce ;	☐
C) Assurer la surveillance de l'évolution des cancers et des facteurs de risque ;	☐
D) Développer un système d'information des activités de détection précoce.	☐

25) Les registres des cancers :

A) Constituent un outil indispensable polir étudier la pathologie cancéreuse dans une population ;	☐
B) Fournissent les données concernant les indicateurs épidémiologiques ;	☐
C) Permettent l'évaluation de l'efficience globale du système sanitaire ;	☐
D) Fournissent des données permettant d'alimenter la recherche.	☐

26) Le Plan de santé 2025 prévoit le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles dans :

A) Son premier pilier ;	☐
B) Son deuxième pilier ;	☐
C) Aucun pilier ;	☐
D) Son troisième pilier.	☐

27) Pour l'évaluation de la fonction respiratoire en urgence pédiatrique, on s'intéresse à :

A) La fréquence respiratoire ;	☐
B) Travail respiratoire ;	☐
C) Douleur thoracique ;	☐
D) Volume respiratoire.	☐

28) La (les)quelle(s) des transfusions suivantes est (sont) compatible :

A) La transfusion d'hématies O à un receveur A, B, AB ;	☐
B) La transfusion d'hématies AB à un receveur B ;	☐
C) La transfusion d'hématies A à un receveur AB ;	☐
D) La transfusion d'hématies AB à un receveur O.	☐

29) La prise en charge intégrée de l'enfant, pour être de qualité, repose sur trois composantes lesquelles :

A) La composante communautaire ;	☐
B) La composante du temps ;	☐
C) La composante organisationnelle ;	☐
D) La composante clinique.	☐

30) Parmi les signes suivants, lesquels sont en faveur d'une déshydratation sévère chez l'enfant :

A) Agitation irritabilité ;	☐
B) Incapacité ou difficulté de boire ;	☐
C) Léthargie ou inconscience ;	☐
D) L'enfant boit avidement.	☐

31) Parmi les signes suivants, lesquels sont en faveur d'une malnutrition sévère chez l'enfant :

A) Poids inférieur à la normale ;	☐
B) Amaigrissement visible ;	☐
C) Œdèmes au niveau des pieds ;	☐
D) Poids normal pour l'âge.	☐

32) Le Plan Stratégique National 2018-2021 pour et la prévention et le contrôle de la tuberculose vise :

A) La diminution de la mortalité afférente à cette maladie ;	☐
B) Le renforcement de la détection des cas de tuberculose ;	☐
C) La formation du personnel ;	☐
D) L'amélioration des conditions de traitement et de suivi des maladies pris en charge.	☐

33) Les objectifs de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A) La libération des voies aériennes pour améliorer la ventilation ;	☐
B) La prévention de la formation d'un bouchon muqueux ;	☐
C) La régulation des paramètres ;	☐
D) La prévention d'une pneumopathie d'inhalation.	☐

34) Parmi les interventions stratégiques prévue dans le plan stratégique national 2018-2021 pour la prévention et le contrôle de la tuberculose, on note :

A) Réviser et mettre à jour le guide national du PNLAT en conformité avec les nouvelles recommandations de l'OMS ;	☐
B) Recruter du personnel ;	☐
C) Etendre le réseau de laboratoires de la tuberculose et renforcer ses capacités de diagnostic ;	☐
D) Etablir des procédures standard pour le diagnostic de la TEP.	☐

35) En cas d'erreur de groupe sanguin lors d'une transfusion, la conséquence est :

A) Un accident infectieux ;	☐
B) Un accident hémolytique ;	☐
C) Un accident, allergique ;	☐
D) Un accident hypovolémique.	☐

36) Pour la sécurité transfusionnelle à l'hôpital, lesquelles des vigilances suivantes se à respecter :

A) L'identitovigilance ;	☐
B) L'hémovigilance ;	☐
C) La pharmacovigilance ;	☐
D) La biovigilance.	☐

37) Les complications de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A) La désaturation ;	☐
B) Les lésions traumatiques ;	☐
C) La douleur ;	☐
D) L'arrêt cardiaque.	☐

38) Le processus de formation d'escarres est rapidement réversible :

A) Au stade 1 ;	☐
B) Au stade 1 et 2 ;	☐
C) Au stade 3 pour une personne dénutrie ;	☐
D) Au stade 3 pour une personne obèse.	☐

39) Les signes cliniques locaux d'une escarre infectée sont :

A) Une odeur nauséabonde ;	☐
B) Une modification des exsudats ;	☐
C) Un saignement ;	☐
D) La réapparition de fibrine alors que la plaie est en phase de bourgeonnement.	☐

40) Une escarre peut survenir en :

A) 2 heures ;	☐
B) 24 heures ;	☐
C) 2 jours ;	☐
D) Après une longue durée d'alitement.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 2

(دورة 16 دجنبر 2018)

Correction proposée :

1) **Parmi les produits suivants, lesquels sont considérés comme des médicaments ?**

A) **Les produits homéopathiques ;**	☒
B) Les produits pour prothèse dentaire ;	☐
C) **Les produits de contraste d'imagerie cérébrale ;**	☒
D) **Les vitamines.**	☒

2) **Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?**

A) **Les excipients n'ont pas d'effet thérapeutique ;**	☒
B) **Les vaccins sont considérés comme des médicaments ;**	☒
C) Les excipients sont rarement la cause des effets indésirables ;	☐
D) **Un médicament se compose toujours d'un principe actif et d'un excipient.**	☒

3) **Que regroupe-t-on sous le terme « médicaments de forme galénique » ?**

A) **Les gélules ;**	☒
B) Les transfusions ;	☐
C) **Les ampoules ;**	☒
D) **Les suppositoires.**	☒

4) Parmi ces voies d'administration, laquelle ne permet pas de « court-circuiter » le foie ?

A) La voie sublinguale ;	☐
B) La voie rectale ;	☐
C) La voie intraveineuse ;	☐
D) **La voie per os.**	☒

5) L'hémovigilance porte sur :

A) **Les procédures de surveillance et d'évaluation des incidents transfusionnels ;**	☒
B) **La surveillance des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les récepteurs du sang ;**	☒
C) **La phase de collecte des produits sanguins labiles ;**	☒
D) **Le suivi épidémiologique des donneurs.**	☒

6) Que signifie le sigle CLIN :

A) Comité de Lutte contre les affectations nosocomiales ;	☐
B) **Comité de lutte contre les infections nosocomiales ;**	☒
C) Comité chargé de l'hygiène hospitalière ;	☐
D) Comité pilote du projet d'établissement hospitalier.	☐

7) La mission du CLIN est de :

A) **Élaborer un rapport d'activité d'hygiène hospitalière ;**	☒
B) **Élaborer un programme d'actions qui sera mis en œuvre par l'ensemble des professionnels ;**	☒
C) **Coordonner l'action de la prévention et la surveillance des infections nosocomiales ;**	☒
D) Mettre en œuvre les actions de prévention et de surveillance des infections.	☐

8) Quel est le de type d'infection la plus répandu en milieu hospitalier :

A) Les infections sur le site opératoire ;	☐
B) Les pneumopathies ;	☐
C) **Les infections urinaires ;**	☒
D) Les infections génitales.	☐

9) Dans le diabète de type I, l'insuline est donc un médicament exogène, quel est son effet :

A) L'hyperglycémie ;	☐
B) **L'hypoglycémie ;**	☒
C) L'hypercalcémie ;	☐
D) L'hypotension.	☐

10) Concernant le diabète de type 2, quelles sont les propositions vraies ?

A) **Il y a souvent une surproduction d'insuline par le pancréas jusqu'à épuisement ;**	☒
B) **Les médicaments antidiabétiques sont oraux ;**	☒
C) **Les médicaments antidiabétiques ont pour effet d'augmenter la sensibilité l'insuline ;**	☒
D) Les médicaments antidiabétiques ont pour effet de freiner la libération de l'insuline.	☐

11) Selon le calendrier vaccinal de 2018, à l'âge de 4 mois les vaccins administrés sont :

A) **La dose 3 de l'anti-polio oral et la dose 1 de l'anti-polio inactivé ;**	☒
B) La dose 3 du vaccin anti-Pneumococcique ;	☐
C) **La dose 3 du vaccin anti-Rotavirus ;**	☒
D) **La dose 3 du vaccin pentavalent.**	☒

12) Selon le calendrier vaccinal de 2018, le Vaccin anti-polio oral est rappelé l'âge de :

A) 12 mois ;	☐
B) **18 mois ;**	☒
C) 24 mois ;	☐
D) **5 ans.**	☒

13) Selon le calendrier vaccinal de 2018, le vaccin anti-Hépatite B est administré :

A) **Dans les 24h de la naissance ;**	☒
B) **Durant le premier mois si non pris à la naissance ;**	☒
C) En rappel au $2^{ème}$, $3^{ème}$ et $4^{ème}$ mois ;	☐
D) En rappel au $9^{ème}$ mois.	☐

14) Les indications de la trachéotomie transitoires sont :

A) Ventilation artificielle prolongée ;	☒
B) Insuffisance respiratoire chronique évoluée, surtout de type restrictif ;	☐
C) Difficultés de sevrage de la ventilation mécanique ;	☒
D) Obstacle laryngé troubles de déglutition avec inhalation.	☒

15) Les indications de la trachéotomie définitives sont :

A) Traumatisme facial ;	☐
B) Anomalies définitives du carrefour oro-pharyngé avec troubles de déglutition ;	☒
C) Maladies neuromusculaires ;	☒
D) Insuffisance respiratoire chronique évoluée, surtout de type restrictif.	☒

16) Les soins locaux d'une trachéotomie :

A) Nécessitent un lavage chirurgical des mains pendant les premières 48h ;	☒
B) Se font à la demande du patient ;	☐
C) Nécessitent un lavage antiseptique après les premières 48h ;	☒
D) Se font 1 à 2 fois par jour.	☒

17) Parmi les risques d'une trachéotomie, on note :

A) Décanulation accidentelle ;	☒
B) Obstruction de la canule par un bouchon muqueux ;	☒
C) Fausses routes par inhalation ;	☒
D) Lésion de la trachée.	☒

18) Le lavage vésical est un nettoyage mécanique d'une vessie contenant des :

A) Dépôts lithiasiques ;	☒
B) Débris épithéliaux ;	☒
C) Urines ;	☐
D) Caillots de sang.	☒

19) Les contre-indications du lavage vésical sont :

A) La rupture traumatique de l'urètre ;	☒
B) L'infection urétrale ;	☒
C) L'infection vésicale ;	☒
D) L'âge.	☐

20) Les indications du lavage vésical sont :

A) Post-opératoire aptes une chirurgie sanglante ;	☒
B) Résection trans-urélrale de la prostate ;	☒
C) Résection trans-urétrale de ta vessie ;	☒
D) Hématuries.	☒

21) Parmi les 4 cancers suivants, lequel est le plus fréquent chez la femme au Maroc :

A) Cancer du sein ;	☒
B) Cancer du col utérin ;	☐
C) Cancer de la thyroïde ;	☐
D) Cancer de l'ovaire.	☐

22) Parmi les 4 cancers suivants, lequel est le plus fréquent chez l'homme au Maroc :

A) Poumon ;	☒
B) Prostate ;	☐
C) Lymphome ;	☐
D) Larynx.	☐

23) Lesquelles des actions suivantes sont prévues dans le plan national de lutte et de contrôle du cancer pour la prévention :

A) Assurer l'accès aux programmes de détection précoce ;	☐
B) Lutter contre le tabagisme ;	☒
C) Lutter contre les risques environnementaux ;	☒
D) Renforcer la protection des consommateurs.	☒

24) Lesquelles des actions suivantes sont prévues dans le plan national de lutte et de Du cancer, pour la détection :

A) **Mettre en place une stratégie de dépistage ;**	☒
B) **Mettre en place une stratégie de diagnostic précoce ;**	☒
C) Assurer la surveillance de l'évolution des cancers et des facteurs de risque ;	☐
D) **Développer un système d'information des activités de détection précoce.**	☒

25) Les registres des cancers :

A) **Constituent un outil indispensable polir étudier la pathologie cancéreuse dans une population ;**	☒
B) **Fournissent les données concernant les indicateurs épidémiologiques ;**	☒
C) Permettent l'évaluation de l'efficience globale du système sanitaire ;	☐
D) **Fournissent des données permettant d'alimenter la recherche.**	☒

26) Le Plan de santé 2025 prévoit le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles dans :

A) Son premier pilier ;	☐
B) **Son deuxième pilier ;**	☒
C) Aucun pilier ;	☐
D) Son troisième pilier.	☐

27) Pour l'évaluation de la fonction respiratoire en urgence pédiatrique, on s'intéresse à :

A) **La fréquence respiratoire ;**	☒
B) **Travail respiratoire ;**	☒
C) Douleur thoracique ;	☐
D) **Volume respiratoire.**	☒

28) La (les)quelle(s) des transfusions suivantes est (sont) compatible :

A) **La transfusion d'hématies O à un receveur A, B, AB ;**	☒
B) La transfusion d'hématies AB à un receveur B ;	☐
C) **La transfusion d'hématies A à un receveur AB ;**	☒
D) La transfusion d'hématies AB à un receveur O.	☐

29) La prise en charge intégrée de l'enfant, pour être de qualité, repose sur trois composantes lesquelles :

A) La composante communautaire ;	☒
B) La composante du temps ;	☐
C) La composante organisationnelle ;	☒
D) La composante clinique.	☒

30) Parmi les signes suivants, lesquels sont en faveur d'une déshydratation sévère chez l'enfant :

A) Agitation irritabilité ;	☐
B) Incapacité ou difficulté de boire ;	☒
C) Léthargie ou inconscience ;	☒
D) L'enfant boit avidement.	☐

31) Parmi les signes suivants, lesquels sont en faveur d'une malnutrition sévère chez l'enfant :

A) Poids inférieur à la normale ;	☐
B) Amaigrissement visible ;	☒
C) Œdèmes au niveau des pieds ;	☒
D) Poids normal pour l'âge.	☐

32) Le Plan Stratégique National 2018-2021 pour et la prévention et le contrôle de la tuberculose vise :

A) La diminution de la mortalité afférente à cette maladie ;	☒
B) Le renforcement de la détection des cas de tuberculose ;	☒
C) La formation du personnel ;	☐
D) L'amélioration des conditions de traitement et de suivi des maladies pris en charge.	☒

33) Les objectifs de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A) La libération des voies aériennes pour améliorer la ventilation ;	☒
B) La prévention de la formation d'un bouchon muqueux ;	☒
C) La régulation des paramètres ;	☐
D) La prévention d'une pneumopathie d'inhalation.	☒

34) Parmi les interventions stratégiques prévue dans le plan stratégique national 2018- 2021 pour la prévention et le contrôle de la tuberculose, on note :

A) **Réviser et mettre à jour le guide national du PNLAT en conformité avec les nouvelles recommandations de l'OMS ;**	☒
B) Recruter du personnel ;	☐
C) **Etendre le réseau de laboratoires de la tuberculose et renforcer ses capacités de diagnostic ;**	☒
D) **Etablir des procédures standard pour le diagnostic de la TEP.**	☒

35) En cas d'erreur de groupe sanguin lors d'une transfusion, la conséquence est :

A) Un accident infectieux ;	☐
B) **Un accident hémolytique ;**	☒
C) Un accident, allergique ;	☐
D) Un accident hypovolémique.	☐

36) Pour la sécurité transfusionnelle à l'hôpital, lesquelles des vigilances suivantes se à respecter :

A) **L'identitovigilance ;**	☒
B) **L'hémovigilance ;**	☒
C) **La pharmacovigilance ;**	☒
D) **La biovigilance.**	☒

37) Les complications de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A) **La désaturation ;**	☒
B) **Les lésions traumatiques ;**	☒
C) La douleur ;	☐
D) **L'arrêt cardiaque.**	☒

38) Le processus de formation d'escarres est rapidement réversible :

A) Au stade 1 ;	☐
B) **Au stade 1 et 2 ;**	☒
C) Au stade 3 pour une personne dénutrie ;	☐
D) Au stade 3 pour une personne obèse.	☐

39) Les signes cliniques locaux d'une escarre infectée sont :

A) Une odeur nauséabonde ;	☒
B) Une modification des exsudats ;	☒
C) Un saignement ;	☐
D) La réapparition de fibrine alors que la plaie est en phase de bourgeonnement.	☒

40) Une escarre peut survenir en :

A) 2 heures ;	☒
B) 24 heures ;	☐
C) 2 jours ;	☐
D) Après une longue durée d'alitement.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الاختبار الأول المدة : ساعتان المعامل : 2

(دورة 16 دجنبر 2018) www.ispits.net

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les avantages de la démarche de soins infirmiers (DSI) sont :

A) Uniformisation du vocabulaire technique employé par le personnel infirmier ;	☐
B) Renforcement de la sécurité du patient ;	☐
C) Évaluation et amélioration de la qualité des soins prodigués ;	☐
D) Amélioration de l'encodage informatisé des données de santé.	☐

2) Le diagnostic infirmier :

A) Signifie l'énoncé d'un jugement clinique ;	☐
B) Est un outil de suivi thérapeutique ;	☐
C) Sert de base pour choisir les interventions de soins ;	☐
D) Est un outil d'évaluation de l'efficacité des soins.	☐

3) Le projet de soins :

A) Fait suite à l'analyse des données recueillies sur un patient ;	☐
B) Consiste à établir un plan d'actions formalisé par un plan de soins ;	☐
C) Est synonyme de la planification des soins ;	☐
D) Est un outil d'évaluation de la démarche des soins.	☐

4) Le plan de soins est un outil qui permet de communiquer :

A) Les problèmes diagnostiqués chez le patient ;	☐
B) Les objectifs d'interventions infirmières ;	☐
C) La démarche de l'évaluation des soins ;	☐
D) Les modalités d'amélioration de la qualité des soins.	☐

5) La méthode des soins infirmiers :

A) Englobe les techniques et les procédures de soins infirmiers ;	☐
B) Fournit les consignes précises pour l'application d'une activité de soins ;	☐
C) Décrit la technique à suivre et les ressources pour appliquer l'activité de soins ;	☐
D) Déterminer les conditions à respecter pour l'accomplissement de l'activité de soins.	☐

6) Le protocole des soins infirmiers a pour but de :

A) Assurer une intervention appropriée face aux problèmes relevant des soins ;	☐
B) Encadrer la pratique clinique infirmière ;	☐
C) Déterminer une conduite à tenir pour résoudre un problème de soins ;	☐
D) Clarifier les rôles et responsabilités des intervenants en soins.	☐

7) Critères de gravités des accidents d'exposition au sang sont :

A) La blessure cutanée secondaire à l'accident est profonde ;	☐
B) La charge virale du patient source au moment de l'accident est élevée ;	☐
C) L'aiguille est de gros calibre ;	☐
D) Le contact avec le sang est de courte durée.	☐

8) L'intérêt d'une centralisation de la stérilisation est de :

A) Assurer la continuité et la reproductivité des procédures ;	☐
B) Regrouper les moyens et les compétences ;	☐
C) Assurer l'efficacité de la stérilisation ;	☐
D) Organiser les locaux et les circuits de manière rationnelle.	☐

9) Le bilan biologique de suivi des accidents d'exposition au sang avec exposition aux VIH, VHB, VHC est fait :

A) Immédiatement après l'accident ;	☐
B) Après 15 jours de l'accident ;	☐
C) Au 20ème jour après l'accident ;	☐
D) Pendant le 3ème mois.	☐

10) Les principaux facteurs favorisant les infections associées aux soins sont :

A) Le climat ;	☐
B) Le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène ;	☐
C) Une architecture non adaptée ;	☐
D) Une mauvaise organisation du travail.	☐

11) Quel est le moment idéal de prise de la chimioprophylaxie après un accident d'exposition au sang :

A) 5 minutes ;	☐
B) 4 heures ;	☐
C) 48 heures ;	☐
D) 7 jours.	☐

12) L'isolement septique :

A) Vise à protéger les autres patients du service ;	☐
B) Vise à protéger les patients immunodéprimés ;	☐
C) Exige une chambre individuelle ;	☐
D) Peut se faire en salle commune.	☐

13) Les différentes branches de l'épidémiologie sont :

A) L'épidémiologie descriptive ;	☐
B) L'épidémiologie étiologique ;	☐
C) L'épidémiologie analytique ;	☐
D) L'épidémiologie d'évaluation.	☐

14) Les études épidémiologiques :

A) Ont pour objectif la prévention des problèmes de santé ;	☐
B) S'intéressent à un groupe d'individu ;	☐
C) S'intéressent à l'individu ;	☐
D) Sont souvent réalisées sur un échantillon de la population cible.	☐

15) Les champs d'application des études épidémiologiques sont :

A) L'épidémiologie de la population ;	☐
B) L'épidémiologie clinique ;	☐
C) L'épidémiologie thérapeutique ;	☐
D) L'épidémiologie opérationnelle.	☐

16) Les objectifs de l'épidémiologie sont :

A) La surveillance ;	☐
B) L'investigation ;	☐
C) La recherche ;	☐
D) L'évaluation.	☐

17) Les différents types d'étude épidémiologiques sont :

A) Les études expérimentales ;	☐
B) Les études analytiques ;	☐
C) Les études de cohorte ;	☐
D) Les études cas témoin.	☐

18) Les études de prévalence et de l'incidence font partie de :

A) Les études expérimentales ;	☐
B) Les études non expérimentales ;	☐
C) Les études de cohorte ;	☐
D) Les études analytiques.	☐

19) L'article 24 de la loi cadre n°34-09, stipule que le SROS détermine par province ou préfecture, entre autre :

A) L'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante ;	☐
B) L'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante ;	☐
C) La projection des équipements biomédicaux lourds ainsi que leur répartition territoriale ;	☐
D) Les projections des effectifs des ressources humaines.	☐

20) L'éthique est basée sur les valeurs suivantes :

A) La dignité ;	☐
B) La liberté ;	☐
C) L'autonomie ;	☐
D) L'honnêteté intellectuelle.	☐

21) Les principes de l'éthique sont :

A) La bienfaisance ;	☐
B) La non-malfaisance ;	☐
C) L'autonomie ;	☐
D) La solidarité.	☐

22) Les différents types de la douleur sont :

A) La douleur nociceptive ;	☐
B) La douleur neurogène ;	☐
C) La douleur psychogène ;	☐
D) La douleur mixte.	☐

23) Les bénéfices du leadership sont :

A) Meilleure coordination des processus de l'établissement ;	☐
B) Amélioration de la communication au de l'établissement ;	☐
C) Développement et amélioration de la capacité de fournir les résultats escomptés ;	☐
D) Amélioration de l'image de l'établissement.	☐

24) L'article 3 de la loi cadre n°34-09, stipule que les actions de l'Etat en matière de santé portent sur :

A) Les domaines de préventions contre les risques menaçant la santé ;	☐
B) La promotion de modes de vie sains ;	☐
C) L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé ;	☐
D) Le contrôle sanitaire.	☐

25) Les échelles unidimensionnelles de l'évaluation de la douleur sont :

A) Echelle verbale simple ;	☐
B) Echelle numérique ;	☐
C) Echelle visuelle analogique ;	☐
D) Echelle comportementale.	☐

26) La classification des antalgiques selon l'OMS se fait en :

A) Deux paliers ;	☐
B) Trois paliers ;	☐
C) Quatre paliers ;	☐
D) Cinq paliers.	☐

27) Selon la classification de l'OMS, les anti-inflammatoire non-stéroïdiens sont classés :

A) Le palier un ;	☐
B) Le palier cinq ;	☐
C) Le palier quatre ;	☐
D) Aucun de ces paliers.	☐

28) Parmi les principes de management de la qualité il y a :

A) Orientation du patient ;	☐
B) Implication du patient ;	☐
C) Prise de décision fondée sur des preuves ;	☐
D) Management des relations avec les parties intéressées.	☐

29) L'accès à la couverture sanitaire universelle repose sur les dimensions suivantes :

A) L'accessibilité physique ;	☐
B) L'efficacité des services ;	☐
C) L'acceptabilité ;	☐
D) L'accès financière.	☐

30) L'amélioration au sein d'un établissement de santé permet de :

A) Conserver les niveaux de performance actuels ;	☐
B) Réagir à toute variation du contexte interne et externe ;	☐
C) Créer de nouvelles opportunités ;	☐
D) Assurer ta confiance des parties intéressées.	☐

31) Le SROS est un outil de :

A) Planification de l'offre de soins ;	☐
B) Organisation de l'offre de soins ;	☐
C) Accréditation de l'offre de soins ;	☐
D) Evaluation de l'offre de soins.	☐

32) Le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
C) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
D) La direction médicaments et la pharmacie.	☐

33) Le centre Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
C) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
D) La direction médicaments et la pharmacie.	☐

34) Le plan santé 2025 prévoit :

A) L'organisation et le développement de l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé ;	☐
B) Le renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies ;	☐
C) Le renforcement du système de sécurité ;	☐
D) L'amélioration de la gouvernance, l'optimisation et l'utilisation des ressources.	☐

35) L'Institut National d'Hygiène relève de :

A) La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
B) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
C) La direction médicaments et la pharmacie ;	☐
D) La direction de la population.	☐

36) Les niveaux la planification sont :

A) Le niveau normatif ;	☐
B) Le niveau stratégique ;	☐
C) Le niveau tactique ;	☐
D) Le niveau intermédiaire.	☐

37) La planification normative :

A) C'est l'orientation générale d'un organisme ;	☐
B) Représente un plan d'action concret pour réaliser des objectifs ;	☐
C) Vise le changement de valeurs pour atteindre certains grands objectifs ;	☐
D) Porte sur le long terme.	☐

38) Le but de la planification en santé est de :

A) Faire le diagnostic organisationnel ;	☐
B) Assurer l'adéquation entre l'offre et le besoin ;	☐
C) Réguler l'offre de soins sur le territoire national ;	☐
D) Mettre en œuvre une politique sanitaire.	☐

39) Les prévisions du plan santé 2025, on note :

A) La stratégie nationale de la santé des personnes âgées et des migrants ;	☐
B) Le plan « Maroc sans hépatite virale B » ;	☐
C) Le plan national de procréation médicalement assistée ;	☐
D) Le programme national des maladies rares et orphelines.	☐

40) Parmi les priorités du Ministère de la Santé, décrite dans le plan santé 2025, on cite :

A) L'augmentation de la capacité litière nationale ;	☐
B) Le réaménagement des structures hospitalières existantes ;	☐
C) Dotation des hôpitaux en équipements lourds ;	☐
D) L'encouragement de nouveaux modes d'hospitalisation non-conventionnelle.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الاختبار الأول المدة : ساعتان المعامل : 2

(دورة 16 دجنبر 2018)

Correction proposée :

1) Les avantages de la démarche de soins infirmiers (DSI) sont :

A) **Uniformisation du vocabulaire technique employé par le personnel infirmier ;**	☒
B) Renforcement de la sécurité du patient ;	☐
C) **Évaluation et amélioration de la qualité des soins prodigués ;**	☒
D) **Amélioration de l'encodage informatisé des données de santé.**	☒

2) Le diagnostic infirmier :

A) **Signifie l'énoncé d'un jugement clinique ;**	☒
B) Est un outil de suivi thérapeutique ;	☐
C) **Sert de base pour choisir les interventions de soins ;**	☒
D) Est un outil d'évaluation de l'efficacité des soins.	☐

3) Le projet de soins :

A) **Fait suite à l'analyse des données recueillies sur un patient ;**	☒
B) **Consiste à établir un plan d'actions formalisé par un plan de soins ;**	☒
C) Est synonyme de la planification des soins ;	☐
D) Est un outil d'évaluation de la démarche des soins.	☐

4) Le plan de soins est un outil qui permet de communiquer :

A) **Les problèmes diagnostiqués chez le patient ;**	☒
B) **Les objectifs d'interventions infirmières ;**	☒
C) La démarche de l'évaluation des soins ;	☐
D) Les modalités d'amélioration de la qualité des soins.	☐

5) La méthode des soins infirmiers :

A) Englobe les techniques et les procédures de soins infirmiers ;	☒
B) Fournit les consignes précises pour l'application d'une activité de soins ;	☒
C) Décrit la technique à suivre et les ressources pour appliquer l'activité de soins ;	☒
D) Déterminer les conditions à respecter pour l'accomplissement de l'activité de soins.	☐

6) Le protocole des soins infirmiers a pour but de :

A) Assurer une intervention appropriée face aux problèmes relevant des soins ;	☒
B) Encadrer la pratique clinique infirmière ;	☒
C) Déterminer une conduite à tenir pour résoudre un problème de soins ;	☒
D) Clarifier les rôles et responsabilités des intervenants en soins.	☐

7) Critères de gravités des accidents d'exposition au sang sont :

A) La blessure cutanée secondaire à l'accident est profonde ;	☒
B) La charge virale du patient source au moment de l'accident est élevée ;	☒
C) L'aiguille est de gros calibre ;	☒
D) Le contact avec le sang est de courte durée.	☐

8) L'intérêt d'une centralisation de la stérilisation est de :

A) Assurer la continuité et la reproductivité des procédures ;	☒
B) Regrouper les moyens et les compétences ;	☒
C) Assurer l'efficacité de la stérilisation ;	☐
D) Organiser les locaux et les circuits de manière rationnelle.	☒

9) Le bilan biologique de suivi des accidents d'exposition au sang avec exposition aux VIH, VHB, VHC est fait :

A) Immédiatement après l'accident ;	☒
B) Après 15 jours de l'accident ;	☒
C) Au 20ème jour après l'accident ;	☐
D) Pendant le 3ème mois.	☒

10) Les principaux facteurs favorisant les infections associées aux soins sont :

A) Le climat ;	☐
B) **Le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène ;**	☒
C) **Une architecture non adaptée ;**	☒
D) **Une mauvaise organisation du travail.**	☒

11) Quel est le moment idéal de prise de la chimioprophylaxie après un accident d'exposition au sang :

A) **5 minutes ;**	☒
B) 4 heures ;	☐
C) 48 heures ;	☐
D) 7 jours.	☐

12) L'isolement septique :

A) **Vise à protéger les autres patients du service ;**	☒
B) Vise à protéger les patients immunodéprimés ;	☐
C) **Exige une chambre individuelle ;**	☒
D) **Peut se faire en salle commune.**	☒

13) Les différentes branches de l'épidémiologie sont :

A) **L'épidémiologie descriptive ;**	☒
B) **L'épidémiologie étiologique ;**	☒
C) **L'épidémiologie analytique ;**	☒
D) **L'épidémiologie d'évaluation.**	☒

14) Les études épidémiologiques :

A) **Ont pour objectif la prévention des problèmes de santé ;**	☒
B) **S'intéressent à un groupe d'individu ;**	☒
C) S'intéressent à l'individu ;	☐
D) **Sont souvent réalisées sur un échantillon de la population cible.**	☒

15) Les champs d'application des études épidémiologiques sont :

A) L'épidémiologie de la population ;	☒
B) L'épidémiologie clinique ;	☒
C) L'épidémiologie thérapeutique ;	☐
D) L'épidémiologie opérationnelle.	☐

16) Les objectifs de l'épidémiologie sont :

A) La surveillance ;	☒
B) L'investigation ;	☒
C) La recherche ;	☒
D) L'évaluation.	☒

17) Les différents types d'étude épidémiologiques sont :

A) Les études expérimentales ;	☒
B) Les études analytiques ;	☒
C) Les études de cohorte ;	☒
D) Les études cas témoin.	☒

18) Les études de prévalence et de l'incidence font partie de :

A) Les études expérimentales ;	☐
B) Les études non expérimentales ;	☒
C) Les études de cohorte ;	☐
D) Les études analytiques.	☐

19) L'article 24 de la loi cadre n°34-09, stipule que le SROS détermine par province ou préfecture, entre autre :

A) L'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante ;	☒
B) L'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante ;	☐
C) La projection des équipements biomédicaux lourds ainsi que leur répartition territoriale ;	☒
D) Les projections des effectifs des ressources humaines.	☒

20) L'éthique est basée sur les valeurs suivantes :

A) La dignité ;	☒
B) La liberté ;	☐
C) L'autonomie ;	☒
D) L'honnêteté intellectuelle.	☐

21) Les principes de l'éthique sont :

A) La bienfaisance ;	☒
B) La non-malfaisance ;	☒
C) L'autonomie ;	☒
D) La solidarité.	☐

22) Les différents types de la douleur sont :

A) La douleur nociceptive ;	☒
B) La douleur neurogène ;	☒
C) La douleur psychogène ;	☒
D) La douleur mixte.	☐

23) Les bénéfices du leadership sont :

A) Meilleure coordination des processus de l'établissement ;	☒
B) Amélioration de la communication au de l'établissement ;	☒
C) Développement et amélioration de la capacité de fournir les résultats escomptés ;	☒
D) Amélioration de l'image de l'établissement.	☐

24) L'article 3 de la loi cadre n°34-09, stipule que les actions de l'Etat en matière de santé portent sur :

A) Les domaines de préventions contre les risques menaçant la santé ;	☒
B) La promotion de modes de vie sains ;	☒
C) L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé ;	☐
D) Le contrôle sanitaire.	☒

25) Les échelles unidimensionnelles de l'évaluation de la douleur sont :

A) **Echelle verbale simple ;**	☒
B) **Echelle numérique ;**	☒
C) **Echelle visuelle analogique ;**	☒
D) Echelle comportementale.	☐

26) La classification des antalgiques selon l'OMS se fait en :

A) Deux paliers ;	☐
B) **Trois paliers ;**	☒
C) Quatre paliers ;	☐
D) Cinq paliers.	☐

27) Selon la classification de l'OMS, les anti-inflammatoire non-stéroïdiens sont classés :

A) **Le palier un ;**	☒
B) Le palier cinq ;	☐
C) Le palier quatre ;	☐
D) Aucun de ces paliers.	☐

28) Parmi les principes de management de la qualité il y a :

A) **Orientation du patient ;**	☒
B) Implication du patient ;	☐
C) **Prise de décision fondée sur des preuves ;**	☒
D) **Management des relations avec les parties intéressées.**	☒

29) L'accès à la couverture sanitaire universelle repose sur les dimensions suivantes :

A) **L'accessibilité physique ;**	☒
B) **L'efficacité des services ;**	☒
C) **L'acceptabilité ;**	☒
D) **L'accès financière.**	☒

30) L'amélioration au sein d'un établissement de santé permet de :

A) Conserver les niveaux de performance actuels ;	☒
B) Réagir à toute variation du contexte interne et externe ;	☒
C) Créer de nouvelles opportunités ;	☒
D) Assurer ta confiance des parties intéressées.	☐

31) Le SROS est un outil de :

A) Planification de l'offre de soins ;	☒
B) Organisation de l'offre de soins ;	☒
C) Accréditation de l'offre de soins ;	☐
D) Evaluation de l'offre de soins.	☐

32) Le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
C) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☒
D) La direction médicaments et la pharmacie.	☐

33) Le centre Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☒
C) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
D) La direction médicaments et la pharmacie. www.ispits.net	☐

34) Le plan santé 2025 prévoit :

A) L'organisation et le développement de l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé ;	☒
B) Le renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies ;	☒
C) Le renforcement du système de sécurité ;	☐
D) L'amélioration de la gouvernance, l'optimisation et l'utilisation des ressources.	☒

35) L'Institut National d'Hygiène relève de :

A) **La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;**	☒
B) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
C) La direction médicaments et la pharmacie ;	☐
D) La direction de la population.	☐

36) Les niveaux la planification sont :

A) **Le niveau normatif ;**	☒
B) **Le niveau stratégique ;**	☒
C) **Le niveau tactique ;**	☒
D) Le niveau intermédiaire.	☐

37) La planification normative :

A) **C'est l'orientation générale d'un organisme ;**	☒
B) Représente un plan d'action concret pour réaliser des objectifs ;	☐
C) **Vise le changement de valeurs pour atteindre certains grands objectifs ;**	☒
D) **Porte sur le long terme.**	☒

38) Le but de la planification en santé est de :

A) Faire le diagnostic organisationnel ;	☐
B) **Assurer l'adéquation entre l'offre et le besoin ;**	☒
C) **Réguler l'offre de soins sur le territoire national ;**	☒
D) Mettre en œuvre une politique sanitaire.	☐

39) Les prévisions du plan santé 2025, on note :

A) **La stratégie nationale de la santé des personnes âgées et des migrants ;**	☒
B) Le plan « Maroc sans hépatite virale B » ;	☐
C) **Le plan national de procréation médicalement assistée ;**	☒
D) **Le programme national des maladies rares et orphelines.**	☒

40) Parmi les priorités du Ministère de la Santé, décrite dans le plan santé 2025 on cite :

A) L'augmentation de la capacité litière nationale ;	☒
B) Le réaménagement des structures hospitalières existantes ;	☒
C) Dotation des hôpitaux en équipements lourds ;	☒
D) L'encouragement de nouveaux modes d'hospitalisation non-conventionnelle.	☒

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 3

(دورة 10 يونيو 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Parmi les soins infirmiers en phase aigüe de l'OAP, on note :

A) Mettre le patient en position demi assise, jambes pendantes ;	☐
B) Mettre le patient en position demi assise, jambes surélevées ;	☐
C) Surveiller la diurèse pour bilan d'entrée/sortie à l'aide d'une sonde à demeure ;	☐
D) Mettre en route l'oxygénothérapie par sonde nasale sur prescription médicale.	☐

2) Parmi les soins de prévention des phlébites il y a :

A) Lever précoce ;	☐
B) Mobilisation active et passive des membres inférieurs ;	☐
C) Contention des membres inférieurs sur prescription médicale ;	☐
D) Traitement anticoagulant à visée préventive.	☐

3) Parmi les objectifs des soins palliatifs, c'est de :

A) Soulager la douleur ;	☐
B) Apaiser la souffrance physique ;	☐
C) Réduire l'autonomie du patient ;	☐
D) Sauvegarder la dignité la personne malade.	☐

4) Pour calculer le débit d'une perfusion en pédiatrie :

A) Pour le sang 1ml = 15 gouttes ;	☐
B) Pour les solutés : 1ml = 60 gouttes ;	☐
C) Pour les solutés : 1ml = 20 gouttes ;	☐
D) Pour les solutés : 1ml = 40 gouttes.	☐

5) Les signes cliniques d'une fracture sont :

A) Impotence fonctionnelle ;	☐
B) Déformation et raccourcissement ;	☐
C) Douleur ;	☐
D) Ouverture cutanée.	☐

6) La gravité d'une brûlure est relative à :

A) Sa profondeur ;	☐
B) Son étendue ;	☐
C) Sa localisation ;	☐
D) Sa douleur.	☐

7) Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :

A) Coloration du faciès et des extrémités ;	☐
B) La gazométrie ;	☐
C) L'activité cardiaque ;	☐
D) L'état du flacon barboteur et de la sonde.	☐

8) Les risques immédiats d'une fracture sont :

A) Ruptures vasculaires ;	☐
B) Risque de choc hémodynamique ;	☐
C) Embolie graisseuse ;	☐
D) Embolie gazeuse.	☐

9) Laquelle des fractures suivantes est la plus grave :

A) La fracture ouverte ;	☐
B) La fracture sans déplacement ;	☐
C) La fracture d'un os long avec chevauchement ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

10) Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant, les signes à rechercher sont :

A) La fièvre ;	☐
B) L'état des yeux et le degré de conscience ;	☐
C) La persistance du pli cutanée ;	☐
D) La soif.	☐

11) Parmi les fractures favorisantes des escarres, on note :

A) La dénutrition ;	☐
B) L'obésité ;	☐
C) L'incontinence urinaire ;	☐
D) La rétention urinaire.	☐

12) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;	☐
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang noirâtre par vois anale.	☐

13) L'hémoptysie se définit comme le rejet de sang provenant de :

A) L'estomac ;	☐
B) Des poumons et des bronches ;	☐
C) Du carrefour aéro-digestif ;	☐
D) Des bronches.	☐

14) La systole est une phase du cycle cardiaque où :

A) Le cœur se contracte ;	☐
B) Le sang est expulsé dans les artères ;	☐
C) Le cœur est au repos ;	☐
D) La pression artérielle est à son chiffre minimum.	☐

15) Parmi les variations pathologiques de la respiration, on note :

A) La dyspnée ;	☐
B) La polypnée ;	☐
C) La bradypnée ;	☐
D) Le tirage.	☐

16) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter la malade par sonde naso-gastrique ;	☐
B) Alimenter la malade par voie cœliaque ;	☐
C) Alimenter la malade par voie intraveineuse ;	☐
D) Alimenter la malade par gavage.	☐

17) La diurèse englobe :

A) La mesure quantitative des urines sécrétées ;	☐
B) La mesure quantitative des urines sécrétées leur analyse qualitative ;	☐
C) L'analyse qualitative des urines sécrétées ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

18) Parmi les anomalies de la diurèse, on note :

A) La polydipsie ;	☐
B) L'hématurie ;	☐
C) Polyurie ;	☐
D) Pollakiurie.	☐

19) Quels sont les signes annonciateurs d'une crise d'asthme :

A) Sensation de gênes respiratoire ;	☐
B) Bruits à l'inspiration, sifflements + éternuements associés ;	☐
C) Sensation de poitrine serrée liée à l'obstruction bronchique ;	☐
D) Augmentation du débit expiratoire par rapport à l'état de base.	☐

20) Le débit de la perfusion pour une prescription de SG 5% 500cc/ 4h est de :

A) 30 gouttes/minutes ;	☐
B) 70 gouttes/minutes ;	☐
C) 41 gouttes/minutes ;	☐
D) 45 gouttes/minutes.	☐

21) Devant une hypoglycémie avec des troubles de la conscience, on procède à :

A) Resucrage per os ;	☐
B) La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 30% ;	☐
C) La perfusion en flash de sérum bicarbonate à 14% ;	☐
D) La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 10%.	☐

22) L'acidocétose diabétique survient principalement :

A) Chez les personnes diabétique de type I ;	☐
B) Chez les personnes diabétique de type II ;	☐
C) En cas de diabète gestationnel ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

23) L'acidocétose diabétique s'annonce par :

A) Une polypnée de Kussmaul ;	☐
B) Un vomissement en jet ;	☐
C) Un trouble de la conscience ;	☐
D) Une sécheresse cutaéo-muquese.	☐

24) L'immobilisation plâtrée comporte plusieurs buts qui sont :

A) L'immobilisation d'un segment de membre et des articulation sus et sous -jacentes ;	☐
B) Eviter un déplacement secondaire non désiré ;	☐
C) Le plâtre doit assurer également le confort du patient ;	☐
D) Doit avoir un effet compressif et assure un ralentissement du flux circulatoire.	☐

25) Les indicateurs de l'hémoculture sont :

A) Hyperthermie ;	☐
B) Hypothermie ;	☐
C) Pic fébrile, frissons ;	☐
D) Réalisation d'un antibiogramme.	☐

26) En cas de suspicion d'effet indésirable lors d'une transfusion :

A) Arrêter la transfusion ;	☐
B) Retirer la voie veineuse et appeler le médecin ;	☐
C) Poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion ;	☐
D) Se référer à la procédure d'hémovigilance.	☐

27) Pour un patient groupe A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous :

A) Le plasma frais congelé AB ;	☐
B) La plasma frais congelé O ;	☐
C) Indifféremment AB ou O ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

28) Chez un sujet groupe O, quel est l'antigène (Ag) portés par globules rouges :

A) Ag A ;	☐
B) Ag B ;	☐
C) Ag AB ;	☐
D) Aucun.	☐

29) Les signes de la diarrhée chez un enfant de 0 à 5 ans sont :

A) Des selles molles et aqueuses ;	☐
B) Douleurs et crampes abdominales ;	☐
C) Une somnolence ;	☐
D) Une légère fièvre et des frissons.	☐

30) Les complications de la diarrhée mal traitée sont :

A) La mort par déshydratation ;	☐
B) La malnutrition ;	☐
C) La dysenterie ;	☐
D) La dysphagie.	☐

31) Pour évaluer l'effet de la diarrhée sur l'enfant, on considère les éléments suivants :

A) L'état de la respiration ;	☐
B) L'humidité de la muqueuse buccale ;	☐
C) La faim ;	☐
D) L'état de la peau.	☐

32) Lequel des vaccins suivants n'est pas bactérien ?

A) Le vaccin anti-Haemophilus influenza type b ;	☐
B) Le vaccin anti-Diphtérie ;	☐
C) Le vaccin anti-Tétanos ;	☐
D) Le vaccin anti-Varicelle.	☐

33) Le vaccin antirotavus est administré en :

A) Une seule prise ;	☐
B) Une série de 3 doses ;	☐
C) Une série de 2 doses ;	☐
D) Une série de 5 doses.	☐

34) Les principales maladies à transport hydrique et ou alimentaire sont :

A) Le choléra ;	☐
B) La typhoïde ;	☐
C) La méningite ;	☐
D) Dysenterie.	☐

35) Le diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire se base sur :

A) Les signes cliniques ;	☐
B) L'examen bactériologie des expectorations ;	☐
C) La radiologie pulmonaire ;	☐
D) Le test tuberculinique.	☐

36) Parmi les infections suivantes, indiquez celle (s) parasitaire :

A) La varicelle ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) Le kyste hydatique ;	☐
D) La diphtérie.	☐

37) Laquelle des infections suivantes est-elle transmise par voie digestive :

A) La typhoïde ;	☐
B) La varicelle ;	☐
C) Le kyste hydatique ;	☐
D) La diphtérie.	☐

38) Parmi les maladies cibles du programme national d'immunisation, on note :

A) Le tétanos ;	☐
B) La diphtérie ;	☐
C) Le rotavirus ;	☐
D) La rubéole.	☐

39) Lequel des vaccins suivants ne fait pas partie de PNI :

A) Le BCG ;	☐
B) Le VAT ;	☐
C) Le DTC ;	☐
D) Anti-grippal.	☐

40) La vaccination contre la tuberculose est faite :

A) Dans les 24 heures qui suivent la naissance ;	☐
B) Durant le premier mois qui suit la naissance ;	☐
C) Au troisième mois ;	☐
D) Au 9ème mois.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 3

(دورة 10 يونيو 2018) www.ispits.net

Correction proposée :

1) Parmi les soins infirmiers en phase aigüe de l'OAP, on note :

A) **Mettre le patient en position demi assise, jambes pendantes ;**	☒
B) Mettre le patient en position demi assise, jambes surélevées ;	☐
C) **Surveiller la diurèse pour bilan d'entrée/sortie à l'aide d'une sonde à demeure ;**	☒
D) **Mettre en route l'oxygénothérapie par sonde nasale sur prescription médicale.**	☒

2) Parmi les soins de prévention des phlébites il y a :

A) **Lever précoce ;**	☒
B) **Mobilisation active et passive des membres inférieurs ;**	☒
C) Contention des membres inférieurs sur prescription médicale ;	☐
D) **Traitement anticoagulant à visée préventive.**	☒

3) Parmi les objectifs des soins palliatifs, c'est de :

A) **Soulager la douleur ;**	☒
B) **Apaiser la souffrance physique ;**	☒
C) Réduire l'autonomie du patient ;	☐
D) **Sauvegarder la dignité la personne malade.**	☒

4) Pour calculer le débit d'une perfusion en pédiatrie :

A) **Pour le sang 1ml = 15 gouttes ;**	☒
B) **Pour les solutés : 1ml = 60 gouttes ;**	☒
C) Pour les solutés : 1ml = 20 gouttes ;	☐
D) Pour les solutés : 1ml = 40 gouttes.	☐

5) Les signes cliniques d'une fracture sont :

A) Impotence fonctionnelle ;	☒
B) Déformation et raccourcissement ;	☒
C) Douleur ;	☒
D) Ouverture cutanée.	☐

6) La gravité d'une brûlure est relative à :

A) Sa profondeur ;	☒
B) Son étendue ;	☒
C) Sa localisation ;	☒
D) Sa douleur.	☐

7) Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :

A) Coloration du faciès et des extrémités ;	☒
B) La gazométrie ;	☒
C) L'activité cardiaque ;	☒
D) L'état du flacon barboteur et de la sonde.	☒

8) Les risques immédiats d'une fracture sont :

A) Ruptures vasculaires ;	☒
B) Risque de choc hémodynamique ;	☒
C) Embolie graisseuse ;	☐
D) Embolie gazeuse.	☐

9) Laquelle des fractures suivantes est la plus grave :

A) La fracture ouverte ;	☒
B) La fracture sans déplacement ;	☐
C) La fracture d'un os long avec chevauchement ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

10) Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant, les signes à rechercher sont :

A) La fièvre ;	☐
B) **L'état des yeux et le degré de conscience ;**	☒
C) **La persistance du pli cutanée ;**	☒
D) **La soif.**	☒

11) Parmi les fractures favorisantes des escarres, on note :

A) **La dénutrition ;**	☒
B) **L'obésité ;**	☒
C) **L'incontinence urinaire ;**	☒
D) La rétention urinaire.	☐

12) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) **Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;**	☒
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang noirâtre par vois anale.	☐

13) L'hémoptysie se définit comme le rejet de sang provenant de :

A) L'estomac ;	☐
B) **Des poumons et des bronches ;**	☒
C) Du carrefour aéro-digestif ;	☐
D) Des bronches.	☐

14) La systole est une phase du cycle cardiaque où :

A) **Le cœur se contracte ;**	☒
B) **Le sang est expulsé dans les artères ;**	☒
C) Le cœur est au repos ;	☐
D) La pression artérielle est à son chiffre minimum.	☐

15) Parmi les variations pathologiques de la respiration, on note :

A) La dyspnée ;	☒
B) La polypnée ;	☒
C) La bradypnée ;	☒
D) Le tirage.	☒

16) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter la malade par sonde naso-gastrique ;	☐
B) Alimenter la malade par voie cœliaque ;	☐
C) Alimenter la malade par voie intraveineuse ;	☒
D) Alimenter la malade par gavage.	☐

17) La diurèse englobe :

A) La mesure quantitative des urines sécrétées ;	☐
B) La mesure quantitative des urines sécrétées leur analyse qualitative ;	☒
C) L'analyse qualitative des urines sécrétées ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

18) Parmi les anomalies de la diurèse, on note :

A) La polydipsie ;	☐
B) L'hématurie ;	☒
C) Polyurie ;	☒
D) Pollakiurie.	☒

19) Quels sont les signes annonciateurs d'une crise d'asthme :

A) Sensation de gênes respiratoire ;	☒
B) Bruits à l'inspiration, sifflements + éternuements associés ;	☐
C) Sensation de poitrine serrée liée à l'obstruction bronchique ;	☒
D) Augmentation du débit expiratoire par rapport à l'état de base.	☐

20) Le débit de la perfusion pour une prescription de SG 5% 500cc/ 4h est de :

A) 30 gouttes/minutes ;	☐
B) 70 gouttes/minutes ;	☐
C) 41 gouttes/minutes ;	☒
D) 45 gouttes/minutes.	☐

21) Devant une hypoglycémie avec des troubles de la conscience, on procède à :

A) Resucrage per os ;	☐
B) La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 30% ;	☒
C) La perfusion en flash de sérum bicarbonate à 14% ;	☐
D) La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 10%.	☐

22) L'acidocétose diabétique survient principalement :

A) Chez les personnes diabétique de type I ;	☒
B) Chez les personnes diabétique de type II ;	☐
C) En cas de diabète gestationnel ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

23) L'acidocétose diabétique s'annonce par :

A) Une polypnée de Kussmaul ;	☒
B) Un vomissement en jet ;	☐
C) Un trouble de la conscience ;	☒
D) Une sécheresse cutaéo-muquese.	☒

24) L'immobilisation plâtrée comporte plusieurs buts qui sont :

A) L'immobilisation d'un segment de membre et des articulation sus et sous -jacentes ;	☒
B) Eviter un déplacement secondaire non désiré ;	☒
C) Le plâtre doit assurer également le confort du patient ;	☒
D) Doit avoir un effet compressif et assure un ralentissement du flux circulatoire.	☐

25) Les indicateurs de l'hémoculture sont :

A) Hyperthermie ;	☒
B) Hypothermie ;	☒
C) Pic fébrile, frissons ;	☒
D) Réalisation d'un antibiogramme.	☒

26) En cas de suspicion d'effet indésirable lors d'une transfusion :

A) Arrêter la transfusion ;	☒
B) Retirer la voie veineuse et appeler le médecin ;	☐
C) Poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion ;	☐
D) Se référer à la procédure d'hémovigilance.	☒

27) Pour un patient groupe A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous :

A) Le plasma frais congelé AB ;	☒
B) La plasma frais congelé O ;	☐
C) Indifféremment AB ou O ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

28) Chez un sujet groupe O, quel est l'antigène (Ag) portés par globules rouges :

A) Ag A ;	☐
B) Ag B ;	☐
C) Ag AB ;	☐
D) Aucun.	☒

29) Les signes de la diarrhée chez un enfant de 0 à 5 ans sont :

A) Des selles molles et aqueuses ;	☒
B) Douleurs et crampes abdominales ;	☒
C) Une somnolence ;	☒
D) Une légère fièvre et des frissons.	☒

30) Les complications de la diarrhée mal traitée sont :

A) La mort par déshydratation ;	☒
B) La malnutrition ;	☒
C) La dysenterie ;	☐
D) La dysphagie.	☐

31) Pour évaluer l'effet de la diarrhée sur l'enfant, on considère les éléments suivants :

A) L'état de la respiration ;	☐
B) L'humidité de la muqueuse buccale ;	☒
C) La faim ;	☐
D) L'état de la peau.	☒

32) Lequel des vaccins suivants n'est pas bactérien ?

A) Le vaccin anti-Haemophilus influenza type b ;	☐
B) Le vaccin anti-Diphtérie ;	☐
C) Le vaccin anti-Tétanos ;	☐
D) Le vaccin anti-Varicelle.	☒

33) Le vaccin antirotavus est administré en :

A) Une seule prise ;	☐
B) Une série de 3 doses ;	☒
C) Une série de 2 doses ;	☐
D) Une série de 5 doses.	☐

34) Les principales maladies à transport hydrique et ou alimentaire sont :

A) Le choléra ;	☒
B) La typhoïde ;	☒
C) La méningite ;	☐
D) Dysenterie.	☒

35) Le diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire se base sur :

A) Les signes cliniques ;	☒
B) L'examen bactériologie des expectorations ;	☐
C) La radiologie pulmonaire ;	☐
D) Le test tuberculinique.	☒

36) Parmi les infections suivantes, indiquez celle (s) parasitaire :

A) La varicelle ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) Le kyste hydatique ;	☒
D) La diphtérie.	☐

37) Laquelle des infections suivantes est-elle transmise par voie digestive :

A) La typhoïde ;	☒
B) La varicelle ;	☐
C) Le kyste hydatique ;	☐
D) La diphtérie.	☐

38) Parmi les maladies cibles du programme national d'immunisation, on note :

A) Le tétanos ;	☐
B) La diphtérie ;	☒
C) Le rotavirus ;	☐
D) La rubéole.	☒

39) Lequel des vaccins suivants ne fait pas partie de PNI :

A) Le BCG ;	☐
B) Le VAT ;	☐
C) Le DTC ;	☐
D) Anti-grippal.	☒

40) La vaccination contre la tuberculose est faite :

A) Dans les 24 heures qui suivent la naissance ;	☐
B) **Durant le premier mois qui suit la naissance ;**	☒
C) Au troisième mois ;	☐
D) Au 9ème mois.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 3

(دورة 18 مارس 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Pour le prélèvement sanguin artériel, on ponctionne :

A) L'artère fémorale ;	☐
B) L'artère iliaque commune ;	☐
C) L'artère humérale ;	☐
D) Aucune de ces artères.	☐

2) On réalise un prélèvement artériel pour :

A) Effectuer une des gaz dissous ;	☐
B) Rechercher l'oxygène ct dioxyde de carbone dans le sang ;	☐
C) Rechercher l'oxygène et monoxyde de carbone ;	☐
D) Aucune réponse.	☐

3) Parmi les complications du prélèvement artériel, on note :

A) Le risque hémorragique ;	☐
B) Le risque infectieux ;	☐
C) La gêne respiratoire ;	☐
D) Le risque thrombo-embolique.	☐

4) En d'accident par exposition au sang :

A) Faire saigner ;	☐
B) Ne pas faire saigner ;	☐
C) Nettoyer immédiatement à l'eau ou au savon ;	☐
D) Désinfecter au Javel diluée pendant au moins 5 minutes.	☐

5) Un débit de perfusion est égal au :

A) Volume en ml multiplié par 20 divisé par le temps de passage en minutes pour les solutés ;	☐
B) Volume en cc multiplié par 15 divisé par le temps de passage en minutes les solutés ;	☐
C) Volume en ml multiplié par 15 divisé par le temps de passage en minutes pour le sang ;	☒
D) Volume en cc multiplie par 20 divise par le temps de passage en minutes pour le Sang.	☐

6) Le cathétérisme Sous-cutané a pour objectif :

A) La réhydratation ;	☐
B) L'administration de thérapeutiques ;	☐
C) La surveillance thérapeutique ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

7) Pour le suivi du diabète, les dosages suivants sont nécessaires :

A) Le dosage de de la créatinine ;	☐
B) Le dosage de la glycémie post-prandiale ;	☐
C) Le dosage de la glycosurie ;	☐
D) Le dosage de l'hémoglobine glycosylée.	☐

8) Pour les stades de l'escarre, lesquelles des propositions suivantes sont l'ordre normal :

A) Stade 1 : rougeur de la peau ne disparaissant pas après levée de la pression ;	☐
B) Stade 2 : perte de substance impliquant le tissu cutané avec ou sans découlement périphérique ;	☐
C) Stade 3 : perte Substance impliquant l'épiderme et en partie le derme ;	☐
D) Stade 4 : perte Substance pouvant impliquer l'os, les articulations, les muscles et les tendons.	☐

9) Le pansement d'escarre est un pansement :

A) Propre et non stérile ;	☐
B) Stérile ;	☐
C) Nécessitant l'utilisation d'antiseptique ;	☐
D) Qui ne nécessite pas l'utilisation d'antiseptique.	☐

10) La trachéotomie est une :

A) Incision chirurgicale de la trachée temporaire ;	☐
B) Incision chirurgicale de la trachée définitive ;	☐
C) Incision chirurgicale de la trachée temporaire ou définitive ;	☐
D) Nécessite le port permanent d'une canule en double jeu.	☐

11) En de trachéotomie, le changement de la canule complète se fait :

A) Quotidiennement ;	☐
B) 2 fois par jour ;	☐
C) Aussi souvent que nécessaire ;	☐
D) En cas d'encombrement.	☐

12) En de trachéotomie, le changement de la canule interne se fait :

A) Quotidiennement ;	☐
B) 2 fois par jour ;	☐
C) Aussi souvent que nécessaire ;	☐
D) En cas de sécrétions abondantes.	☐

13) L'alimentation entérale se fait par :

A) Sonde nasogastrique ;	☐
B) Gastrostomie ;	☐
C) Cystostomie ;	☐
D) Toutes ces voies sont possibles.	☐

14) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) est administré :

A) Au niveau de la face postérolatérale de la cuisse gauche pour la 1ère prise ;	☐
B) Au niveau de la face antérolatérale de la cuisse gauche pour la 2ème prise ;	☐
C) Au niveau de la face postérolatérale de la cuisse gauche pour la 2ème prise ;	☐
D) Au niveau du deltoïde peur 3ème prise.	☐

15) Au retour de l'opéré du bloc opératoire, les gestes immédiats à réaliser sont :

A) Surveiller le degré de conscience du patient ;	☐
B) Installer l'opéré plat, tête sur le côté avec oreiller ;	☐
C) Surveiller les paramètres vitaux du patient ;	☐
D) Surveiller du risque hémorragique.	☐

16) Lequel des éléments suivants n'est pas un dispositif de chirurgie :

A) Le drain de Redon ;	☐
B) La lame de Delbet ;	☐
C) Le drain de Kehl ;	☐
D) Le cathéter de Foley.	☐

17) La gravité d'une brûlure se mesure par :

A) Sa profondeur ;	☐
B) Son étendue ;	☐
C) Sa localisation ;	☐
D) Sa douleur.	☐

18) La température recommandée pour conservation des vaccins au niveau du centre de santé doit :

A) Egalé à 4°C ;	☐
B) Comprise entre +2 et +8°C ;	☐
C) Comprise entre +4 et +12°C ;	☐
D) Supérieur à +8°C.	☐

19) Au retour d'un tuberculeux après interruption du traitement, les éléments à évaluer sont :

A) Son état d'immunité ;	☐
B) Le degré de rémission de la maladie au cours du traitement précèdent ;	☐
C) L'état de conscience du patient ;	☐
D) La sensibilité du bacille aux médicaments.	☐

20) Les risques immédiats d'une fracture sont :

A) Ruptures vasculaires ;	☐
B) Risque de choc hémodynamique ;	☐
C) Embolie graisseuse ;	☐
D) Embolie gazeuse.	☐

21) Les signes cliniques d'une fracture d'un os long sont :

A) Importance fonctionnelle ;	☐
B) Déformation et raccourcissement ;	☐
C) Douleur ;	☐
D) Hématome.	☐

22) Laquelle des fractures suivantes est la plus grave :

A) La fracture ouverte ;	☐
B) La fracture sans déplacement ;	☐
C) La fracture d'un os long avec chevauchement ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

23) L'infection à Haemophilus influenza type B :

A) Est la cause fréquente des méningites du bactériennes du nourrisson ;	☐
B) Engendre des séquelles neurosensorielles ;	☐
C) Est responsable de pneumonie ;	☐
D) Engendre une mortalité importante.	☐

24) La convulsion est chez un enfant :

A) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements non contrôlés ;	☐
B) Une perle progressive de la conscience accompagnée de mouvements volontaires ;	☐
C) Une perte soudaine de la conscience accompagnée de mouvements non contrôlés ;	☐
D) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements non volontaires.	☐

25) Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :

A) Coloration du faciès et des extrémités ;	☐
B) La gazométrie ;	☐
C) L'activité cardiaque ;	☐
D) L'état du flacon barboteur et de la sonde.	☐

26) Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant, les signes à rechercher sont :

A) La fièvre ;	☐
B) L'état des yeux et de la conscience ;	☐
C) La persistance du pli cutané ;	☐
D) La faim.	☐

27) Parmi les principes des injections, les quantités du produit permises sont :

A) Quelques gouttes dans le derme ;	☐
B) 5 cc dans le muscle ;	☐
C) Grandes doses en intraveineuse ;	☐
D) 10 cc en sous cutané.	☐

28) Les complications d'une injection intraveineuse sont :

A) Allergie au produit injecté ;	☐
B) Hématome ;	☐
C) Perte de conscience ;	☐
D) Douleur.	☐

29) La diphtérie :

A) Une maladie contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer ;	☐
B) Une maladie virale contagieuse causée par le de Koch ;	☐
C) Une maladie bactérienne contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer ;	☐
D) Une maladie qui se développe dans l'arrière gorge et secrète une exotoxine.	☐

30) Parmi les complications de la perfusion, on note :

A) La lymphangite ;	☐
B) L'escarre ;	☐
C) L'infection ;	☐
D) La déshydratation.	☐

31) On peut réaliser une injection sous-cutanée au niveau des sites suivants :

A) Le tiers moyen du bas ;	☐
B) Le tiers moyen de la cuisse, face antérieure ;	☐
C) Le tiers moyen de la cuisse, face postérieure ;	☐
D) Les faces latérales de la région abdominale.	☐

32) Les sites d'injection intradermique sont :

A) Les faces internes et externes de l'avant-bras ;	☐
B) La face externe du bras ;	☐
C) La face latérale de la cuisse ;	☐
D) Le dos.	☐

33) Les indications d'une injection intradermique sont :

A) Vaccination ;	☐
B) Test d'Elisa ;	☐
C) Test la tuberculine ;	☐
D) Test de Widal.	☐

34) Au retour d'un tuberculeux après l'abandon du traitement, il faut :

A) Faire 3 frottis d'expectoration ;	☐
B) Renouveler le traitement immédiatement ;	☐
C) Résoudre, si possible, le problème qui a causé l'interruption ;	☐
D) Ne pas donner de traitement en attendant les résultats.	☐

35) Le vaccin contre la tuberculose est administré :

A) A la dose de 0,05 ml chez l'enfant de moins de 5 ans ;	☐
B) A la dose 0,05 ml l'enfant de moins d'un an ;	☐
C) A la dose 0,1 ml chez l'enfant de plus d'un an ;	☐
D) En dose unique le plus tôt après la naissance.	☐

36) L'oreillon :

A) Une maladie infectieuse contagieuse ;	☐
B) Est d'origine bactérienne ;	☐
C) Peu avoir comme complication la surdité ;	☐
D) Atteint les glandes salivaires.	☐

37) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à :

A) Un taux inférieur à 50% ;	☒
B) Un taux inférieur à 25% ;	☐
C) Un taux inférieur à 20% ;	☐
D) Un taux inférieur à 10%.	☐

38) II est contre indiqué d'administrer à la femme enceinte :

A) Le vaccin contre le tétanos ;	☐
B) Le vaccin contre la rubéole ;	☐
C) Le vaccin contre la poliomyélite ;	☐
D) Le vaccin contre la tuberculose.	☐

39) Le vaccin penta (DTC, Hib, HB) est administre au niveau de :

A) La partie antéro-interne de la cuisse droite ;	☐
B) La partie antéro-interne de la cuisse gauche ;	☐
C) La partie antéro-externe de la cuisse droite ;	☐
D) La partie antéro- interne de la cuisse gauche.	☐

40) Le tirage est :

A) Un bruit particulier survenant à l'inspiration ;	☐
B) Un bruit particulier survenant à l'expiration ;	☐
C) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l'inspiration ;	☐
D) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l'expiration.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان المعامل : 3

www.ispits.net

(دورة 18 مارس 2018)

Correction proposée :

1) Pour le prélèvement sanguin artériel, on ponctionne :

A) **L'artère fémorale ;**	☒
B) L'artère iliaque commune ;	☐
C) **L'artère humérale ;**	☒
D) Aucune de ces artères.	☐

2) On réalise un prélèvement artériel pour :

A) **Effectuer une des gaz dissous ;**	☒
B) Rechercher l'oxygène ct dioxyde de carbone dans le sang ;	☐
C) Rechercher l'oxygène et monoxyde de carbone ;	☐
D) Aucune réponse.	☐

3) Parmi les complications du prélèvement artériel, on note :

A) **Le risque hémorragique ;**	☒
B) **Le risque infectieux ;**	☒
C) La gêne respiratoire ;	☐
D) **Le risque thrombo-embolique.**	☒

4) En d'accident par exposition au sang :

A) Faire saigner ;	☐
B) **Ne pas faire saigner ;**	☒
C) **Nettoyer immédiatement à l'eau ou au savon ;**	☒
D) **Désinfecter au Javel diluée pendant au moins 5 minutes.**	☒

5) Un débit de perfusion est égal au :

A) **Volume en ml multiplié par 20 divisé par le temps de passage en minutes pour les solutés ;**	☒
B) Volume en cc multiplié par 15 divisé par le temps de passage en minutes les solutés ;	☐
C) **Volume en ml multiplié par 15 divisé par le temps de passage en minutes pour le sang ;**	☒
D) Volume en cc multiplie par 20 divise par le temps de passage en minutes pour le Sang.	☐

6) Le cathétérisme Sous-cutané a pour objectif :

A) **La réhydratation ;**	☒
B) **L'administration de thérapeutiques ;**	☒
C) La surveillance thérapeutique ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

7) Pour le suivi du diabète, les dosages suivants sont nécessaires :

A) **Le dosage de de la créatinine ;**	☒
B) **Le dosage de la glycémie post-prandiale ;**	☒
C) **Le dosage de la glycosurie ;**	☒
D) **Le dosage de l'hémoglobine glycosylée.**	☒

8) Pour les stades de l'escarre, lesquelles des propositions suivantes sont l'ordre normal :

A) **Stade 1 : rougeur de la peau ne disparaissant pas après levée de la pression ;**	☒
B) Stade 2 : perte de substance impliquant le tissu cutané avec ou sans découlement périphérique ;	☐
C) Stade 3 : perte Substance impliquant l'épiderme et en partie le derme ;	☐
D) **Stade 4 : perte Substance pouvant impliquer l'os, les articulations, les muscles et les tendons.**	☒

9) Le pansement d'escarre est un pansement :

A) Propre et non stérile ;	☐
B) **Stérile ;**	☒
C) Nécessitant l'utilisation d'antiseptique ;	☐
D) **Qui ne nécessite pas l'utilisation d'antiseptique.**	☒

10) La trachéotomie est une :

A) Incision chirurgicale de la trachée temporaire ;	☒
B) Incision chirurgicale de la trachée définitive ;	☐
C) Incision chirurgicale de la trachée temporaire ou définitive ;	☐
D) Nécessite le port permanent d'une canule en double jeu.	☒

11) En de trachéotomie, le changement de la canule complète se fait :

A) Quotidiennement ;	☐
B) 2 fois par jour ;	☐
C) Aussi souvent que nécessaire ;	☒
D) En cas d'encombrement.	☐

12) En de trachéotomie, le changement de la canule interne se fait :

A) Quotidiennement ;	☐
B) 2 fois par jour ;	☐
C) Aussi souvent que nécessaire ;	☒
D) En cas de sécrétions abondantes.	☒

13) L'alimentation entérale se fait par :

A) Sonde nasogastrique ;	☒
B) Gastrostomie ;	☒
C) Cystostomie ;	☐
D) Toutes ces voies sont possibles.	☐

14) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) est administré :

A) Au niveau de la face postérolatérale de la cuisse gauche pour la 1ère prise ;	☐
B) Au niveau de la face antérolatérale de la cuisse gauche pour la 2ème prise ;	☒
C) Au niveau de la face postérolatérale de la cuisse gauche pour la 2ème prise ;	☐
D) Au niveau du deltoïde peur 3ème prise.	☒

15) Au retour de l'opéré du bloc opératoire, les gestes immédiats à réaliser sont :

A) Surveiller Le degré de conscience du patient ;	☒
B) Installer l'opéré plat, tête sur le côté avec oreiller ;	☐
C) Surveiller les paramètres vitaux du patient ;	☒
D) Surveiller du risque hémorragique.	☒

16) Lequel des éléments suivants n'est pas un dispositif de chirurgie :

A) Le drain de Redon ;	☐
B) La lame de Delbet ;	☐
C) Le drain de Kehl ;	☐
D) Le cathéter de Foley.	☒

17) La gravité d'une brûlure se mesure par :

A) Sa profondeur ;	☒
B) Son étendue ;	☒
C) Sa localisation ;	☒
D) Sa douleur.	☐

18) La température recommandée pour conservation des vaccins au niveau du centre de santé doit :

A) Egalé à 4°C ;	☐
B) Comprise entre +2 et +8°C ;	☒
C) Comprise entre +4 et +12°C ;	☐
D) Supérieur à +8°C.	☐

19) Au retour d'un tuberculeux après interruption du traitement, les éléments à évaluer sont :

A) Son état d'immunité ;	☐
B) Le degré de rémission de la maladie au cours du traitement précèdent ;	☐
C) L'état de conscience du patient ;	☐
D) La sensibilité du bacille aux médicaments.	☒

20) Les risques immédiats d'une fracture sont :

A) **Ruptures vasculaires ;**	☒
B) **Risque de choc hémodynamique ;**	☒
C) Embolie graisseuse ;	☐
D) Embolie gazeuse.	☐

21) Les signes cliniques d'une fracture d'un os long sont :

A) **Importance fonctionnelle ;**	☒
B) **Déformation et raccourcissement ;**	☒
C) **Douleur ;**	☒
D) **Hématome.**	☒

22) Laquelle des fractures suivantes est la plus grave :

A) **La fracture ouverte ;**	☒
B) La fracture sans déplacement ;	☐
C) La fracture d'un os long avec chevauchement ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

23) L'infection à Haemophilus influenza type B :

A) **Est la cause fréquente des méningites du bactériennes du nourrisson ;**	☒
B) **Engendre des séquelles neurosensorielles ;**	☒
C) **Est responsable de pneumonie ;**	☒
D) **Engendre une mortalité importante.**	☒

24) La convulsion est chez un enfant :

A) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements non contrôlés ;	☐
B) Une perle progressive de la conscience accompagnée de mouvements volontaires ;	☐
C) **Une perte soudaine de la conscience accompagnée de mouvements non contrôlés ;**	☒
D) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements non volontaires.	☐

25) Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :

A) Coloration du faciès et des extrémités ;	☒
B) La gazométrie ;	☒
C) L'activité cardiaque ;	☒
D) L'état du flacon barboteur et de la sonde.	☒

26) Pour évaluer la déshydratation chez l'enfant, les signes à rechercher sont :

A) La fièvre ;	☐
B) L'état des yeux et de la conscience ;	☒
C) La persistance du pli cutané ;	☒
D) La faim.	☐

27) Parmi les principes des injections, les quantités du produit permises sont :

A) Quelques gouttes dans le derme ;	☒
B) 5 cc dans le muscle ;	☒
C) Grandes doses en intraveineuse ;	☒
D) 10 cc en sous cutané.	☐

28) Les complications d'une injection intraveineuse sont :

A) Allergie au produit injecté ;	☒
B) Hématome ;	☒
C) Perte de conscience ;	☐
D) Douleur.	☒

29) La diphtérie :

A) Une maladie contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer ;	☐
B) Une maladie virale contagieuse causée par le de Koch ;	☐
C) Une maladie bactérienne contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer ;	☒
D) Une maladie qui se développe dans l'arrière gorge et secrète une exotoxine.	☒

30) Parmi les complications de la perfusion, on note :

A) La lymphangite ;	☒
B) L'escarre ;	☒
C) L'infection ;	☒
D) La déshydratation.	☐

31) On peut réaliser une injection sous-cutanée au niveau des sites suivants :

A) Le tiers moyen du bas ;	☒
B) Le tiers moyen de la cuisse, face antérieure ;	☒
C) Le tiers moyen de la cuisse, face postérieure ;	☐
D) Les faces latérales de la région abdominale.	☒

32) Les sites d'injection intradermique sont :

A) Les faces internes et externes de l'avant-bras ;	☐
B) La face externe du bras ;	☒
C) La face latérale de la cuisse ;	☐
D) Le dos.	☒

33) Les indications d'une injection intradermique sont :

A) Vaccination ;	☒
B) Test d'Elisa ;	☐
C) Test la tuberculine ;	☒
D) Test de Widal.	☐

34) Au retour d'un tuberculeux après l'abandon du traitement, il faut :

A) Faire 3 frottis d'expectoration ;	☒
B) Renouveler le traitement immédiatement ;	☐
C) Résoudre, si possible, le problème qui a causé l'interruption ;	☒
D) Ne pas donner de traitement en attendant les résultats.	☒

35) Le vaccin contre la tuberculose est administré :

A) A la dose de 0,05 ml chez l'enfant de moins de 5 ans ;	☐
B) A la dose 0,05 ml l'enfant de moins d'un an ;	☒
C) A la dose 0,1 ml chez l'enfant de plus d'un an ;	☒
D) En dose unique le plus tôt après la naissance.	☒

36) L'oreillon :

A) Une maladie infectieuse contagieuse ;	☒
B) Est d'origine bactérienne ;	☐
C) Peu avoir comme complication la surdité ;	☒
D) Atteint les glandes salivaires.	☒

37) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à :

A) Un taux inférieur à 50% ;	☒
B) Un taux inférieur à 25% ;	☐
C) Un taux inférieur à 20% ;	☐
D) Un taux inférieur à 10%.	☐

38) II est contre indiqué d'administrer à la femme enceinte :

A) Le vaccin contre le tétanos ;	☐
B) Le vaccin contre la rubéole ;	☒
C) Le vaccin contre la poliomyélite ;	☒
D) Le vaccin contre la tuberculose.	☒

39) Le vaccin penta (DTC, Hib, HB) est administre au niveau de :

A) La partie antéro-interne de la cuisse droite ;	☐
B) La partie antéro-interne de la cuisse gauche ;	☐
C) La partie antéro-externe de la cuisse droite ;	☒
D) La partie antéro- interne de la cuisse gauche.	☐

40) Le tirage est :

A) Un bruit particulier survenant à l'inspiration ;	☐
B) Un bruit particulier survenant à l'expiration ;	☐
C) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l'inspiration ;	☒
D) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l'expiration.	☐

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La vaccination au Maroc commence :

A) Immédiatement après la naissance ;	☐
B) A une semaine de la naissance ;	☐
C) A six semaine de la naissance ;	☐
D) A dix semaine de la naissance.	☐

2) Le programme de vaccination au Maroc vise à prévenir les maladies suivantes :

A) L'hépatite virale C ;	☐
B) L'hépatite virale B ;	☐
C) La rubéole ;	☐
D) La varicelle.	☐

3) La prophylaxie correspond aux :

A) Mesures entreprises pour traiter les cas ;	☐
B) Mesures entreprises pour éviter la survenue de la maladie ;	☐
C) Mesures entreprises pour éviter la contagion de la maladie ;	☐
D) Actions entreprises pour la prise en charge psychologique de l'entourage du malade.	☐

4) On appelle population à besoins spécifiques :

A) Les femmes enceintes ;	☐
B) Les personnes en situation d'handicap ;	☐
C) Les personnes âgées ;	☐
D) Les jeunes en chômage.	☐

5) Actuellement, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) Un enfant par femme ;	☐
B) Deux enfants par femme ;	☐
C) Trois enfants par femme ;	☐
D) Quatre enfants par femme ;	☐

6) Parmi les hôpitaux suivants, lequel qui a un statut particulier :

A) L'hôpital local ;	☐
B) L'hôpital provincial ;	☐
C) L'hôpital régional ;	☐
D) L'hôpital universitaire.	☐

7) Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale :

A) Une infection d'origine nasale ;	☐
B) Une infection dont le malade est déjà porteur lors de son hospitalisation ;	☐
C) Une infection absente à l'entrée du patient qui apparait au moins 48h après l'admission ;	☐
D) Une infection véhiculée en permanence par la population.	☐

8) Le lavage simple des mains se réalise :

A) Avant et après toute action d'un patient ;	☐
B) Après avoir manipulé des objets souillés ;	☐
C) Par un savonnage d'une durée de six minutes ;	☐
D) Avant et après tout soin auprès d'un patient infecté.	☐

9) Une tachycardie est :

A) Une accélération du rythme cardiaque ;	☐
B) Une diminution du rythme cardiaque ;	☐
C) Une irrégularité du rythme cardiaque ;	☐
D) Une palpitation.	☐

10) Une polypnée est :

A) Un arrêt momentané de la respiration ;	☐
B) Une ralentissement du rythme respiratoire ;	☐
C) Une difficulté à respirer ;	☐
D) Une accélération du rythme respiratoire.	☐

11) Immédiatement devant une piqure d'aiguille souillée, il faut :

A) Faire saigner puis laver vos mains ;	☐
B) Nettoyer la surface à l'eau courante et au savon puis rincer ;	☐
C) Mettre un pansement légèrement compressif ;	☐
D) Voir le médecin du travail pour vous dispenser les premiers soins.	☐

12) Un malade en décubitus dorsal est prédisposé à faire :

A) Des infections urinaires ;	☐
B) Des escarres ;	☐
C) Des constipations ;	☐
D) Des vomissements à répétition.	☐

13) La prévention des complications urinaires chez les malades alités se fait par :

A) Des massages cutanés ;	☐
B) La surveillance de l'aspect, la couleur et l'odeur des urines ;	☐
C) Donner à boire beaucoup d'eau ;	☐
D) La sonde urinaire à demeure.	☐

14) La prise en charge des malades cancéreux est du ressort :

A) Du ministère de la santé ;	☐
B) De tous les intervenants ;	☐
C) Des associations seulement ;	☐
D) Des familles seulement.	☐

15) Le diagnostic de certitude d'une tumeur du foie est réalisé par :

A) L'échographie ;	☐
B) L'IRM ;	☐
C) Le biopsie ;	☐
D) L'examen anatomopathologique.	☐

16) Devant un malade sous plâtre d'un membre, il faut surveiller :

A) La conscience du malade ;	☐
B) La couleur du membre plâtré ;	☐
C) La tension artérielle ;	☐
D) La sensibilité du membre.	☐

17) Devant un membre plâtré, il faut redouter les complications cutanées suivantes :

A) L'escarre ;	☐
B) L'infection ;	☐
C) L'embolie ;	☐
D) La paralysie.	☐

18) On conseille à la mère d'un enfant de moins de 5 ans, diarrhéique de lui donner :

A) Des antibiotiques ;	☐
B) Boire de l'eau ;	☐
C) Manger plus ;	☐
D) De réduire l'apport alimentaire pour stopper sa diarrhée.	☐

19) Votre patiente a des rougeurs au niveau du sacrum et des talons, vous notez sur son dossier :

A) Présence d'un abcès sacré et aux talons ;	☐
B) Présence d'un érythème au niveau sacré et aux talons ;	☐
C) Présence des escarres au niveau sacré et aux talons ;	☐
D) Présence de phlyctènes au niveau sacré et aux talons.	☐

20) Pour cette même patiente, quel soin préventif doit être mis en œuvre :

A) Massage avec pétrissage et décollement des plans cutanés ;	☐
B) Application de la Bétadine sur les zones touchées ;	☐
C) Changement de position pour soulager les points d'appui ;	☐
D) Mettre du coton cadré sous les zones touchées.	☐

21) Une courbe de température est dite « en plateau » est observée dans les maladies suivantes :

A) La grippe ;	☐
B) La méningite ;	☐
C) La typhoïde ;	☐
D) La tuberculose.	☐

22) La position proclive signifie :

A) Que le malade est installé jambes surélevées ;	☐
B) Que le malade est installé tête et thorax surélevées ;	☐
C) Que le malade est installé tête et thorax en position basse ;	☐
D) Que le malade est installé en position demi assisse.	☐

23) La position déclive signifie :

A) Que le malade est installé jambes surélevées ;	☐
B) Que le malade est installé tête et thorax surélevées ;	☐
C) Que le malade est installé tête et thorax en position basse ;	☐
D) Que le malade est installé en position demi assisse.	☐

24) La fréquence constante et habituelle d'une maladie dans un territoire est :

A) Une épidémie ;	☐
B) Une endémie ;	☐
C) Une pandémie ;	☐
D) Une maladie sporadique.	☐

25) Les pathologies prioritaires dans le plan d'action du ministère de la santé 2012-2016 sont :

A) La pathologie cancéreuse ;	☐
B) La pathologie sanguine ;	☐
C) La pathologie mentale ;	☐
D) La pathologie digestive.	☐

26) Un porteur de germe :

A) Peut-être un porteur sain sans signes de maladie ;	☐
B) Peut-être un porteur chronique ;	☐
C) Est une personne qui va assurer la diffusion de l'agent pathogène dans la collectivité ;	☐
D) Peut-être un incubant précoce.	☐

27) Au Maroc, la prévention de l'hépatite B est basée sur :

A) Le dépistage prénatal ;	☐
B) Le dépistage en transfusion sanguine ;	☐
C) Le traitement antiviral ;	☐
D) Le dépistage prénuptial.	☐

28) La ponction d'ascite peut se compliquer par :

A) Une hypertension ;	☐
B) Une hypotension ;	☐
C) Une déshydratation ;	☐
D) Une infection.	☐

29) Devant un malade diabétique qui présente des malaises, il faut :

A) Donner du sucre ;	☐
B) Injecter de l'insuline en sous cutanée ;	☐
C) Donner des sulfamides hypoglycémiants ;	☐
D) Injecter de l'insuline et donner des sulfamides hypoglycémiants .	☐

30) Les complications aigues du diabète sont :

A) Le coma hyperosmolaire ;	☐
B) Le coma hypoglycémique ;	☐
C) L'obésité ;	☐
D) Le goitre.	☐

31) Une pleurésie est une inflammation :

A) Du poumon ;	☐
B) Des bronches ;	☐
C) Des bronchioles ;	☐
D) La plèvres.	☐

32) L'occlusion intestinale se caractérise par :

A) Des douleurs abdominales, des vomissements, et une fièvre ;	☐
B) Des douleurs abdominales, des vomissements, et un arrêt des matières et des gaz ;	☒
C) Des douleurs abdominales et des contractions abdominales ;	☐
D) Des douleurs abdominales, des vomissements et des diarrhées.	☐

33) Les diurétiques ont un effet sur :

A) Augmentation de la diurèse ;	☐
B) L'élévation de la TA ;	☐
C) La résolution des œdèmes ;	☐
D) La diminution du poids.	☐

34) Devant une asthénie, un amaigrissement, un toux persistance, on suspecte :

A) Un asthme bronchique ;	☐
B) Une tuberculose pulmonaire ;	☐
C) Une pleurésie ;	☐
D) Une tuberculose ganglionnaire.	☐

35) On appelle « nursing » :

A) Ensemble d'examens médicaux ;	☐
B) Ensemble de soins infirmiers ;	☐
C) Ensemble de traitements administrés à un malade ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

36) Les précautions à prendre avant de démarrer une transfusion sanguine sont :

A) Vérifier la température du malade ;	☐
B) Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang ;	☐
C) Vérifier la date de péremption du sang ;	☐
D) Faire un test d'hypersensibilité.	☐

37) Devant quels signes, vous devez arrêter la transfusion à votre malade :

A) Une légère augmentation de sa température ;	☐
B) Une prurit diffus ;	☐
C) Des céphalées ;	☐
D) Sensation de douleur abdominale.	☐

38) Une hémorragie abondante peut se compliquer par :

A) Hypertension artérielle ;	☐
B) L'anémie ;	☐
C) Le choc hémorragique ;	☐
D) Le choc anaphylactique.	☐

39) Le (les) maladie(s) qui est (sont) transmise(s) par voie respiratoire sont :

A) L'asthme ;	☐
B) Grippe H1N1 ;	☐
C) Tuberculose ;	☐
D) Kyste hydatique du poumon.	☐

40) Hématémèse se définit comme :

A) Selles avec du sang ;	☐
B) Vomissements de sang ;	☐
C) Crachats avec du sang ;	☐
D) Salive avec du sang.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس - وجدة -

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

(دورة 09 دجنبر 2018)

Correction proposée :

1) La vaccination au Maroc commence :

A) **Immédiatement après la naissance ;**	☒
B) A une semaine de la naissance ;	☐
C) A six semaine de la naissance ;	☐
D) A dix semaine de la naissance.	☐

2) Le programme de vaccination au Maroc vise à prévenir les maladies suivantes :

A) L'hépatite virale C ;	☐
B) **L'hépatite virale B ;**	☒
C) **La rubéole ;**	☒
D) La varicelle.	☐

3) La prophylaxie correspond aux :

A) Mesures entreprises pour traiter les cas ;	☐
B) **Mesures entreprises pour éviter la survenue de la maladie ;**	☒
C) Mesures entreprises pour éviter la contagion de la maladie ;	☐
D) Actions entreprises pour la prise en charge psychologique de l'entourage du malade.	☐

4) On appelle population à besoins spécifiques :

A) Les femmes enceintes ;	☐
B) **Les personnes en situation d'handicap ;**	☒
C) **Les personnes âgées ;**	☒
D) Les jeunes en chômage.	☐

5) Actuellement, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) Un enfant par femme ;	☐
B) Deux enfants par femme ;	☒
C) Trois enfants par femme ;	☐
D) Quatre enfants par femme ;	☐

6) Parmi les hôpitaux suivants, lequel qui a un statut particulier :

A) L'hôpital local ;	☐
B) L'hôpital provincial ;	☐
C) L'hôpital régional ;	☐
D) L'hôpital universitaire.	☒

7) Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale :

A) Une infection d'origine nasale ;	☐
B) Une infection dont le malade est déjà porteur lors de son hospitalisation ;	☐
C) Une infection absente à l'entrée du patient qui apparait au moins 48h après l'admission ;	☒
D) Une infection véhiculée en permanence par la population.	☐

8) Le lavage simple des mains se réalise :

A) Avant et après toute action d'un patient ;	☒
B) Après avoir manipulé des objets souillés ;	☒
C) Par un savonnage d'une durée de six minutes ;	☐
D) Avant et après tout soin auprès d'un patient infecté.	☐

9) Une tachycardie est :

A) Une accélération du rythme cardiaque ;	☒
B) Une diminution du rythme cardiaque ;	☐
C) Une irrégularité du rythme cardiaque ;	☐
D) Une palpitation.	☐

10) Une polypnée est :

A) Un arrêt momentané de la respiration ;	☐
B) Une ralentissement du rythme respiratoire ;	☐
C) Une difficulté à respirer ;	☐
D) **Une accélération du rythme respiratoire.**	☒

11) Immédiatement devant une piqure d'aiguille souillée, il faut :

A) Faire saigner puis laver vos mains ;	☐
B) **Nettoyer la surface à l'eau courante et au savon puis rincer ;**	☒
C) Mettre un pansement légèrement compressif ;	☐
D) Voir le médecin du travail pour vous dispenser les premiers soins.	☐

12) Un malade en décubitus dorsal est prédisposé à faire :

A) **Des infections urinaires ;**	☒
B) **Des escarres ;**	☒
C) **Des constipations ;**	☒
D) Des vomissements à répétition.	☐

13) La prévention des complications urinaires chez les malades alités se fait par :

A) Des massages cutanés ;	☐
B) **La surveillance de l'aspect, la couleur et l'odeur des urines ;**	☒
C) Donner à boire beaucoup d'eau ;	☐
D) La sonde urinaire à demeure.	☐

14) La prise en charge des malades cancéreux est du ressort :

A) Du ministère de la santé ;	☐
B) **De tous les intervenants ;**	☒
C) Des associations seulement ;	☐
D) Des familles seulement.	☐

15) Le diagnostic de certitude d'une tumeur du foie est réalisé par :

A) L'échographie ;	☐
B) L'IRM ;	☐
C) Le biopsie ;	☐
D) **L'examen anatomopathologique.**	☒

16) Devant un malade sous plâtre d'un membre, il faut surveiller :

A) La conscience du malade ;	☐
B) **La couleur du membre plâtré ;**	☒
C) La tension artérielle ;	☐
D) **La sensibilité du membre.**	☒

17) Devant un membre plâtré, il faut redouter les complications cutanées suivantes :

A) **L'escarre ;**	☒
B) **L'infection ;**	☒
C) L'embolie ;	☐
D) La paralysie.	☐

18) On conseille à la mère d'un enfant de moins de 5 ans, diarrhéique de lui donner :

A) Des antibiotiques ;	☐
B) **Boire de l'eau ;**	☒
C) **Manger plus ;**	☒
D) De réduire l'apport alimentaire pour stopper sa diarrhée.	☐

19) Votre patiente a des rougeurs au niveau du sacrum et des talons, vous notez sur son dossier :

A) Présence d'un abcès sacré et aux talons ;	☐
B) **Présence d'un érythème au niveau sacré et aux talons ;**	☒
C) Présence des escarres au niveau sacré et aux talons ;	☐
D) Présence de phlyctènes au niveau sacré et aux talons.	☐

20) Pour cette même patiente, quel soin préventif doit être mis en œuvre :

A) Massage avec pétrissage et décollement des plans cutanés ;	☐
B) Application de la Bétadine sur les zones touchées ;	☐
C) Changement de position pour soulager les points d'appui ;	☒
D) Mettre du coton cadré sous les zones touchées.	☐

21) Une courbe de température est dite « en plateau » est observée dans les maladies suivantes :

A) La grippe ;	☐
B) La méningite ;	☒
C) La typhoïde ;	☒
D) La tuberculose.	☐

22) La position proclive signifie :

A) Que le malade est installé jambes surélevées ;	☐
B) Que le malade est installé tête et thorax surélevées ;	☒
C) Que le malade est installé tête et thorax en position basse ;	☐
D) Que le malade est installé en position demi assisse.	☐

23) La position déclive signifie :

A) Que le malade est installé jambes surélevées ;	☒
B) Que le malade est installé tête et thorax surélevées ;	☐
C) Que le malade est installé tête et thorax en position basse ;	☐
D) Que le malade est installé en position demi assisse.	☐

24) La fréquence constante et habituelle d'une maladie dans un territoire est :

A) Une épidémie ;	☐
B) Une endémie ;	☒
C) Une pandémie ;	☐
D) Une maladie sporadique.	☐

25) Les pathologies prioritaires dans le plan d'action du ministère de la santé 2012-2016 sont :

A) **La pathologie cancéreuse ;**	☒
B) La pathologie sanguine ;	☐
C) La pathologie mentale ;	☐
D) La pathologie digestive.	☐

26) Un porteur de germe :

A) **Peut-être un porteur sain sans signes de maladie ;**	☒
B) **Peut-être un porteur chronique ;**	☒
C) **Est une personne qui va assurer la diffusion de l'agent pathogène dans la collectivité ;**	☒
D) **Peut-être un incubant précoce.**	☒

27) Au Maroc, la prévention de l'hépatite B est basée sur :

A) Le dépistage prénatal ;	☐
B) **Le dépistage en transfusion sanguine ;**	☒
C) Le traitement antiviral ;	☐
D) Le dépistage prénuptial.	☐

28) La ponction d'ascite peut se compliquer par :

A) Une hypertension ;	☐
B) **Une hypotension ;**	☒
C) **Une déshydratation ;**	☒
D) **Une infection.**	☒

29) Devant un malade diabétique qui présente des malaises, il faut :

A) **Donner du sucre ;**	☒
B) Injecter de l'insuline en sous cutanée ;	☐
C) Donner des sulfamides hypoglycémiants ;	☐
D) Injecter de l'insuline et donner des sulfamides hypoglycémiants .	☐

30) Les complications aigues du diabète sont :

A) Le coma hyperosmolaire ;	☒
B) Le coma hypoglycémique ;	☒
C) L'obésité ;	☒
D) Le goitre.	☐

31) Une pleurésie est une inflammation :

A) Du poumon ;	☐
B) Des bronches ;	☐
C) Des bronchioles ;	☐
D) La plèvres.	☒

32) L'occlusion intestinale se caractérise par :

A) Des douleurs abdominales, des vomissements, et une fièvre ;	☐
B) Des douleurs abdominales, des vomissements, et un arrêt des matières et des gaz ;	☒
C) Des douleurs abdominales et des contractions abdominales ;	☐
D) Des douleurs abdominales, des vomissements et des diarrhées.	☐

33) Les diurétiques ont un effet sur :

A) Augmentation de la diurèse ;	☒
B) L'élévation de la TA ;	☐
C) La résolution des œdèmes ;	☒
D) La diminution du poids.	☒

34) Devant une asthénie, un amaigrissement, un toux persistance, on suspecte :

A) Un asthme bronchique ;	☐
B) Une tuberculose pulmonaire ;	☒
C) Une pleurésie ;	☐
D) Une tuberculose ganglionnaire.	☐

35) On appelle « nursing » :

A) Ensemble d'examens médicaux ;	☐
B) **Ensemble de soins infirmiers ;**	☒
C) Ensemble de traitements administrés à un malade ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

36) Les précautions à prendre avant de démarrer une transfusion sanguine sont :

A) **Vérifier la température du malade ;**	☒
B) **Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang ;**	☒
C) **Vérifier la date de péremption du sang ;**	☒
D) **Faire un test d'hypersensibilité.**	☒

37) Devant quels signes, vous devez arrêter la transfusion à votre malade :

A) **Une légère augmentation de sa température ;**	☒
B) **Une prurit diffus ;**	☒
C) **Des céphalées ;**	☒
D) **Sensation de douleur abdominale.**	☒

38) Une hémorragie abondante peut se compliquer par :

A) Hypertension artérielle ;	☐
B) **L'anémie ;**	☒
C) **Le choc hémorragique ;**	☒
D) Le choc anaphylactique.	☐

39) Le (les) maladie(s) qui est (sont) transmise(s) par voie respiratoire sont :

A) L'asthme ;	☐
B) **Grippe H1N1 ;**	☒
C) **Tuberculose ;**	☒
D) Kyste hydatique du poumon.	☐

40) Hématémèse se définit comme :

A) Selles avec du sang ;	☐
B) **Vomissements de sang ;**	☒
C) Crachats avec du sang ;	☐
D) Salive avec du sang.	☐

2017

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة " الدرجة الثانية "

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : 3 ساعات

(دورة 17 شتنبر 2017)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Le processus de stérilisation comporte :

A) La pré-désinfection ;	☐
B) La désinfection ;	☐
C) Le rinçage ;	☐
D) Le conditionnement.	☐

2) La tension artérielle orthostatique, c'est :

A) Une hypertension sévère ;	☐
B) Une hypotension modérée ;	☐
C) Une tension artérielle pinée ;	☐
D) La variation de la TA entre les positions assise et couchée.	☐

3) Les complications de l'alitement prolongé sont :

A) L'infection urinaire ;	☐
B) L'encombrement bronchique ;	☐
C) La fonte musculaire ;	☐
D) L'arythmie cardiaque.	☐

4) Le premier lever chez l'opéré dépend de :

A) La nature et du siège de l'intervention ;	☐
B) L'état général du patient ;	☐
C) L'état de la plaie opératoire ;	☐
D) La pathologie.	☐

5) Le plan de soins représente d'un des outils de travail des équipes soignantes :

A) Il permet la formalisation des différentes étapes de la démarche de soins ;	☐
B) C'est un support de transmission opérationnel pour les soignants ;	☐
C) Aide à la décision, à la résolution des problèmes vécus par le patient ;	☐
D) Il permet la pose du diagnostic médical.	☐

6) Les objectifs du soin de bouche en réanimation sont :

A) Diminuer les risques de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique ;	☐
B) Favoriser le confort du patient ;	☐
C) Appliquer des médicaments locaux ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

7) Les avantages du premier lever chez l'opéré :

A) Faciliter le transit intestinal ;	☐
B) Baisser la température du corps du patient ;	☐
C) Faciliter la circulation sanguine ;	☐
D) Permettre au malade de prendre son autonomie.	☐

8) Parmi les symptômes de l'œdème aigue du poumon, on note :

A) Une difficulté respiratoire grave et soudaine avec suffocation ;	☐
B) Une orthopnée ;	☐
C) Des expectorations spumeuses et rosées ;	☐
D) Pouls faible et rapide.	☐

9) A l'accueil d'un cas d'œdème aigue du poumon, il faut veiller à :

A) L'installation du patient en chambre individualisée ;	☐
B) L'installation du patient en position décubitus dorsal ;	☐
C) L'installation du patient en position ½ assise, jambes pendantes ;	☐
D) Surveillance des paramètres vitaux tous les ¼ d'heure puis toutes les ½ heure.	☐

10) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter le malade par sonde nasogastrique ;	☐
B) Alimenter le malade par voie cœliaque ;	☐
C) Alimenter le malade par voie intraveineuse ;	☐
D) Alimenter le malade par gavage.	☐

11) Le débit de la perfusion pour une prescription de SG 5% 500cc/ 4h est de :

A) 30 gouttes/minute ;	☐
B) 41 gouttes/minute ;	☐
C) 70 gouttes/minute ;	☐
D) 45 gouttes/minute.	☐

12) Pour éviter les hypoglycémies, on conseil aux personnes diabétiques de :

A) Sauter des repas ou des collations ;	☐
B) Avoir au moins 3 sucres et une collation à portée de main ;	☐
C) Connaitre les mesures à adopter lors d'une activité physique ;	☐
D) Respecter les traitements prescrits, leurs dosages et leurs horaires.	☐

13) Pour transfuser un patient de groupe A^+, vous disposez du culot globulaire AB^+, B^+ et O^+ , vous utilisez :

A) Le culot globulaire **AB^+** ;	☐
B) Le culot globulaire **O^+**;	☐
C) Le culot globulaire **AB^+ et O^+** ;	☐
D) Le culot globulaire **B^+**.	☐

14) En cas de transfuser par concentrés de globules rouges, le « seuil transfusionnel » est à :

A) 12 g/dl d'hémoglobine chez la femme ;	☐
B) 18 g/dl d'hémoglobine chez l'homme ;	☐
C) 7 g/dl d'hémoglobine chez les patients sans antécédent particulier ;	☐
D) 10 g/dl en cas de pathologie cardiaque.	☐

15) Devant une hypoglycémie avec des troubles de la conscience, on procède à :

A) Resucrage per os ;	☐
B) La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 30 % ;	☐
C) La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 10 %;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

16) Les éléments de surveillance et d'évaluation de la diurèse sont :

A) La quantité des urines collectées ;	☐
B) L'aspect des urines ;	☐
C) La couleur et l'odeur des urines ;	☐
D) La présence d'albumine.	☐

17) Dans le cadre de la transfusion, le groupe AB :

A) Contient des antigènes anti-A sur ses hématies ;	☐
B) Ne contient pas d'anticorps dans son plasma ;	☐
C) Contient des antigènes anti-B sur ses hématies ;	☐
D) Contient des antigènes anti-A et anti-B sur ses hématies .	☐

18) Dans 1 ml de sang à transfuser, il y a :

A) 10 gouttes ;	☐
B) 15 gouttes ;	☐
C) 20 gouttes ;	☐
D) 23 gouttes.	☐

19) La transfusion de plaquettes est indiquée pour :

A) Stopper une hémorragie ;	☐
B) Prévenir une l'hémorragie ;	☐
C) Traiter l'aplasie qui suit une chimiothérapie ;	☐
D) Traiter une anémie.	☐

20) Parmi les risques et complications transfusionnels, on note :

A) Les risques immunologiques ;	☐
B) Les risques infectieux ;	☐
C) Les problèmes de surcharge ;	☐
D) Les problèmes métaboliques.	☐

21) Avant la pose du sondage vésical, il faut vérifier :

A) L'identité du patient ;	☐
B) Si le patient possède une couverture médicale ;	☐
C) Prescription médicale conforme ;	☐
D) L'étanchéité du matériel.	☐

22) Les différentes actions des pansements sont :

A) Action cicatrisante ;	☐
B) Action désinfectante ;	☐
C) Action antalgique ;	☐
D) Action absorbante.	☐

23) La colostomie définitive est indiquée dans les cas suivants :

A) Carcinome du recto-sigmoïde ;	☐
B) Traumatisme du colon gauche ;	☐
C) Rectorragie incontrôlable ;	☐
D) Maladies inflammatoires du colon.	☐

24) Il faut traiter la fièvre chez l'enfant si :

A) Elle persiste puis de deux jours ;	☐
B) Elle dépasse 38,5°C ;	☐
C) Votre enfant est âgé de moins de trois mois ;	☐
D) Vomissement.	☐

25) Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

A) La méningite purulente ;	☐
B) Les infections ORL ;	☐
C) L'abcès du cerveau ;	☐
D) Le traumatisme crânien.	☐

26) Pour confirmer une déshydratation sévère de l'enfant, on cherche :

A) La persistance du pli cutané ;	☐
B) L'irritable et l'état des yeux enfoncés ;	☐
C) Le degré de la soif ;	☐
D) La température du corps.	☐

27) Pour le diagnostic de la diarrhée chez l'enfant, on cherche :

A) Le nombre de selles quotidiennes ;	☐
B) L'aspect et consistance des selles ;	☐
C) La persistance du pli cutané ;	☐
D) La durée de la diarrhée.	☐

28) Parmi les complications du vomissement chez l'enfant, on note :

A) Perte de poids et du périmètre crânien ;	☐
B) Déshydratation ;	☐
C) Perturbation hydro-électrolytique ;	☐
D) Perte de la conscience.	☐

29) Les indications de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A) Encombrement bronchique ;	☐
B) Patient intubé ;	☐
C) Patient trachéotomisé ;	☐
D) La toux chronique.	☐

30) Les indications du cathétérisme central sont :

A) Pour avoir un débit de perfusion important ;	☐
B) Voie d'abord veineuse périphérique inexploitable ;	☐
C) Nécessité d'une mesure de la pression veineuse centrale ;	☐
D) Accident de la voie publique.	☐

31) Les comas diabétiques sont :

A) Le coma acido-cétosique ;	☐
B) Le coma acidose lactose ;	☐
C) Le coma hyperosmolaire ;	☐
D) Le coma hypoglycémique.	☐

32) L'acidocétose diabétique est :

A) Une urgence médicale ;	☐
B) Une décompensation métabolique du diabète type II ;	☐
C) Marquée par une hyperglycémie ;	☐
D) Marquée par une cétonémie.	☐

33) Parmi les signes cliniques de l'acidocétose diabétique, on note :

A) Une dyspnée acidosique de Kussmaul avec une mauvaise haleine ;	☐
B) Une déshydratation importante ;	☐
C) L'obnubilation de la conscience avec signes de pré-coma ;	☐
D) L'hyperthermie.	☐

34) L'infection nosocomiale est une infection :

A) Portée par le patient avant l'hospitalisation ;	☐
B) Transmise du personnel au patient ;	☐
C) Attaquée par le patient après 48 heures d'hospitalisation ;	☐
D) Attaquée par le patient après 72 heures d'hospitalisation.	☐

35) Parmi les causes de l'infection nosocomiale, on note une défaillance dans :

A) L'hygiène des personnes ;	☐
B) L'hygiène hôtelière ;	☐
C) L'hygiène du matériel ;	☐
D) L'hygiène lors des techniques de soins.	☐

36) Les indications de l'hémodialyse sont :

A) Insuffisance rénale aigue ;	☐
B) Intoxication médicamenteuses ;	☐
C) Rétention hydro-sodée ;	☐
D) Troubles sévères de la thermorégulation.	☐

37) La glycémie capillaire :

A) Correspond au taux de glucose pris par dextro ;	☐
B) Sert dans la surveillance du diabétique ;	☐
C) Donne le taux exact du glucose dans le sang ;	☐
D) Sert à dépister un trouble biologique.	☐

38) Les objectifs de l'hémoculture sont :

A) Identification de germes ;	☐
B) Poser ou confirmer un diagnostic ;	☐
C) Chercher les signes cliniques ;	☐
D) Réalisation d'un antibiogramme.	☐

39) L'examen d'hémoculture est :

A) Réalisé idéalement lors d'un pic fiévreux ;	☐
B) Réalisé idéalement lorsque la température du corps baisse;	☐
C) Sera répété 3 fois à des intervalles de 1 à 3 heures ;	☐
D) Sera répété 2 fois à une heure intervalle.	☐

40) Parmi les incidents et les accidents d'hémoculture, on note :

A) Accident d'exposition au sang pour les soignants ;	☐
B) Présence d'hématome aux points de ponction ;	☐
C) Malaise vagal ;	☐
D) La pénétration d'air dans les flacons anaérobies.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة " الدرجة الثانية "

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : 3 ساعات

(دورة 17 شتنبر 2017)

www.ispits.net

Correction proposée :

1) Le processus de stérilisation comporte :

A) **La pré-désinfection ;**	☒
B) La désinfection ;	☐
C) **Le rinçage ;**	☒
D) **Le conditionnement.**	☒

2) La tension artérielle orthostatique, c'est :

A) Une hypertension sévère ;	☐
B) Une hypotension modérée ;	☐
C) Une tension artérielle pinée ;	☐
D) **La variation de la TA entre les positions assise et couchée.**	☒

3) Les complications de l'alitement prolongé sont :

A) **L'infection urinaire ;**	☒
B) **L'encombrement bronchique ;**	☒
C) **La fonte musculaire ;**	☒
D) L'arythmie cardiaque.	☐

4) Le premier lever chez l'opéré dépend de :

A) **La nature et du siège de l'intervention ;**	☒
B) **L'état général du patient ;**	☒
C) L'état de la plaie opératoire ;	☐
D) La pathologie.	☐

5) Le plan de soins représente d'un des outils de travail des équipes soignantes :

A) **Il permet la formalisation des différentes étapes de la démarche de soins ;**	☒
B) **C'est un support de transmission opérationnel pour les soignants ;**	☒
C) **Aide à la décision, à la résolution des problèmes vécus par le patient ;**	☒
D) Il permet la pose du diagnostic médical.	☐

6) Les objectifs du soin de bouche en réanimation sont :

A) **Diminuer les risques de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique ;**	☒
B) **Favoriser le confort du patient ;**	☒
C) **Appliquer des médicaments locaux ;**	☒
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

7) Les avantages du premier lever chez l'opéré :

A) **Faciliter le transit intestinal ;**	☒
B) Baisser la température du corps du patient ;	☐
C) **Faciliter la circulation sanguine ;**	☒
D) **Permettre au malade de prendre son autonomie.**	☒

8) Parmi les symptômes de l'œdème aigue du poumon, on note :

A) **Une difficulté respiratoire grave et soudaine avec suffocation ;**	☒
B) **Une orthopnée ;**	☒
C) **Des expectorations spumeuses et rosées ;**	☒
D) Pouls faible et rapide.	☐

9) A l'accueil d'un cas d'œdème aigue du poumon, il faut veiller à :

A) L'installation du patient en chambre individualisée ;	☐
B) L'installation du patient en position décubitus dorsal ;	☐
C) **L'installation du patient en position ½ assise, jambes pendantes ;**	☒
D) **Surveillance des paramètres vitaux tous les ¼ d'heure puis toutes les ½ heure.**	☒

10) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter le malade par sonde nasogastrique ;	☐
B) Alimenter le malade par voie cœliaque ;	☐
C) Alimenter le malade par voie intraveineuse ;	☒
D) Alimenter le malade par gavage.	☐

11) Le débit de la perfusion pour une prescription de SG 5% 500cc/ 4h est de :

A) 30 gouttes/minute ;	☐
B) 41 gouttes/minute ;	☒
C) 70 gouttes/minute ;	☐
D) 45 gouttes/minute.	☐

12) Pour éviter les hypoglycémies, on conseil aux personnes diabétiques de :

A) Sauter des repas ou des collations ;	☐
B) Avoir au moins 3 sucres et une collation à portée de main ;	☒
C) Connaitre les mesures à adopter lors d'une activité physique ;	☒
D) Respecter les traitements prescrits, leurs dosages et leurs horaires.	☒

13) Pour transfuser un patient de groupe A^+, vous disposez du culot globulaire AB^+, B^+ et O^+ , vous utilisez :

A) Le culot globulaire **AB^+** ;	☐
B) Le culot globulaire O^+;	☒
C) Le culot globulaire **AB^+ et O^+** ;	☐
D) Le culot globulaire **B^+**.	☐

14) En cas de transfuser par concentrés de globules rouges, le « seuil transfusionnel » est à :

A) 12 g/dl d'hémoglobine chez la femme ;	☐
B) 18 g/dl d'hémoglobine chez l'homme ;	☐
C) 7 g/dl d'hémoglobine chez les patients sans antécédent particulier ;	☒
D) 10 g/dl en cas de pathologie cardiaque.	☒

15) Devant une hypoglycémie avec des troubles de la conscience, on procède à :

A) Resucrage per os ;	☐
B) **La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 30 % ;**	☒
C) La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 10 %;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

16) Les éléments de surveillance et d'évaluation de la diurèse sont :

A) **La quantité des urines collectées ;**	☒
B) **L'aspect des urines ;**	☒
C) **La couleur et l'odeur des urines ;**	☒
D) La présence d'albumine.	☐

17) Dans le cadre de la transfusion, le groupe AB :

A) Contient des antigènes anti-A sur ses hématies ;	☐
B) **Ne contient pas d'anticorps dans son plasma ;**	☒
C) Contient des antigènes anti-B sur ses hématies ;	☐
D) Contient des antigènes anti-A et anti-B sur ses hématies .	☐

18) Dans 1 ml de sang à transfuser, il y a :

A) 10 gouttes ;	☐
B) **15 gouttes;**	☒
C) 20 gouttes;	☐
D) 23 gouttes**.**	☐

19) La transfusion de plaquettes est indiquée pour :

A) **Stopper une hémorragie ;**	☒
B) **Prévenir une l'hémorragie ;**	☒
C) **Traiter l'aplasie qui suit une chimiothérapie ;**	☒
D) Traiter une anémie.	☐

20) Parmi les risques et complications transfusionnels, on note :

A) Les risques immunologiques ;	☒
B) Les risques infectieux ;	☒
C) Les problèmes de surcharge ;	☒
D) Les problèmes métaboliques.	☐

21) Avant la pose du sondage vésical, il faut vérifier :

A) L'identité du patient ;	☒
B) Si le patient possède une couverture médicale ;	☐
C) Prescription médicale conforme ;	☒
D) L'étanchéité du matériel.	☒

22) Les différentes actions des pansements sont :

A) Action cicatrisante ;	☒
B) Action désinfectante ;	☒
C) Action antalgique ;	☒
D) Action absorbante.	☒

23) La colostomie définitive est indiquée dans les cas suivants :

A) Carcinome du recto-sigmoïde ;	☒
B) Traumatisme du colon gauche ;	☐
C) Rectorragie incontrôlable ;	☐
D) Maladies inflammatoires du colon.	☐

24) Il faut traiter la fièvre chez l'enfant si :

A) Elle persiste puis de deux jours ;	☐
B) Elle dépasse 38,5°C ;	☒
C) Votre enfant est âgé de moins de trois mois ;	☐
D) Vomissement.	☐

25) Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

A) La méningite purulente ;	☒
B) Les infections ORL ;	☒
C) L'abcès du cerveau ;	☒
D) Le traumatisme crânien.	☒

26) Pour confirmer une déshydratation sévère de l'enfant, on cherche :

A) La persistance du pli cutané ;	☒
B) L'irritable et l'état des yeux enfoncés ;	☒
C) Le degré de la soif ;	☒
D) La température du corps.	☐

27) Pour le diagnostic de la diarrhée chez l'enfant, on cherche :

A) Le nombre de selles quotidiennes ;	☒
B) L'aspect et consistance des selles ;	☒
C) La persistance du pli cutané ;	☐
D) La durée de la diarrhée.	☒

28) Parmi les complications du vomissement chez l'enfant, on note :

A) Perte de poids et du périmètre crânien ;	☐
B) Déshydratation ;	☒
C) Perturbation hydro-électrolytique ;	☒
D) Perte de la conscience.	☐

29) Les indications de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A) Encombrement bronchique ;	☒
B) Patient intubé ;	☒
C) Patient trachéotomisé ;	☒
D) La toux chronique.	☐

30) Les indications du cathétérisme central sont :

A) Pour avoir un débit de perfusion important ;	☒
B) Voie d'abord veineuse périphérique inexploitable ;	☒
C) Nécessité d'une mesure de la pression veineuse centrale ;	☒
D) Accident de la voie publique.	☐

31) Les comas diabétiques sont :

A) Le coma acido-cétosique ;	☒
B) Le coma acidose lactose ;	☐
C) Le coma hyperosmolaire ;	☒
D) Le coma hypoglycémique.	☒

32) L'acidocétose diabétique est :

A) Une urgence médicale ;	☒
B) Une décompensation métabolique du diabète type II ;	☒
C) Marquée par une hyperglycémie ;	☒
D) Marquée par une cétonémie.	☐

33) Parmi les signes cliniques de l'acidocétose diabétique, on note :

A) Une dyspnée acidosique de Kussmaul avec une mauvaise haleine ;	☒
B) Une déshydratation importante ;	☒
C) L'obnubilation de la conscience avec signes de pré-coma ;	☒
D) L'hyperthermie.	☐

34) L'infection nosocomiale est une infection :

A) Portée par le patient avant l'hospitalisation ;	☐
B) Transmise du personnel au patient ;	☐
C) Attaquée par le patient après 48 heures d'hospitalisation ;	☒
D) Attaquée par le patient après 72 heures d'hospitalisation.	☐

35) Parmi les causes de l'infection nosocomiale, on note une défaillance dans :

A) L'hygiène des personnes ;	☒
B) L'hygiène hôtelière ;	☒
C) L'hygiène du matériel ;	☒
D) L'hygiène lors des techniques de soins.	☒

36) Les indications de l'hémodialyse sont :

A) Insuffisance rénale aigue ;	☒
B) Intoxication médicamenteuses ;	☒
C) Rétention hydro-sodée ;	☐
D) Troubles sévères de la thermorégulation.	☒

37) La glycémie capillaire :

A) Correspond au taux de glucose pris par dextro ;	☒
B) Sert dans la surveillance du diabétique ;	☒
C) Donne le taux exact du glucose dans le sang ;	☐
D) Sert à dépister un trouble biologique.	☒

38) Les objectifs de l'hémoculture sont :

A) Identification de germes ;	☒
B) Poser ou confirmer un diagnostic ;	☒
C) Chercher les signes cliniques ;	☐
D) Réalisation d'un antibiogramme.	☒

39) L'examen d'hémoculture est :

A) Réalisé idéalement lors d'un pic fiévreux ;	☒
B) Réalisé idéalement lorsque la température du corps baisse;	☒
C) Sera répété 3 fois à des intervalles de 1 à 3 heures ;	☐
D) Sera répété 2 fois à une heure intervalle.	☒

40) Parmi les incidents et les accidents d'hémoculture, on note :

A) Accident d'exposition au sang pour les soignants ;	☒
B) Présence d'hématome aux points de ponction ;	☒
C) Malaise vagal ;	☒
D) La pénétration d'air dans les flacons anaérobies.	☒

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة " الدرجة الأولى "

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : 3 ساعات

(دورة 17 شتنبر 2017)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Parmi les maladies donnant lieu à désinfection obligatoire, on note :

A) La peste ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) Les leishmanioses ;	☐
D) Le syndrome respiratoire aigu sévère.	☐

2) Les vaccins administrés à la naissance sont :

A) BCG + Anti-Polio VPo + Anti-HVB1	☐
B) BCG + Anti-Polio VPo	☐
C) BCG + Anti-Polio VPo + Anti-HVB1+DTC1	☐
D) BCG + Anti-Polio VPo + DTC1	☐

3) Parmi les maladies donnant lieu à désinsectisation obligatoire, on note :

A) Le choléra ;	☐
B) Les Fièvres typhoïde et paratyphoïdes ;	☐
C) Le paludisme ;	☐
D) La leptospirose.	☐

4) Parmi les maladies donnant lieu à dératisation, on note :

A) La peste ;	☐
B) Le typhus exanthématique ;	☐
C) La leptospirose ;	☐
D) Les rickettsioses.	☐

5) Quelles sont parmi les maladies suivantes celles qui sont à déclaration obligatoire :

A) Les leishmanioses ;	☐
B) Le charbon humain ;	☐
C) La brucellose ;	☐
D) Les hépatites virales.	☐

6) Le vaccin contre l'hépatite virale B est administré selon le calendrier suivant :

A) La 2ème durant le 1er mois ;	☐
B) La 2ème à 2 mois ;	☐
C) La 3ème à 3 mois ;	☐
D) La 4ème à 4 mois.	☐

7) Le vaccin pentavalent se compose de :

A) Vaccin anti BCG-DTC-polio ;	☐
B) Vaccin anti DTC-Hib-HB ;	☐
C) Vaccin DTC-RR ;	☐
D) Vaccin anti DTC-Hib-HB- VPI.	☐

8) Le vaccin contre la coqueluche se compose de :

A) Germes vivant atténués ;	☐
B) Germes inactivés entiers ;	☐
C) Polysaccharides ;	☐
D) Protéines.	☐

9) Lequel des vaccins suivants ne fait pas partie du PNI :

A) Le BCG ;	☐
B) Le VAT ;	☐
C) Le DTC ;	☐
D) Anti-grippal.	☐

10) Les principales maladies à transport hydrique et ou alimentaire sont :

A) Le choléra ;	☐
B) La typhoïde ;	☐
C) L'hépatite B ;	☐
D) Dysenterie.	☐

11) La typhoïde :

A) Est une toxi-infection ;	☐
B) Son agent causal est la salmonella thyphi ;	☐
C) Elle est transmise par voie gastro-intestinale ;	☐
D) C'est une maladie manuportée.	☐

12) La typhoïde se transmet par :

A) Les aliments et les fruits non lavés ;	☐
B) Les mains sales ;	☐
C) La viande mal cuite ;	☐
D) L'eau potable.	☐

13) Les facteurs favorisant le risque des maladies à transport hydrique et ou alimentaire sont :

A) Le niveau socio-économique ;	☐
B) La pollution des ressources en eau ;	☐
C) La cigarette et l'alcool ;	☐
D) La rareté de l'eau, la sécheresse.	☐

14) La tuberculose est une maladie :

A) Causée par une bactérie ;	☐
B) Causée par un virus ;	☐
C) A déclaration obligatoire ;	☐
D) Sociale.	☐

15) Le diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire se base sur :

A) Les signes cliniques ;	☐
B) L'examen bactériologique des expectorations ;	☐
C) La radiologie pulmonaire ;	☐
D) Le test tuberculinique.	☐

16) La vaccination contre la tuberculose est faite :

A) Dans les 24 heures qui suivent la naissance ;	☐
B) Durant le premier mois qui suit la naissance ;	☐
C) Au troisième mois	☐
D) Au 9ème mois.	☐

17) En épidémiologie la prévalence désigne :

A) L'état de santé d'une population à un moment donné ;	☐
B) Le nombre de cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;	☐
C) L'état de santé d'une population pendant une période donnée ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

18) En épidémiologie le taux d'incidence rapporte :

A) L'état de santé d'une population à un moment donné ;	☐
B) Le nombre de nouveaux cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;	☐
C) L'état de santé d'une population pendant une période donnée ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

19) L'épidémiologie vise à quantifier l'état de santé des populations, permettant ainsi :

A) L'identification des problèmes de santé ;	☐
B) La priorisation des problèmes de santé ;	☐
C) La planification d'actions pour résoudre ces problèmes ;	☐
D) L'évaluation des actions mises en place.	☐

20) Les formes de méningite sont :

A) La méningite à méningocoques ;	☐
B) La méningite à pneumocoques ;	☐
C) La méningite virale ;	☐
D) La méningite cérébro-intestinale.	☐

21) Les signes de la méningite purulente chez l'enfant sont :

A) La fièvre ;	☐
B) Les troubles digestifs ;	☐
C) Une hypotonie des muscles du cou ;	☐
D) La raideur de la nuque.	☐

22) Laquelle des maladies suivantes n'est pas immunisante :

A) La grippe ;	☐
B) La rougeole ;	☐
C) La varicelle ;	☐
D) La typhoïde.	☐

23) En épidémiologie le terme « endémique » réfère à la présence constante d'une maladie :

A) A une période donnée ;	☐
B) Dans une région géographique particulière ;	☐
C) Dans une population particulière ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

24) En épidémiologie le terme « épidémie » veut dire :

A) Le nombre de cas d'une maladie supérieur à ce qui est attendu normalement dans une population ;	☐
B) Le nombre de cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;	☐
C) Le nombre de nouveaux cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;	☐
D) Le nombre de cas sporadique d'une pathologie observés pendant une période donnée.	☐

25) Parmi les différentes branches de l'épidémiologie, on distingue :

A) L'épidémiologie descriptive ;	☐
B) L'épidémiologie prospective ;	☐
C) L'épidémiologie analytique ;	☐
D) L'épidémiologie évaluative.	☐

26) Lesquelles des indicateurs suivants ne font pas partie des indicateurs épidémiologiques :

A) Le taux d'attaque ;	☐
B) Le taux de recrutement ;	☐
C) Le taux de létalité ;	☐
D) Le taux de morbidité.	☐

27) Dans le cadre du programme national de santé reproductive, le counseling aide le couple à :

A) Décider de l'utilisation d'un contraceptif ;	☐
B) Lutter contre les fausses rumeurs ;	☐
C) Donner les contraceptifs disponibles ;	☐
D) Renseigner sur les effets secondaires des différents contraceptifs.	☐

28) La ligature tubaire. Comme méthode contraceptive volontaire, peut être réalisée chez une femme :

A) Désireuse de contraception permanente et qui ne présente pas de contre-indications ;	☐
B) Mariée, âgée de 30 à 45 ans ;	☐
C) Ayant au moins trois enfants ;	☐
D) L'âge du dernier enfant doit être supérieur à deux ans.	☐

29) La syphilis secondaire est marquée après 3 semaines environ d'incubation par :

A) L'apparition du chancre ;	☐
B) L'adénopathie satellite ;	☐
C) Une fièvre pouvant atteindre 39°C – 39,5°C ;	☐
D) Des céphalées avec syndrome méningé.	☐

30) La syphilis est une maladie :

A) Infectieuse contagieuse ;	☐
B) Sexuellement transmissible ;	☐
C) Parasitaire ;	☐
D) Due à treponema pallidum.	☐

31) L'hépatite A se transmet essentiellement par :

A) Piqure lors des soins par une aiguille souillée ;	☐
B) Des liquides biologiques souillés ;	☐
C) L'absorption d'eau ou d'aliments souillés ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

32) Parmi les infections suivantes, lesquelles sont dites opportunistes en cas de SIDA :

A) La candidose œsophagienne ;	☐
B) L'herpès mucocutané ;	☐
C) La tuberculose ;	☐
D) Le paludisme.	☐

33) Dans le cadre de la prise en charge intégrée de l'enfant malade à domicile, conseiller à la mère :

A) D'augmenter la consommation de liquides ;	☐
B) Maintenir l'alimentation ;	☐
C) Revenir en cas d'aggravation de l'état de l'enfant ;	☐
D) Donner des antibiotiques.	☐

34) Pour placer un dispositif intra-utérin chez une femme, celle-ci doit être :

A) Mariée ;	☐
B) En âge de procréer et ayant des enfants ;	☐
C) Désireuse d'une contraception de longue durée ;	☐
D) Ne présentant aucune contre-indication à la pose du dispositif intra-utérin.	☐

35) La syphilis primaire est marquée après 3 semaines environ d'incubation par :

A) L'apparition du chancre ;	☐
B) L'adénopathie satellite ;	☐
C) Une fièvre pouvant atteindre 39°C - 39,5°C ;	☐
D) Des céphalées avec syndrome méningé.	☐

36) La prévention de la fièvre typhoïde se fait par :

A) La vaccination ;	☐
B) L'hygiène des mains et des aliments ;	☐
C) L'antibiothérapie ;	☐
D) La consommation de l'eau potable.	☐

37) La transmission de la rougeole se fait par voie :

A) Cutanée ;	☐
B) Aérienne ;	☐
C) Sanguine ;	☐
D) Digestive.	☐

38) Parmi les infections suivantes laquelle est parasitaire :

A) La varicelle ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) Le kyste hydatique ;	☐
D) La diphtérie.	☐

39) Laquelle des infections suivantes est-elle transmise par voie digestive :

A) La varicelle ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) La typhoïde ;	☐
D) La diphtérie.	☐

40) Lesquelles des infections suivantes sont-elles virales :

A) La varicelle ;	☐
B) La diphtérie ;	☐
C) Le tétanos ;	☐
D) La rougeole.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة " الدرجة الأولى "

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : 3 ساعات

(دورة 17 شتنبر 2017)

Correction proposée :

1) Parmi les maladies donnant lieu à désinfection obligatoire, on note :

A) **La peste ;**	☒
B) **La tuberculose ;**	☒
C) Les leishmanioses ;	☐
D) Le syndrome respiratoire aigu sévère.	☐

2) Les vaccins administrés à la naissance sont :

A) **BCG + Anti-Polio VPo + Anti-HVB1**	☒
B) BCG + Anti-Polio VPo	☐
C) BCG + Anti-Polio VPo + Anti-HVB1+DTC1	☐
D) BCG + Anti-Polio VPo + DTC1	☐

3) Parmi les maladies donnant lieu à désinsectisation obligatoire, on note :

A) **Le choléra ;**	☒
B) **Les Fièvres typhoïde et paratyphoïdes ;**	☒
C) **Le paludisme ;**	☒
D) La leptospirose.	☐

4) Parmi les maladies donnant lieu à dératisation, on note :

A) **La peste ;**	☒
B) Le typhus exanthématique ;	☐
C) **La leptospirose ;**	☒
D) **Les rickettsioses.**	☒

5) Quelles sont parmi les maladies suivantes celles qui sont à déclaration obligatoire :

A) Les leishmanioses ;	☒
B) Le charbon humain ;	☒
C) La brucellose ;	☒
D) Les hépatites virales.	☒

6) Le vaccin contre l'hépatite virale B est administré selon le calendrier suivant :

A) La 2ème durant le 1er mois ;	☐
B) La 2ème à 2 mois ;	☒
C) La 3ème à 3 mois ;	☒
D) La 4ème à 4 mois.	☒

7) Le vaccin pentavalent se compose de :

A) Vaccin anti BCG-DTC-polio ;	☐
B) Vaccin anti DTC-Hib-HB ;	☒
C) Vaccin DTC-RR ;	☐
D) Vaccin anti DTC-Hib-HB- VPI.	☐

8) Le vaccin contre la coqueluche se compose de :

A) Germes vivant atténués ;	☐
B) Germes inactivés entiers ;	☒
C) Polysaccharides ;	☐
D) Protéines.	☐

9) Lequel des vaccins suivants ne fait pas partie du PNI :

A) Le BCG ;	☐
B) Le VAT ;	☐
C) Le DTC ;	☐
D) Anti-grippal.	☒

10) Les principales maladies à transport hydrique et ou alimentaire sont :

A) Le choléra ;	☒
B) La typhoïde ;	☒
C) L'hépatite B ;	☐
D) Dysenterie.	☒

11) La typhoïde :

A) Est une toxi-infection ;	☒
B) Son agent causal est la salmonella thyphi ;	☒
C) Elle est transmise par voie gastro-intestinale ;	☐
D) C'est une maladie manuportée.	☒

12) La typhoïde se transmet par :

A) Les aliments et les fruits non lavés ;	☒
B) Les mains sales ;	☒
C) La viande mal cuite ;	☐
D) L'eau potable.	☐

13) Les facteurs favorisant le risque des maladies à transport hydrique et ou alimentaire sont :

A) Le niveau socio-économique ;	☒
B) La pollution des ressources en eau ;	☒
C) La cigarette et l'alcool ;	☐
D) La rareté de l'eau, la sécheresse.	☒

14) La tuberculose est une maladie :

A) Causée par une bactérie ;	☒
B) Causée par un virus ;	☐
C) A déclaration obligatoire ;	☒
D) Sociale.	☒

15) Le diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire se base sur :

A) **Les signes cliniques ;**	☒
B) L'examen bactériologique des expectorations ;	☐
C) La radiologie pulmonaire ;	☐
D) **Le test tuberculinique.**	☒

16) La vaccination contre la tuberculose est faite :

A) Dans les 24 heures qui suivent la naissance ;	☐
B) **Durant le premier mois qui suit la naissance ;**	☒
C) Au troisième mois	☐
D) Au 9ème mois.	☐

17) En épidémiologie la prévalence désigne :

A) L'état de santé d'une population à un moment donné ;	☐
B) **Le nombre de cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;**	☒
C) L'état de santé d'une population pendant une période donnée ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

18) En épidémiologie le taux d'incidence rapporte :

A) L'état de santé d'une population à un moment donné ;	☐
B) **Le nombre de nouveaux cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;**	☒
C) L'état de santé d'une population pendant une période donnée ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

19) L'épidémiologie vise à quantifier l'état de santé des populations, permettant ainsi :

A) **L'identification des problèmes de santé ;**	☒
B) **La priorisation des problèmes de santé ;**	☒
C) **La planification d'actions pour résoudre ces problèmes ;**	☒
D) **L'évaluation des actions mises en place.**	☒

20) Les formes de méningite sont :

A) **La méningite à méningocoques ;**	☒
B) **La méningite à pneumocoques ;**	☒
C) **La méningite virale ;**	☒
D) La méningite cérébro-intestinale.	☐

21) Les signes de la méningite purulente chez l'enfant sont :

A) **La fièvre ;**	☒
B) **Les troubles digestifs ;**	☒
C) **Une hypotonie des muscles du cou ;**	☒
D) **La raideur de la nuque.**	☒

22) Laquelle des maladies suivantes n'est pas immunisante :

A) La grippe ;	☐
B) La rougeole ;	☐
C) La varicelle ;	☐
D) **La typhoïde.**	☒

23) En épidémiologie le terme « endémique » réfère à la présence constante d'une maladie :

A) A une période donnée ;	☐
B) **Dans une région géographique particulière ;**	☒
C) **Dans une population particulière ;**	☒
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

24) En épidémiologie le terme « épidémie » veut dire :

A) **Le nombre de cas d'une maladie supérieur à ce qui est attendu normalement dans une population ;**	☒
B) Le nombre de cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;	☐
C) Le nombre de nouveaux cas d'une pathologie observés pendant une période donnée ;	☐
D) Le nombre de cas sporadique d'une pathologie observés pendant une période donnée.	☐

25) Parmi les différentes branches de l'épidémiologie, on distingue :

A) **L'épidémiologie descriptive ;**	☒
B) L'épidémiologie prospective ;	☐
C) **L'épidémiologie analytique ;**	☒
D) **L'épidémiologie évaluative.**	☒

26) Lesquelles des indicateurs suivants ne font pas partie des indicateurs épidémiologiques :

A) Le taux d'attaque ;	☐
B) **Le taux de recrutement ;**	☒
C) Le taux de létalité ;	☐
D) Le taux de morbidité.	☐

27) Dans le cadre du programme national de santé reproductive, le counseling aide le couple à :

A) **Décider de l'utilisation d'un contraceptif ;**	☒
B) **Lutter contre les fausses rumeurs ;**	☒
C) Donner les contraceptifs disponibles ;	☐
D) **Renseigner sur les effets secondaires des différents contraceptifs.**	☒

28) La ligature tubaire. Comme méthode contraceptive volontaire, peut être réalisée chez une femme :

A) **Désireuse de contraception permanente et qui ne présente pas de contre-indications ;**	☒
B) Mariée, âgée de 30 à 45 ans ;	☐
C) Ayant au moins trois enfants ;	☐
D) L'âge du dernier enfant doit être supérieur à deux ans.	☐

29) La syphilis secondaire est marquée après 3 semaines environ d'incubation par :

A) L'apparition du chancre ;	☐
B) **L'adénopathie satellite ;**	☒
C) **Une fièvre pouvant atteindre 39°C – 39,5°C ;**	☒
D) **Des céphalées avec syndrome méningé.**	☒

30) La syphilis est une maladie :

A) Infectieuse contagieuse ;	☒
B) Sexuellement transmissible ;	☒
C) Parasitaire ;	☐
D) Due à treponema pallidum.	☒

31) L'hépatite A se transmet essentiellement par :

A) Piqure lors des soins par une aiguille souillée ;	☐
B) Des liquides biologiques souillés ;	☐
C) L'absorption d'eau ou d'aliments souillés ;	☒
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

32) Parmi les infections suivantes, lesquelles sont dites opportunistes en cas de SIDA :

A) La candidose œsophagienne ;	☒
B) L'herpès mucocutané ;	☒
C) La tuberculose ;	☒
D) Le paludisme.	☐

33) Dans le cadre de la prise en charge intégrée de l'enfant malade à domicile, conseiller à la mère :

A) D'augmenter la consommation de liquides ;	☒
B) Maintenir l'alimentation ;	☒
C) Revenir en cas d'aggravation de l'état de l'enfant ;	☒
D) Donner des antibiotiques.	☐

34) Pour placer un dispositif intra-utérin chez une femme, celle-ci doit être :

A) Mariée ;	☐
B) En âge de procréer et ayant des enfants ;	☒
C) Désireuse d'une contraception de longue durée ;	☒
D) Ne présentant aucune contre-indication à la pose du dispositif intra-utérin.	☒

35) La syphilis primaire est marquée après 3 semaines environ d'incubation par :

A) L'apparition du chancre ;	☒
B) L'adénopathie satellite ;	☒
C) Une fièvre pouvant atteindre 39°C -39,5°C ;	☐
D) Des céphalées avec syndrome méningé.	☐

36) La prévention de la fièvre typhoïde se fait par :

A) La vaccination ;	☒
B) L'hygiène des mains et des aliments ;	☒
C) L'antibiothérapie ;	☐
D) La consommation de l'eau potable.	☒

37) La transmission de la rougeole se fait par voie :

A) Cutanée ;	☐
B) Aérienne ;	☒
C) Sanguine ;	☐
D) Digestive.	☐

38) Parmi les infections suivantes laquelle est parasitaire :

A) La varicelle ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) Le kyste hydatique ;	☒
D) La diphtérie.	☐

39) Laquelle des infections suivantes est-elle transmise par voie digestive :

A) La varicelle ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) La typhoïde ;	☒
D) La diphtérie.	☐

40) Lesquelles des infections suivantes sont-elles virales :

A) La varicelle ;	☒
B) La diphtérie ;	☐
C) Le tétanos ;	☐
D) La rougeole.	☒

2016

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : 3 ساعات

(دورة 25 شتنبر 2016)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Pour une relation soignant-soigné de qualité, il faut :

A) Distinguer le malade de sa maladie ;	☐
B) Rester dans la logique des faits et la cohérence des comportements ;	☐
C) Etre autoritaire avec le patient ;	☐
D) Avoir le sens de l'empathie et de respect de l'autre.	☐

2) La colostomie temporaire est réalisée dans les cas suivants :

A) Protection d'une anastomose à risque ;	☐
B) Occlusion colique ;	☐
C) Cancer du rectum non résécable ;	☐
D) Péritonite par perforation du colon.	☐

3) La colostomie définitive est réalisée dans les cas suivants :

A) Cancer du rectum non résécable ;	☐
B) Protection d'une anastomose à risque;	☐
C) Occlusion colique ;	☐
D) L'amputation abdomino-périnéale.	☐

4) Pour calculer le débit selon les indications thérapeutiques d'une transfusion :

A) 1 ml de sang correspond à 20 gouttes ;	☐
B) 1 ml de sang correspond à 13 gouttes ;	☐
C) 1 ml de sang correspond à 15 gouttes ;	☐
D) 1 ml de sang correspond à 30 gouttes. www.ispits.net	☐

5) Parmi les accidents de la transfusion, on note :

A) Le choc hémolytique ;	☐
B) Le choc hémodynamique ;	☐
C) Le choc anaphylactique ;	☐
D) Accident de surcharge.	☐

6) Les éléments de surveillance d'un appareil plâtré sont :

A) La douleur ;	☐
B) La cyanose des extrémités ;	☐
C) L'hypertension artérielle ;	☐
D) La fièvre.	☐

7) L'injection intramusculaire est à éviter chez :

A) Un malade sous traitement anti-cancéreux ;	☐
B) Un malade sous traitement anticoagulant ;	☐
C) Un malade cachectique ;	☐
D) Malade présentant des troubles d'hémostase.	☐

8) On reconnait une hypoglycémie par :

A) Des sueurs et moiteur des mains ;	☐
B) Une bradycardie ;	☐
C) Une asthénie brutale ;	☐
D) L'agitation.	☐

9) Parmi les actes que l'infirmier doit réaliser au retour de l'opéré du bloc opératoire :

A) Surveiller le degré de conscience du patient ;	☐
B) Installer l'opéré à plat tête sur le côté avec oreiller ;	☐
C) Surveiller la ventilation du patient ;	☐
D) Réaliser le premier lever précoce.	☐

10) Les accidents transfusionnels immunologiques hémolytiques immédiats surviennent suite à :

A) Une erreur ABO ;	☐
B) Une erreur d'étiquetage de la poche de sang ;	☐
C) Un syndrome fébrile post-transfusionnel ;	☐
D) Non-respect de la procédure de comptabilité pré-transfusionnelle.	☐

11) La pression artérielle, c'est :

A) La pression du sang exercée sur les parois des vaisseaux ;	☐
B) La pression du sang exercée sur les parois des artères ;	☐
C) La pression du sang exercée sur les parois des veines ;	☐
D) La pression du sang exercée sur les parois des capillaires.	☐

12) En cas de convulsions fébriles du nourrisson, il faut :

A) Mettre l'enfant en position déclive ;	☐
B) Libérer les voies aériennes en cas de vomissements ;	☐
C) Administrer deux ampoules de valium en intra-rectal ;	☐
D) Couvrir l'enfant.	☐

13) Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :

A) Coloration du faciès et des extrémités ;	☐
B) La gazométrie ;	☐
C) L'activité cardiaque ;	☐
D) L'état du flacon barboteur et de la sonde.	☐

14) Le syndrome de Volkman touche un patient :

A) Porteur de plâtre du membres inférieur ;	☐
B) Porteur de plâtre du membres supérieur ;	☐
C) En coma ;	☐
D) Hémodialysé.	☐

15) Les risques fréquents en cas d'hémodialyse sont :

A) Hypertension artérielle ;	☐
B) Hypotension artérielle ;	☐
C) Troubles de la fréquence cardiaque ;	☐
D) Fatigue après la séance.	☐

16) Parmi les complications de la perfusion, on note :

A) La lymphangite ;	☐
B) L'escarre ;	☐
C) L'infection ;	☐
D) La déshydratation.	☐

17) La vaccination consiste à introduire à un individu :

A) Un antigène ;	☐
B) Un anticorps ;	☐
C) Un allergène ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

18) Lequel ou lesquels des vaccins suivants n'est pas bactérien :

A) Vaccin de la Fièvre jaune ;	☐
B) Vaccin de la rougeole ;	☐
C) Vaccin de la Rubéole ;	☐
D) Vaccin tuberculose (BCG).	☐

19) Lequel des vaccins suivants n'est pas viral :

A) Vaccin des oreillons ;	☐
B) Vaccin de la poliomyélite (oral) ;	☐
C) Vaccin rotavirus ;	☐
D) Vaccin du choléra.	☐

20) Lequel des vaccins suivants n'est administré à l'âge de 2 mois :

A) Penta 1 (DTC-Hib-HB) ;	☐
B) VPO1 + VPC1 ;	☐
C) BCG ;	☐
D) Rotavirus1.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: المرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : 3 ساعات

(دورة 25 شتنبر 2016)

www.ispits.net

Correction proposée :

1) Pour une relation soignant-soigné de qualité, il faut :

A) Distinguer le malade de sa maladie ;	☐
B) **Rester dans la logique des faits et la cohérence des comportements ;**	☒
C) Etre autoritaire avec le patient ;	☐
D) **Avoir le sens de l'empathie et de respect de l'autre.**	☒

2) La colostomie temporaire est réalisée dans les cas suivants :

A) **Protection d'une anastomose à risque ;**	☒
B) **Occlusion colique ;**	☒
C) Cancer du rectum non résécable ;	☐
D) **Péritonite par perforation du colon.**	☒

3) La colostomie définitive est réalisée dans les cas suivants :

A) **Cancer du rectum non résécable ;**	☒
B) Protection d'une anastomose à risque;	☐
C) Occlusion colique ;	☐
D) L'amputation abdomino-périnéale.	☐

4) Pour calculer le débit selon les indications thérapeutiques d'une transfusion :

A) 1 ml de sang correspond à 20 gouttes ;	☐
B) 1 ml de sang correspond à 13 gouttes ;	☐
C) **1 ml de sang correspond à 15 gouttes ;**	☒
D) 1 ml de sang correspond à 30 gouttes.	☐

5) Parmi les accidents de la transfusion, on note :

A) Le choc hémolytique ;	☒
B) Le choc hémodynamique ;	☐
C) Le choc anaphylactique ;	☒
D) Accident de surcharge.	☒

6) Les éléments de surveillance d'un appareil plâtré sont :

A) La douleur ;	☒
B) La cyanose des extrémités ;	☒
C) L'hypertension artérielle ;	☐
D) La fièvre.	☐

7) L'injection intramusculaire est à éviter chez :

A) Un malade sous traitement anti-cancéreux ;	☐
B) Un malade sous traitement anticoagulant ;	☒
C) Un malade cachectique ;	☐
D) Malade présentant des troubles d'hémostase.	☒

8) On reconnait une hypoglycémie par :

A) Des sueurs et moiteur des mains ;	☐
B) Une bradycardie ;	☐
C) Une asthénie brutale ;	☒
D) L'agitation.	☒

9) Parmi les actes que l'infirmier doit réaliser au retour de l'opéré du bloc opératoire :

A) Surveiller le degré de conscience du patient ;	☒
B) Installer l'opéré à plat tête sur le côté avec oreiller ;	☐
C) Surveiller la ventilation du patient ;	☒
D) Réaliser le premier lever précoce.	☐

10) Les accidents transfusionnels immunologiques hémolytiques immédiats surviennent suite à :

A) Une erreur ABO ;	☒
B) Une erreur d'étiquetage de la poche de sang ;	☒
C) Un syndrome fébrile post-transfusionnel ;	☐
D) Non-respect de la procédure de comptabilité pré-transfusionnelle.	☒

11) La pression artérielle, c'est :

A) La pression du sang exercée sur les parois des vaisseaux ;	☐
B) La pression du sang exercée sur les parois des artères ;	☒
C) La pression du sang exercée sur les parois des veines ;	☐
D) La pression du sang exercée sur les parois des capillaires.	☐

12) En cas de convulsions fébriles du nourrisson, il faut :

A) Mettre l'enfant en position déclive ;	☐
B) Libérer les voies aériennes en cas de vomissements ;	☒
C) Administrer deux ampoules de valium en intra-rectal ;	☐
D) Couvrir l'enfant.	☐

13) Les éléments de surveillance lors de l'oxygénothérapie sont :

A) Coloration du faciès et des extrémités ;	☒
B) La gazométrie ;	☒
C) L'activité cardiaque ;	☒
D) L'état du flacon barboteur et de la sonde.	☒

14) Le syndrome de Volkman touche un patient :

A) Porteur de plâtre du membres inférieur ;	☐
B) Porteur de plâtre du membres supérieur ;	☒
C) En coma ;	☐
D) Hémodialysé.	☐

15) Les risques fréquents en cas d'hémodialyse sont :

A) Hypertension artérielle ;	☐
B) Hypotension artérielle ;	☒
C) Troubles de la fréquence cardiaque ;	☒
D) Fatigue après la séance.	☒

16) Parmi les complications de la perfusion, on note :

A) La lymphangite ;	☒
B) L'escarre ;	☒
C) L'infection ;	☒
D) La déshydratation.	☐

17) La vaccination consiste à introduire à un individu :

A) Un antigène ;	☒
B) Un anticorps ;	☐
C) Un allergène ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

18) Lequel ou lesquels des vaccins suivants n'est pas bactérien :

A) Vaccin de la Fièvre jaune ;	☒
B) Vaccin de la rougeole ;	☒
C) Vaccin de la Rubéole ;	☒
D) Vaccin tuberculose (BCG).	☐

19) Lequel des vaccins suivants n'est pas viral :

A) Vaccin des oreillons ;	☐
B) Vaccin de la poliomyélite (oral) ;	☐
C) Vaccin rotavirus ;	☐
D) Vaccin du choléra.	☒

20) Lequel des vaccins suivants n'est administré à l'âge de 2 mois :

A) Penta 1 (DTC-Hib-HB) ;	☐
B) VPO1 + VPC1 ;	☐
C) BCG ;	☒
D) Rotavirus1.	☐

2015

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 08 يناير 2015)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les principes de la gestion de la qualité sont :

A) Le leadership ;	☐
B) L'utilisation des données ;	☐
C) L'innocuité ;	☐
D) L'orientation vers le client ;	☐
E) Toutes les réponses sont justes.	☐

2) Les signes d'une hypoglycémie sont :

A) La moiteur des mains ;	☐
B) Sueurs froides, pâleur du visage et des extrémités ;	☐
C) Tremblement des extrémités ;	☐
D) Tachycardie avec palpitations.	☐

3) La glycémie capillaire :

A) Correspond au taux de glucose pris par dextro ;	☐
B) Sert dans la surveillance du diabétique ;	☐
C) Donner le taux exact du glucose dans le sang ;	☐
D) Sert à dépister un trouble biologique.	☐

4) Les facteurs favorisant l'installation d'une phlébite :

A) Le ralentissement du flux sanguin dû à l'immobilisation ;	☐
B) L'insuffisance cardiaque droite ;	☐
C) La station assise prolongée ;	☐
D) L'alitement prolongé.	☐

5) On reconnait une thrombophlébite par :

A) Dissociation pouls/T° ;	☐
B) Dissociation TA/pouls ;	☐
C) Rougeur du membre atteint ;	☐
D) Fièvre légère.	☐

6) Les indications d'un sondage vésical sont :

A) Rupture traumatique de l'urètre ;	☐
B) Adénome de prostate ;	☐
C) Chez un enfant avant l'âge de 18 mois ;	☐
D) Urétrite aigue suppurante.	☐

7) Parmi les éléments à considérer dans un plan de soins, on note :

A) Diagnostiquer le problème ;	☐
B) Identifier les besoins ;	☐
C) Planifier les soins ;	☐
D) Evaluer l'activité infirmière ;	☐
E) Assurer les transmissions infirmières.	☐

8) Le dossier de soins infirmiers est un moyen pour :

A) Evaluer les soins infirmiers ;	☐
B) Planifier les soins infirmiers ;	☐
C) Contrôler la présence des infirmiers ;	☐
D) Assurer une continuité des soins ;	☐
E) Assurer les transmissions infirmières.	☐

9) Le diagnostic de certitude de la tuberculose repose sur :

A) La radiographie pulmonaire ;	☐
B) La bronchoscopie pulmonaire ;	☐
C) L'examen bactériologique des crachats ;	☐
D) L'IRM pulmonaire ;	☐
E) L'IDR à la tuberculine.	☐

10) Les indications de l'hémoculture sont :

A) Hyperthermie ;	☐
B) Hypothermie ;	☐
C) Pic fébrile, frissons ;	☐
D) Réalisation d'un antibiogramme.	☐

11) Parmi les complications du décubitus on note :

A) Anorexie ;	☐
B) Constipation ;	☐
C) Infection urinaire ;	☐
D) Atrophie musculaire.	☐

12) Un patient qui se présente au service des urgences avec vomissements, un arrêt des matières et des gaz, s'agit-il d'une :

A) Péritonite ;	☐
B) Occlusion ;	☐
C) Appendicite ;	☐
D) Pancréatite.	☐

13) Les signes annonciateurs d'une crise d'asthme sont :

A) Sensation de gènes respiratoires ;	☐
B) Bruits à l'inspiration, sifflements + éternuements associés ;	☐
C) Sensation de poitrine serrée à l'obstruction bronchique ;	☐
D) Augmentation du débit expiratoire par rapport à l'état de base.	☐

14) Le régime diététique à conseiller à un enfant atteint de syndrome néphrotique :

A) Le régime sans sucre ;	☐
B) Le régime hypo protidique ;	☐
C) Le régime sans sel ;	☐
D) Le régime hyper protidique.	☐

15) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter le malade par sonde naso-gastrique ;	☐
B) Alimenter le malade par voie cœliaque ;	☐
C) Alimenter le malade par voie intraveineuse ;	☐
D) Alimenter le malade par gavage.	☐

16) Les pansements ont une action :

A) Cicatrisante ;	☐
B) Désinfectante ;	☐
C) Antalgique ;	☐
D) Absorbante.	☐

17) Chez un sujet de groupe O, quel est l'Antigène (Ag) du groupe O :

A) Ag A ;	☐
B) Ag B ;	☐
C) Ag AB ;	☐
D) Aucun.	☐

18) L'insuline est une hormone secrétée par :

A) Le foie ;	☐
B) La rate ;	☐
C) Le pancréas exocrine ;	☐
D) Le pancréas endocrine.	☐

19) Les conséquences d'une hernie étranglée sont :

A) Ischémie des viscères étranglés ;	☐
B) Occlusion intestinale mécanique ;	☐
C) Hyperthermie ;	☐
D) La douleur intense.	☐

20) L'infection nosocomiale est une infection clinique et/ou microbiologique contractée dans des établissements de soins par tout patient n'ayant pas cette infection lors de son admission et qui se déclare :

A) Au moins 24 heures après l'hospitalisation ;	☐
B) Au moins 48 heures après l'hospitalisation ;	☐
C) Jusqu'à un 1an pour la pose d'une prothèse.	☐

21) La colostomie définitive est indiquée dans les cas suivants :

A) Carcinome du recto-sigmoïde ;	☐
B) Traumatisme du colon gauche ;	☐
C) Rectorragie incontrôlable ;	☐
D) Maladies inflammatoires du colon.	☐

22) A l'âge de 3 mois les vaccins administrés à l'enfant sont :

A) DTC1-Hib1 ;	☐
B) HB ;	☐
C) VPO2 ;	☐
D) Vaccin anti-rotavirus 2.	☐

23) Le vaccin contre la tuberculose se compose de :

A) Germes vivant attenues ;	☐
B) Germes inactivés entiers ;	☐
C) Polysaccharides ;	☐
D) Protéines.	☐

24) Lequel des vaccins suivants ne fait pas partie du PNI :

A) Le BCG ;	☐
B) Le VAT ;	☐
C) Le DTC ;	☐
D) Anti-grippal.	☐

25) Les principales maladies à transport hydrique et/ou alimentaire :

A) Le cholera ;	☐
B) La typhoïde ;	☐
C) L'hépatite B ;	☐
D) Dysenterie.	☐

26) Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire se base sur :

A) Les signes cliniques ;	☐
B) L'examen bactériologique des expectorations ;	☐
C) La radiologie pulmonaire ;	☐
D) Le test tuberculinique.	☐

27) Laquelle des maladies suivantes n'est pas immunisante :

A) La grippe ;	☐
B) La rougeole ;	☐
C) La varicelle ;	☐
D) La typhoïde.	☐

28) La transmission de l'hépatite A se fait :

A) Par voie sexuelle ;	☐
B) Par voie parentérale ;	☐
C) Par voie materno-fœtale ;	☐
D) Par voie oro-fécale.	☐

29) Une pandémie est un phénomène de masse :

A) Limité géographiquement ;	☐
B) Limité dans le temps et l'espace ;	☐
C) Sans frontière géographique ;	☐
D) Survient chez une population limitée.	☐

30) La fibroscopie digestive est un examen qui permet de diagnostiquer :

A) L'ulcère gastrique ;	☐
B) L'ulcère duodénal ;	☐
C) L'ulcère de l'œsophage ;	☐
D) Les varices de l'œsophage.	☐

31) L'hystérosalpingographie est contre indiquée en cas :

A) Infection génitale ;	☐
B) Grossesse ;	☐
C) Fibrome utérin ;	☐
D) Allergie à l'iode.	☐

32) Parmi les étiologies des crises convulsives chez l'enfant, on distingue :

A) L'hypocalcémie ;	☐
B) L'hyperthermie ;	☐
C) L'hypoglycémie ;	☐
D) L'hypothermie.	☐

33) Dans le cadre du PNI, le vaccin anti rota virus est administré à l'enfant :

A) A la naissance ;	☐
B) A 1 mois ;	☐
C) A 2 mois ;	☐
D) A 3 mois.	☐

34) Après un accouchement normal, le DIU peut être insérer à partir de :

A) 4 semaines ;	☐
B) 6 semaines ;	☐
C) 2 mois ;	☐
D) 3 mois.	☐

35) Le(s) but(s) de la ponction sternale est (sont) de faire :

A) Un examen cytologique de la moelle ;	☐
B) Un examen bactériologique de la moelle ;	☐
C) Un examen histologique de la moelle ;	☐
D) Un examen parasitologique de la moelle.	☐

36) En cas de célioscopie/laparoscopie, il faut surveiller chez le malade :

A) La diurèse ;	☐
B) La sonde vésicale ;	☐
C) Les vomissements ;	☐
D) L'état cutané.	☐

37) La surveillance d'un patient après une ponction lombaire consiste à :

A) Garder le patient en position assise ;	☐
B) Eviter au patient de boire ;	☐
C) Contrôler l'état de conscience du patient ;	☐
D) Surveiller le point de ponction.	☐

38) L'urographie intraveineuse permet l'exploration du fonctionnement :

A) Veineux ;	☐
B) Cardiaque ;	☐
C) Rénal ;	☐
D) Hépatique.	☐

39) En as de phlébite :

A) Mobiliser le membre atteint ;	☐
B) Mettre le lit en position déclive ;	☐
C) Mettre le lit en position proclive ;	☐
D) Conseiller l'exercice physique.	☐

40) L'isolement septique est indiqué lorsque le patient est :

A) Atteint d'une infection naturellement contagieuse ;	☐
B) Porteur ou excréteur d'un agent infectieux multi résistant aux antibiotiques ;	☐
C) Fragile ou immunodéprimé.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين **الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات**

المدة : ساعتان

(دورة 08 يناير 2015)

Correction proposée :

1) Les principes de la gestion de la qualité sont :

A) **Le leadership ;**	☒
B) **L'utilisation des données ;**	☒
C) L'innocuité ;	☐
D) **L'orientation vers le client ;**	☒
E) Toutes les réponses sont justes.	☐

2) Les signes d'une hypoglycémie sont :

A) La moiteur des mains ;	☐
B) **Sueurs froides, pâleur du visage et des extrémités ;**	☒
C) **Tremblement des extrémités ;**	☒
D) **Tachycardie avec palpitations.**	☒

3) La glycémie capillaire :

A) **Correspond au taux de glucose pris par dextro ;**	☒
B) **Sert dans la surveillance du diabétique ;**	☒
C) Donner le taux exact du glucose dans le sang ;	☐
D) **Sert à dépister un trouble biologique.**	☒

4) Les facteurs favorisant l'installation d'une phlébite :

A) **Le ralentissement du flux sanguin dû à l'immobilisation ;**	☒
B) L'insuffisance cardiaque droite ;	☐
C) **La station assise prolongée ;**	☒
D) **L'alitement prolongé.**	☒

5) On reconnait une thrombophlébite par :

A) Dissociation pouls/T° ;	☒
B) Dissociation TA/pouls ;	☐
C) Rougeur du membre atteint ;	☒
D) Fièvre légère.	☒

6) Les indications d'un sondage vésical sont :

A) Rupture traumatique de l'urètre ;	☐
B) Adénome de prostate ;	☒
C) Chez un enfant avant l'âge de 18 mois ;	☐
D) Urétrite aigue suppurante.	☐

7) Parmi les éléments à considérer dans un plan de soins, on note :

A) Diagnostiquer le problème ;	☒
B) Identifier les besoins ;	☒
C) Planifier les soins ;	☒
D) Evaluer l'activité infirmière ;	☒
E) Assurer les transmissions infirmières.	☐

8) Le dossier de soins infirmiers est un moyen pour :

A) Evaluer les soins infirmiers ;	☒
B) Planifier les soins infirmiers ;	☒
C) Contrôler la présence des infirmiers ;	☐
D) Assurer une continuité des soins ;	☒
E) Assurer les transmissions infirmières.	☒

9) Le diagnostic de certitude de la tuberculose repose sur :

A) La radiographie pulmonaire ;	☐
B) La bronchoscopie pulmonaire ;	☐
C) L'examen bactériologique des crachats ;	☒
D) L'IRM pulmonaire ;	☐
E) L'IDR à la tuberculine.	☐

10) Les indications de l'hémoculture sont :

A) Hyperthermie ;	☒
B) Hypothermie ;	☒
C) Pic fébrile, frissons ;	☒
D) Réalisation d'un antibiogramme.	☒

11) Parmi les complications du décubitus on note :

A) Anorexie ;	☒
B) Constipation ;	☒
C) Infection urinaire ;	☒
D) Atrophie musculaire.	☒

12) Un patient qui se présente au service des urgences avec vomissements, un arrêt des matières et des gaz, s'agit-il d'une :

A) Péritonite ;	☐
B) Occlusion ;	☒
C) Appendicite ;	☐
D) Pancréatite.	☐

13) Les signes annonciateurs d'une crise d'asthme sont :

A) Sensation de gènes respiratoires ;	☒
B) Bruits à l'inspiration, sifflements + éternuements associés ;	☐
C) Sensation de poitrine serrée à l'obstruction bronchique ;	☒
D) Augmentation du débit expiratoire par rapport à l'état de base.	☐

14) Le régime diététique à conseiller à un enfant atteint de syndrome néphrotique :

A) Le régime sans sucre ;	☐
B) Le régime hypo protidique ;	☐
C) Le régime sans sel ;	☒
D) Le régime hyper protidique.	☐

15) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter le malade par sonde naso-gastrique ;	☐
B) Alimenter le malade par voie cœliaque ;	☐
C) Alimenter le malade par voie intraveineuse ;	☒
D) Alimenter le malade par gavage.	☐

16) Les pansements ont une action :

A) Cicatrisante ;	☒
B) Désinfectante ;	☒
C) Antalgique ;	☒
D) Absorbante.	☒

17) Chez un sujet de groupe O, quel est l'Antigène (Ag) du groupe O :

A) Ag A ;	☐
B) Ag B ;	☐
C) Ag AB ;	☐
D) Aucun.	☒

18) L'insuline est une hormone secrétée par :

A) Le foie ;	☐
B) La rate ;	☐
C) Le pancréas exocrine ;	☐
D) Le pancréas endocrine.	☒

19) Les conséquences d'une hernie étranglée sont :

A) Ischémie des viscères étranglés ;	☒
B) Occlusion intestinale mécanique ;	☒
C) Hyperthermie ;	☐
D) La douleur intense.	☒

20) L'infection nosocomiale est une infection clinique et/ou microbiologique contractée dans des établissements de soins par tout patient n'ayant pas cette infection lors de son admission et qui se déclare :

A) Au moins 24 heures après l'hospitalisation ;	☐
B) **Au moins 48 heures après l'hospitalisation ;**	☒
C) **Jusqu'à un 1an pour la pose d'une prothèse.**	☒

21) La colostomie définitive est indiquée dans les cas suivants :

A) **Carcinome du recto-sigmoïde ;**	☒
B) Traumatisme du colon gauche ;	☐
C) Rectorragie incontrôlable ;	☐
D) Maladies inflammatoires du colon.	☐

22) A l'âge de 3 mois les vaccins administrés à l'enfant sont :

A) DTC1-Hib1 ;	☐
B) HB ;	☐
C) **VPO2 ;**	☒
D) **Vaccin anti-rotavirus 2.**	☒

23) Le vaccin contre la tuberculose se compose de :

A) **Germes vivant attenues ;**	☒
B) Germes inactivés entiers ;	☐
C) Polysaccharides ;	☐
D) Protéines.	☐

24) Lequel des vaccins suivants ne fait pas partie du PNI :

A) Le BCG ;	☐
B) Le VAT ;	☐
C) Le DTC ;	☐
D) **Anti-grippal.**	☒

25) Les principales maladies à transport hydrique et/ou alimentaire :

A) Le cholera ;	☒
B) La typhoïde ;	☒
C) L'hépatite B ;	☐
D) Dysenterie.	☒

26) Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire se base sur :

A) Les signes cliniques ;	☒
B) L'examen bactériologique des expectorations ;	☒
C) La radiologie pulmonaire ;	☒
D) Le test tuberculinique.	☐

27) Laquelle des maladies suivantes n'est pas immunisante :

A) La grippe ;	☒
B) La rougeole ;	☐
C) La varicelle ;	☐
D) La typhoïde.	☐

28) La transmission de l'hépatite A se fait :

A) Par voie sexuelle ;	☐
B) Par voie parentérale ;	☐
C) Par voie materno-fœtale ;	☐
D) Par voie oro-fécale.	☒

29) Une pandémie est un phénomène de masse :

A) Limité géographiquement ;	☐
B) Limité dans le temps et l'espace ;	☐
C) Sans frontière géographique ;	☒
D) Survient chez une population limitée.	☐

30) La fibroscopie digestive est un examen qui permet de diagnostiquer :

A) L'ulcère gastrique ;	☒
B) L'ulcère duodénal ;	☒
C) L'ulcère de l'œsophage ;	☒
D) Les varices de l'œsophage.	☐

31) L'hystérosalpingographie est contre indiquée en cas :

A) Infection génitale ;	☒
B) Grossesse ;	☒
C) Fibrome utérin ;	☐
D) Allergie à l'iode.	☒

32) Parmi les étiologies des crises convulsives chez l'enfant, on distingue :

A) L'hypocalcémie ;	☒
B) L'hyperthermie ;	☒
C) L'hypoglycémie ;	☒
D) L'hypothermie.	☐

33) Dans le cadre du PNI, le vaccin anti rota virus est administré à l'enfant :

A) A la naissance ;	☐
B) A 1 mois ;	☐
C) A 2 mois ;	☒
D) A 3 mois.	☒

34) Après un accouchement normal, le DIU peut être insérer à partir de :

A) 4 semaines ;	☐
B) 6 semaines ;	☒
C) 2 mois ;	☐
D) 3 mois.	☐

35) Le(s) but(s) de la ponction sternale est (sont) de faire :

A) Un examen cytologique de la moelle ;	☒
B) Un examen bactériologique de la moelle ;	☒
C) Un examen histologique de la moelle ;	☐
D) Un examen parasitologique de la moelle.	☒

36) En cas de célioscopie/laparoscopie, il faut surveiller chez le malade :

A) La diurèse ;	☒
B) La sonde vésicale ;	☒
C) Les vomissements ;	☐
D) L'état cutané.	☒

37) La surveillance d'un patient après une ponction lombaire consiste à :

A) Garder le patient en position assise ;	☐
B) Eviter au patient de boire ;	☐
C) Contrôler l'état de conscience du patient ;	☒
D) Surveiller le point de ponction.	☒

38) L'urographie intraveineuse permet l'exploration du fonctionnement :

A) Veineux ;	☐
B) Cardiaque ;	☐
C) Rénal ;	☒
D) Hépatique.	☐

39) En as de phlébite :

A) Mobiliser le membre atteint ;	☐
B) Mettre le lit en position déclive ;	☒
C) Mettre le lit en position proclive ;	☐
D) Conseiller l'exercice physique.	☐

40) L'isolement septique est indiqué lorsque le patient est :

A) **Atteint d'une infection naturellement contagieuse ;**	☒
B) **Porteur ou excréteur d'un agent infectieux multi résistant aux antibiotiques ;**	☒
C) Fragile ou immunodéprimé.	☐

2014

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 31 غشت 2014)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) **Pour une transfusion de culot globulaire, le critère qui fait que le groupe « O » est un donneur universel, c'est qu'il :**

A) Contient des antigènes anti-A sur ses hématies ;	☐
B) Ne contient pas d'antigènes sur ses hématies ;	☐
C) Contient des antigènes anti-B sur ses hématies ;	☐
D) Contient des antigènes anti-A et anti-B sur ses hématies.	☐

2) **Quels sont parmi les cas suivants, ceux qui pourraient s'appeler syndrome ?**

A) Un Angor d'effort stable après l'âge de 60 ans ;	☐
B) Des douleurs angineuses dont la fréquence a augmenté ;	☐
C) Une crise d'angine de poitrine qui ne cède pas au bout de 15 minutes ;	☐
D) Douleur angineuse au repos.	☐

3) **Dans le cas des pathologies cardiovasculaires les diurétiques servent :**

A) Augmenter la diurèse ;	☐
B) Fondre les œdèmes ;	☐
C) Diminuer la rétention de sel et de l'eau ;	☐
D) Augmenter la tension artérielle.	☐

4) **Une diminution voire privation de la quantité d'O2 dans les tissus est :**

A) Hypoxémie ;	☐
B) Hypercapnie ;	☐
C) Anoxie ;	☐
D) Dyspnée.	☐

5) Quels sont les signes annonciateurs d'une crise d'asthme ?

A) Sensation de gènes respiratoires ;	☐
B) Bruits à l'inspiration, sifflements + éternuements associés ;	☐
C) Sensation de poitrine serrée liée à l'obstruction bronchique ;	☐
D) Augmentation du débit expiratoire par rapport à l'état de base.	☐

6) Les conseils à donner en rapport avec la prise du traitement par Sintrom :

A) Respecter strictement la posologie prescrite par le médecin ;	☐
B) En cas d'oublis le signaler au médecin et doubler la dose le jour suivant ;	☐
C) Prévenir en cas de petites hémorragies ;	☐
D) Faire contrôler régulièrement l'action du médicament par un contrôle sang TP et INR.	☐

7) On reconnait une thrombophlébite par :

A) Dissociation pouls/T° ;	☐
B) Dissociation TA/ pouls ;	☐
C) Rougeur du membre atteint ;	☐
D) Fièvre.	☐

8) Après une intervention chirurgicale le premier lever :

A) Est réalisé sans prescription médicale ;	☐
B) Est réalisé sur prescription médicale ;	☐
C) Est réalisé le plutôt possible pour éviter les complications de décubitus ;	☐
D) Est réalisé en fonction du désir du patient.	☐

9) L'immobilisation plâtrée comporte plusieurs buts qui sont :

A) L'immobilisation d'un segment de membre et des articulations sus et sous-jacentes ;	☐
B) Eviter un déplacement secondaire non désiré ;	☐
C) Le plâtre doit assurer également le confort du patient ;	☐
D) Doit avoir un effet compressif et assure un ralentissement du flux circulatoire.	☐

10) En cas de suspicion d'effet indésirable lors d'une transfusion :

A) Arrêter la transfusion ;	☐
B) Retirer la voie veineuse et appeler le médecin ;	☐
C) Poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion ;	☐
D) Se référer à la procédure d'hémovigilance.	☐

11) Pour un patient groupe A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O :

A) Le plasma frais congelé AB ;	☐
B) Le plasma frais congelé O ;	☐
C) Indifféremment AB ou O ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

12) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter le malade par sonde naso-gastrique ;	☐
B) Alimenter le malade par voie cœliaque ;	☐
C) Alimenter le malade par voie intraveineuse ;	☐
D) Alimenter le malade par gavage.	☐

13) Le diagnostic infirmier :

A) Dépend de diagnostic médical ;	☐
B) Se réfère aux problèmes du patient ;	☐
C) Relève du rôle propre de l'infirmier ;	☐
D) Est poser en collaboration avec le médecin.	☐

14) La promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant nécessite :

A) Développement et maîtrise en œuvre d'un plan de mobilisation sociale en faveur de l'allaitement maternel et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ;	☐
B) Amélioration des compétences des professionnels de santé en matière de l'alimentation de l'enfant ;	☐
C) Développement et diffusion des protocoles de la prise en charge nutritionnelle des enfants à besoins spécifiques ;	☐
D) Participation à la révision de la législation protégeant l'allaitement maternel.	☐

15) Les contre-indications du sondage vésical sont :

A) Rupture traumatique de l'urètre ;	☐
B) Adénome de prostate ;	☐
C) Chez un enfant avant l'âge de 18 mois ;	☐
D) Urétrite aigue suppurante.	☐

16) La tension artérielle orthostatique est :

A) Une hypertension sévère ;	☐
B) Une hypotension modérée ;	☐
C) Une tension pincée ;	☐
D) Variation de TA entre position assise et couché.	☐

17) Chez un sujet de groupe O, quel est l'Antigène (Ag) portés par les globules rouges :

A) Ag A ;	☐
B) Ag B ;	☐
C) Ag AB ;	☐
D) Aucun.	☐

18) Le syndrome de Volkman est la conséquence :

A) D'un plâtre serré ;	☐
B) D'une mauvaise réduction d'une fracture ;	☐
C) D'un plâtre cassé ;	☐
D) D'une atteinte vasculaire.	☐

19) Chez un malade qui présente une fracture du bassin avec hématurie s'agit-il ?

A) D'une lésion rénale ;	☐
B) D'une lésion intestinale ;	☐
C) D'une lésion vésicale ;	☐
D) D'une lésion urétrale.	☐

20) Le pansement gras consiste à :

A) Faire un gros pansement ;	☐
B) Faire un pansement à l'alcool ;	☐
C) Faire un pansement avec de la pommade ;	☐
D) Faire un pansement avec des colloïdes.	☐

21) Les signes généraux d'une hémorragie sont :

A) Un pouls rapide filant ;	☐
B) Bradycardie ;	☐
C) Respiration rapide ;	☐
D) Pâleur, moiteur sueur.	☐

22) Les conséquences d'une hernie étranglée sont :

A) Ischémie des viscères étranglés ;	☐
B) Occlusion intestinale mécanique ;	☐
C) Hyperthermie ;	☐
D) La douleur intense.	☐

23) Les indications de l'hémodialyse sont :

A) Insuffisance rénale aigue ;	☐
B) Intoxications médicamenteuses ;	☐
C) Rétention hydro-sodée sévère d'origine insuffisance cardiaque ;	☐
D) Trouble sévères de la thermorégulation.	☐

24) La prévention et lutte contre les carences en micronutriments nécessite :

A) Actualisation du calendrier de supplémentassions des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer en micronutriments ;	☐
B) Renforcement du partenariat multisectoriel pour l'amélioration de la production et du contrôle de qualité des aliments fortifiés ;	☐
C) Renforcement des actions de promotion de la consommation des aliments riches et enrichis en micronutriments ;	☐
D) Amélioration des modalités de gestion et d'approvisionnement en micronutriments.	☐

25) Les soins post-opératoires de l'ulcère gastroduo-dénal sont :

A) L'aspiration gastrique ;	☐
B) L'antibiothérapie à large spectre ;	☐
C) L'administration des anti-sécrétoires ;	☐
D) L'alimentation entérale.	☐

26) La colostomie définitive est indiquée dans le cas suivants :

A) Carcinome du recto-sigmoïde ;	☐
B) Traumatisme du colon gauche ;	☐
C) Rectorragie incontrôlable ;	☐
D) Maladies inflammatoires du colon.	☐

27) Le débit de la perfusion pour une prescription de SG 5% 1L / 6h est de :

A) 30 gouttes/minute ;	☐
B) 56 gouttes/minute ;	☐
C) 70 gouttes/minute ;	☐
D) 45 gouttes/minute.	☐

28) Les différentes actions des pansements sont :

A) Action cicatrisante ;	☐
B) Action désinfectante ;	☐
C) Action antalgique ;	☐
D) Action absorbante.	☐

29) La promotion de la nutrition en milieu scolaire et universitaire a besoin de :

A) Elaboration et mise en place d'un plan d'éducation nutritionnelle au niveau des établissements scolaires et universitaires ;	☐
B) Renforcement de la composante nutrition dans le cursus d'enseignement primaire en collaboration avec le ministère de l'Education Nationale ;	☐
C) Instauration de normes pour améliorer la qualité des aliments au Niveau des cantines scolaires et universitaires.	☐
D) Renforcement de la composante nutrition dans les actions communautaires.	☐

30) Les éléments de surveillance et d'évaluation de la diurèse sont :

A) La quantité des urines collectées ;	☐
B) L'aspect des urines ;	☐
C) La couleur et l'odeur des urines ;	☐
D) La présence d'albumine.	☐

31) Les indications de l'hémoculture sont :

A) Hyperthermie ;	☐
B) Hypothermie ;	☐
C) Pic fébrile, frissons ;	☐
D) Réalisation d'un antibiogramme.	☐

32) Le diagnostic de certitude de la tuberculose pulmonaire repose sur :

A) Les signes cliniques ;	☐
B) L'intradermo-réaction à la tuberculine ;	☐
C) L'examen radiologique ;	☐
D) L'examen bactériologique.	☐

33) Les maladies à caractère social :

A) Paludisme ;	☐
B) SIDA ;	☐
C) Syphilis primaire et secondaire ;	☐
D) Choléra.	☐

34) Les maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiques :

A) Poliomyélite ;	☐
B) Trachome ;	☐
C) Leptospirose ;	☐
D) Urétrite gonococcique et non gonococcique.	☐

35) La prévention du tétanos néo-natale :

A) Le lavage des mains ;	☐
B) L'administration du VAT (vaccination anti tétanique) ;	☐
C) La stérilisation du matériel ;	☐
D) L'administration du SAT (sérum anti tétanique).	☐

36) Parmi les maladies suivantes, celles qui sont immunisantes :

A) La rougeole ;	☐
B) Le choléra ;	☐
C) La rubéole ;	☐
D) La typhoïde.	☐

37) Les signes cliniques du choléra sont :

A) La diarrhée ;	☐
B) L'hyperthermie ;	☐
C) L'hypotension ;	☐
D) L'hypothermie.	☐

38) Les signes de gravite d'une diarrhée sont :

A) L'hypertension artérielle ;	☐
B) La déshydratation ;	☐
C) La perte de poids ;	☐
D) La soif intense.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين **الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات**

المدة : ساعتان

(دورة 31 غشت 2014)

Correction proposée :

1) **Pour une transfusion de culot globulaire, le critère qui fait que le groupe « O » est un donneur universel, c'est qu'il :**

A) Contient des antigènes anti-A sur ses hématies ;	☐
B) **Ne contient pas d'antigènes sur ses hématies ;**	☒
C) Contient des antigènes anti-B sur ses hématies ;	☐
D) Contient des antigènes anti-A et anti-B sur ses hématies.	☐

2) **Quels sont parmi les cas suivants, ceux qui pourraient s'appeler syndrome ?**

A) Un Angor d'effort stable après l'âge de 60 ans ;	☐
B) **Des douleurs angineuses dont la fréquence a augmenté ;**	☒
C) **Une crise d'angine de poitrine qui ne cède pas au bout de 15 minutes ;**	☒
D) Douleur angineuse au repos.	☐

3) **Dans le cas des pathologies cardiovasculaires les diurétiques servent :**

A) **Augmenter la diurèse ;**	☒
B) **Fondre les œdèmes ;**	☒
C) **Diminuer la rétention de sel et de l'eau ;**	☒
D) Augmenter la tension artérielle.	☐

4) **Une diminution voire privation de la quantité d'O2 dans les tissus est :**

A) Hypoxémie ;	☐
B) Hypercapnie ;	☐
C) **Anoxie ;**	☒
D) Dyspnée.	☐

5) Quels sont les signes annonciateurs d'une crise d'asthme ?

A) **Sensation de gènes respiratoires ;**	☒
B) Bruits à l'inspiration, sifflements + éternuements associés ;	☐
C) **Sensation de poitrine serrée liée à l'obstruction bronchique ;**	☒
D) Augmentation du débit expiratoire par rapport à l'état de base.	☐

6) Les conseils à donner en rapport avec la prise du traitement par Sintrom :

A) **Respecter strictement la posologie prescrite par le médecin ;**	☒
B) En cas d'oublis le signaler au médecin et doubler la dose le jour suivant ;	☐
C) **Prévenir en cas de petites hémorragies ;**	☒
D) **Faire contrôler régulièrement l'action du médicament par un contrôle sang TP et INR.**	☒

7) On reconnait une thrombophlébite par :

A) **Dissociation pouls/T° ;**	☒
B) Dissociation TA/ pouls ;	☐
C) **Rougeur du membre atteint ;**	☒
D) Fièvre.	☐

8) Après une intervention chirurgicale le premier lever :

A) Est réalisé sans prescription médicale ;	☐
B) **Est réalisé sur prescription médicale ;**	☒
C) **Est réalisé le plutôt possible pour éviter les complications de décubitus ;**	☒
D) Est réalisé en fonction du désir du patient.	☐

9) L'immobilisation plâtrée comporte plusieurs buts qui sont :

A) **L'immobilisation d'un segment de membre et des articulations sus et sous-jacentes ;**	☒
B) **Eviter un déplacement secondaire non désiré ;**	☒
C) **Le plâtre doit assurer également le confort du patient ;**	☒
D) Doit avoir un effet compressif et assure un ralentissement du flux circulatoire.	☐

10) En cas de suspicion d'effet indésirable lors d'une transfusion :

A) **Arrêter la transfusion ;**	☒
B) Retirer la voie veineuse et appeler le médecin ;	☐
C) Poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion ;	☐
D) **Se référer à la procédure d'hémovigilance.**	☒

11) Pour un patient groupe A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O :

A) **Le plasma frais congelé AB ;**	☒
B) Le plasma frais congelé O ;	☐
C) Indifféremment AB ou O ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

12) La nutrition parentérale consiste à :

A) Alimenter le malade par sonde naso-gastrique ;	☐
B) Alimenter le malade par voie cœliaque ;	☐
C) **Alimenter le malade par voie intraveineuse ;**	☒
D) Alimenter le malade par gavage.	☐

13) Le diagnostic infirmier :

A) Dépend de diagnostic médical ;	☐
B) **Se réfère aux problèmes du patient ;**	☒
C) **Relève du rôle propre de l'infirmier ;**	☒
D) Est poser en collaboration avec le médecin.	☐

14) La promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant nécessite :

A) **Développement et maîtrise en œuvre d'un plan de mobilisation sociale en faveur de l'allaitement maternel et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ;**	☒
B) **Amélioration des compétences des professionnels de santé en matière de l'alimentation de l'enfant ;**	☒
C) **Développement et diffusion des protocoles de la prise en charge nutritionnelle des enfants à besoins spécifiques ;**	☒
D) **Participation à la révision de la législation protégeant l'allaitement maternel.**	☒

15) Les contre-indications du sondage vésical sont :

A) Rupture traumatique de l'urètre ;	☒
B) Adénome de prostate ;	☐
C) Chez un enfant avant l'âge de 18 mois ;	☒
D) Urétrite aigue suppurante.	☒

16) La tension artérielle orthostatique est :

A) Une hypertension sévère ;	☐
B) Une hypotension modérée ;	☐
C) Une tension pincée ;	☐
D) Variation de TA entre position assise et couché.	☒

17) Chez un sujet de groupe O, quel est l'Antigène (Ag) portés par les globules rouges :

A) Ag A ;	☐
B) Ag B ;	☐
C) Ag AB ;	☐
D) Aucun.	☒

18) Le syndrome de Volkman est la conséquence :

A) D'un plâtre serré ;	☒
B) D'une mauvaise réduction d'une fracture ;	☐
C) D'un plâtre cassé ;	☐
D) D'une atteinte vasculaire.	☒

19) Chez un malade qui présente une fracture du bassin avec hématurie s'agit-il ?

A) D'une lésion rénale ;	☒
B) D'une lésion intestinale ;	☐
C) D'une lésion vésicale ;	☒
D) D'une lésion urétrale.	☒

20) Le pansement gras consiste à :

A) Faire un gros pansement ;	☐
B) Faire un pansement à l'alcool ;	☐
C) Faire un pansement avec de la pommade ;	☒
D) Faire un pansement avec des colloïdes.	☐

21) Les signes généraux d'une hémorragie sont :

A) Un pouls rapide filant ;	☒
B) Bradycardie ;	☐
C) Respiration rapide ;	☒
D) Pâleur, moiteur sueur.	☒

22) Les conséquences d'une hernie étranglée sont :

A) Ischémie des viscères étranglés ;	☒
B) Occlusion intestinale mécanique ;	☒
C) Hyperthermie ;	☐
D) La douleur intense.	☒

23) Les indications de l'hémodialyse sont :

A) Insuffisance rénale aigue ;	☒
B) Intoxications médicamenteuses ;	☒
C) Rétention hydro-sodée sévère d'origine insuffisance cardiaque ;	☒
D) Trouble sévères de la thermorégulation.	☒

24) La prévention et lutte contre les carences en micronutriments nécessite :

A) Actualisation du calendrier de supplémentassions des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer en micronutriments ;	☒
B) Renforcement du partenariat multisectoriel pour l'amélioration de la production et du contrôle de qualité des aliments fortifiés ;	☒
C) Renforcement des actions de promotion de la consommation des aliments riches et enrichis en micronutriments ;	☒
D) Amélioration des modalités de gestion et d'approvisionnement en micronutriments.	☒

25) Les soins post-opératoires de l'ulcère gastroduo-dénal sont :

A) L'aspiration gastrique ;	☒
B) L'antibiothérapie à large spectre ;	☒
C) L'administration des anti-sécrétoires ;	☒
D) L'alimentation entérale.	☐

26) La colostomie définitive est indiquée dans le cas suivants :

A) Carcinome du recto-sigmoïde ;	☒
B) Traumatisme du colon gauche ;	☐
C) Rectorragie incontrôlable ;	☐
D) Maladies inflammatoires du colon.	☐

27) Le débit de la perfusion pour une prescription de SG 5% 1L / 6h est de :

A) 30 gouttes/minute ;	☐
B) 56 gouttes/minute ;	☒
C) 70 gouttes/minute ;	☐
D) 45 gouttes/minute.	☐

28) Les différentes actions des pansements sont :

A) Action cicatrisante ;	☒
B) Action désinfectante ;	☒
C) Action antalgique ;	☒
D) Action absorbante.	☒

29) La promotion de la nutrition en milieu scolaire et universitaire a besoin de :

A) Elaboration et mise en place d'un plan d'éducation nutritionnelle au niveau des établissements scolaires et universitaires ;	☐
B) Renforcement de la composante nutrition dans le cursus d'enseignement primaire en collaboration avec le ministère de l'Education Nationale ;	☒
C) Instauration de normes pour améliorer la qualité des aliments au Niveau des cantines scolaires et universitaires.	☒
D) Renforcement de la composante nutrition dans les actions communautaires.	☐

30) Les éléments de surveillance et d'évaluation de la diurèse sont :

A) **La quantité des urines collectées ;**	☒
B) **L'aspect des urines ;**	☒
C) **La couleur et l'odeur des urines ;**	☒
D) La présence d'albumine.	☐

31) Les indications de l'hémoculture sont :

A) **Hyperthermie ;**	☒
B) **Hypothermie ;**	☒
C) **Pic fébrile, frissons ;**	☒
D) **Réalisation d'un antibiogramme.**	☒

32) Le diagnostic de certitude de la tuberculose pulmonaire repose sur :

A) Les signes cliniques ;	☐
B) L'intradermo-réaction à la tuberculine ;	☐
C) L'examen radiologique ;	☐
D) **L'examen bactériologique.**	☒

33) Les maladies à caractère social :

A) **Paludisme ;**	☒
B) SIDA ;	☐
C) **Syphilis primaire et secondaire ;**	☒
D) Choléra.	☐

34) Les maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiques :

A) **Poliomyélite ;**	☒
B) **Trachome ;**	☒
C) Leptospirose ;	☐
D) **Urétrite gonococcique et non gonococcique.**	☒

35) La prévention du tétanos néo-natale :

A) Le lavage des mains ;	☐
B) L'administration du VAT (vaccination anti tétanique) ;	☒
C) La stérilisation du matériel ;	☒
D) L'administration du SAT (sérum anti tétanique).	☐

36) Parmi les maladies suivantes, celles qui sont immunisantes :

A) La rougeole ;	☒
B) Le choléra ;	☐
C) La rubéole ;	☒
D) La typhoïde.	☐

37) Les signes cliniques du choléra sont :

A) La diarrhée ;	☒
B) L'hyperthermie ;	☐
C) L'hypotension ;	☒
D) L'hypothermie.	☐

38) Les signes de gravite d'une diarrhée sont :

A) L'hypertension artérielle ;	☐
B) La déshydratation ;	☒
C) La perte de poids ;	☒
D) La soif intense.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس - وجدة -

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

(دورة 27 أبريل 2014)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Parmi les contres indications du lavage gastrique, on note :

A) En cas d'hémorragie ;	☐
B) Ingestion de produits caustiques ;	☐
C) Avant l'intervention sur l'estomac ;	☐
D) Produits radio opaques.	☐

2) Le tubage gastrique est indiqué :

A) Pour préciser le diagnostic devant l'anémie ;	☐
B) En cas d'hémorragie digestive datant moins de trois semaines ;	☐
C) Pour orienter le diagnostic vers l'ulcère, le cancer, ou la gastrite ;	☐
D) Pour faire le diagnostic des varices œsophagiennes.	☐

3) Au cours de la ponction pleurale, l'infirmier doit installer le malade :

A) En décubitus dorsal, tête basculée légèrement en arrière ;	☐
B) En position dorsale, la région thoracique est largement découverte ;	☐
C) En position ventrale sur la table d'examen ;	☐
D) En position assise au bord du lit, les pieds posés sur une chaise, les bras reposant sur un oreiller posé sur le genou.	☐

4) Avant l'urographie intraveineuse, l'infirmier doit préparer le malade pour :

A) La prise des petits repas et fréquemment ;	☐
B) La prise des enzymes digestifs pour compenser le déficit sécrétoire externe ;	☐
C) La radiographie abdomen sans préparation ;	☐
D) Le test à l'iode.	☐

5) **Parmi les facteurs favorisant la formation d'un caillot du sang chez le malade atteint de la phlébite, on cite :**

A) La modification du flux sanguin, principalement un ralentissement ;	☐
B) Les effets indésirables moteurs de la dopa thérapie ;	☐
C) L'altération de la paroi du vaisseau.	☐

6) **Devant le diabète insipide, l'infirmier doit surveille :**

A) Le dosage de la T3, de la T4 et la TSH ;	☐
B) La présence des symptômes d'un ralentissement physique et psychique ;	☐
C) L'augmentation de la néoglucogenèse hépatique ;	☐
D) La polyurie, la soif, la polydipsie, la température, l'agitation, l'angoisse, lié à la déshydratation.	☐

7) **Afin de collaborer dans le diagnostic de la maladie de cushing, l'infirmier doit :**

A) Surveiller l'état du malade et noter l'apparition des modifications morphologiques, cutanées et psychiques ;	☐
B) Faire les explorations hormonales (cortisolémie de 8 heures, de 16 heures, de 18 heures, cortisol libre urinaire dans les urines des 24 heures sous avis médical) ;	☐
C) Faire les examens biologiques prescrits par le médecin : NFS, ionogramme sanguin (kaliémie, calcémie, cholestérol) ;	☐
D) Préparer le malade pour les explorations dynamiques (test de freinage à la dexaméthasone (DXM) et le test de la métopirone).	☐

8) **Parmi les précautions à prendre en considération pour une bonne préparation du malade à la scintigraphie thyroïdienne :**

A) Conseiller les hormones thyroïdiennes absorbées de préférence le matin environ 30 minutes avant le petit déjeuner ;	☐
B) Vérifier si le patient a absorbé dans les quatre semaines qui précédent l'examen, des hormones thyroïdiennes, des préparations iodées ou des médicaments inhibant la thyroïde ;	☐
C) Vérifier l'efficacité du régime par la courbe pondérale du patient et le contrôle de la glycémie ;	☐
D) Planifier des examens avec des produits de contraste iodés et utiliser des antiseptiques iodés pour la désinfection de la peau.	☐

9) En cas de crise thyrotoxique (complication de l'hyperthyroïdie), l'infirmier doit :

A) Administrer les antithyroïdiens de synthèse, iode, beta bloquant, corticoïdes en IV conformément à la prescription médicale ;	☐
B) Effectuer le prélèvement de gorge pour culture bactériologique ;	☐
C) Administrer le traitement hypo-uricémies : colchicine prescrit par le médecin ;	☐
D) Calmer le malade au moyen de la sédation médicamenteuse à la base de diazépam (valium) conformément à la prescription médicale.	☐

10) Un porteur de germe :

A) Est une personne qui va assurer la diffusion de l'agent pathogène dans la collectivité ;	☐
B) Peut-être un porteur sain ;	☐
C) Peut-être un porteur chronique ;	☐
D) Peut-être un incubant précoce.	☐

11) La lutte contre la transmission des maladies transmissibles :

A) L'hygiène individuelle et collective ;	☐
B) L'éducation sanitaire ;	☐
C) Le contrôle de la salubrité des aliments ;	☐
D) La lutte anti vectorielle.	☐

12) Parmi les facteurs favorisant les mycoses :

A) L'utilisation fréquente de l'eau bicarbonatée ;	☐
B) Les corticoïdes ;	☐
C) Le diabète ;	☐
D) Le milieu buccal acide.	☐

13) Au Maroc la prévention de l'hépatite B est basée sur :

A) Le dépistage prénatal ;	☐
B) Le traitement antiviral ;	☐
C) Le dépistage en transfusion sanguine ;	☐
D) Le dépistage prénuptial.	☐

14) La prévention antipaludéenne :

A) En cas de fièvre, la goute épaisse est indiquée pour le dépistage ;	☐
B) Dépend de la zone du séjour ;	☐
C) Dépend des conditions de séjour ;	☐
D) Est basée sur la chimio prophylaxie.	☐

15) Les contres indications de la ponction biopsie du rein sont :

A) Atrophie rénale ;	☐
B) Insuffisance rénale aigue ;	☐
C) Troubles de la coagulation non corrigée ;	☐
D) Rein unique.	☐

16) Le dispositif intra utérin (DIU) :

A) Est un moyen contraceptif plus efficace que la pilule normo dosée ;	☐
B) Peut se compliquer d'une migration ;	☐
C) Doit être insérée à la 2ème partie du cycle ;	☐
D) L'infection génitale et la valvulopathie rhumatismale constituent des contre-indications.	☐

17) Les soins nécessaires chez les patients atteints de la goutte sont :

A) Inciter le malade à boire beaucoup afin d'augmenter la diurèse à 2L ;	☐
B) Conseiller une alimentation riche en purine ;	☐
C) Interdit tout apport de protéine ;	☐
D) Veuillez sur l'acidité des urines pour faciliter l'élimination de l'acide urique et s'opposer à la lithiase urique.	☐

18) Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque droite sont :

A) Expectoration rosée ;	☐
B) Dyspnée au repos et d'effort, cyanose ;	☐
C) Sang stagne dans la circulation générale ;	☐
D) Hépatomégalie, splénomégalie.	☐

19) Parmi les soins nécessaires en cas de syndromes néphrotiques :

A) Mise en œuvre d'une thrombo prophylaxie rigoureuse ;	☐
B) Préparer le malade pour les examens : échographie rénale, ponction biopsie rénale ;	☐
C) Faire les examens biologiques : dosage sanguin et urinaire l'amylasémie et amylasurie ;	☐
D) Interdit la consommation des produits laitiers.	☐

20) L'insuline est sécrétée par :

A) Les cellules d'hypophyse ;	☐
B) Les cellules des ilots de Langerhans ;	☐
C) Les cellules rénales ;	☐
D) Les cellules hépatiques.	☐

21) La fibroscopie est l'examen de première intention en cas de :

A) L'ulcère gastrique ;	☐
B) Le météorisme ;	☐
C) La pancréatite ;	☐
D) L'hépatite.	☐

22) Les voies aériennes supérieures comprennent :

A) Le diaphragme ;	☐
B) Le pharynx ;	☐
C) Les bronches ;	☐
D) Les fosses nasales.	☐

23) Les Diurétiques ont un effet :

A) L'augmentation de la diurèse ;	☐
B) L'élévation de la température ;	☐
C) La résorption des œdèmes ;	☐
D) La diminution du poids.	☐

24) Le diagnostic de la tuberculose est évoqué devant :

A) Une asthénie ;	☐
B) Un amaigrissement ;	☐
C) Toux persistante ;	☐
D) Bacillloscopie positive.	☐

25) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade soustraction sont :

A) La réfection du lit ;	☐
B) Les soins préventifs des escarres ;	☐
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) Le changement de la literie.	☐

26) Les mesures à prendre devant une transfusion sanguine :

A) Vérifier l'identité et groupage du patient ;	☐
B) Vérifier le groupe inscrit dans la poche de sang ;	☐
C) Vérifier la date de péremption du sang ;	☐
D) Faire un cross match.	☐

27) Les complications d'une hémorragie abondante sont :

A) Hypotension artérielle ;	☐
B) L'anémie ;	☐
C) Le déséquilibre hydro électrolytique ;	☐
D) Le choc hémorragique ;	☐

28) Les principaux conseils à donner à un autre diabétique non insulinodépendant sont :

A) Pratiquer du sport régulièrement ;	☐
B) Eviter les sucreries ;	☐
C) Suivre régulièrement le traitement ;	☐
D) Avoir une bonne hygiène corporelle.	☐

29) Hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) Un rejet de sang par la bouche lors d'un effort de vomissement ;	☐
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez.	☐

30) Les objectifs d'un plan de soins sont :

A) Diagnostiquer le problème ;	☐
B) Identifier les besoins ;	☐
C) Planifier les soins ;	☐
D) Evaluer l'activité infirmière.	☐

Correction proposée :

1) Parmi les contres indications du lavage gastrique, on note :

A) En cas d'hémorragie ;	☐
B) **Ingestion de produits caustiques ;**	☒
C) Avant l'intervention sur l'estomac ;	☐
D) Produits radio opaques.	☐

2) Le tubage gastrique est indiqué :

A) **Pour préciser le diagnostic devant l'anémie ;**	☒
B) **En cas d'hémorragie digestive datant moins de trois semaines ;**	☒
C) **Pour orienter le diagnostic vers l'ulcère, le cancer, ou la gastrite ;**	☒
D) Pour faire le diagnostic des varices œsophagiennes.	☐

3) Au cours de la ponction pleurale, l'infirmier doit installer le malade :

A) En décubitus dorsal, tête basculée légèrement en arrière ;	☐
B) En position dorsale, la région thoracique est largement découverte ;	☐
C) En position ventrale sur la table d'examen ;	☐
D) **En position assise au bord du lit, les pieds posés sur une chaise, les bras reposant sur un oreiller posé sur le genou.**	☒

4) Avant l'urographie intraveineuse, l'infirmier doit préparer le malade pour :

A) La prise des petits repas et fréquemment ;	☐
B) La prise des enzymes digestifs pour compenser le déficit sécrétoire externe ;	☐
C) **La radiographie abdomen sans préparation ;**	☒
D) **Le test à l'iode.**	☒

5) Parmi les facteurs favorisant la formation d'un caillot du sang chez le malade atteint de la phlébite, on cite :

A) **La modification du flux sanguin, principalement un ralentissement ;**	☒
B) Les effets indésirables moteurs de la dopa thérapie ;	☐
C) **L'altération de la paroi du vaisseau.**	☒

6) Devant le diabète insipide, l'infirmier doit surveille :

A) Le dosage de la T3, de la T4 et la TSH ;	☐
B) La présence des symptômes d'un ralentissement physique et psychique ;	☐
C) L'augmentation de la néoglucogenèse hépatique ;	☐
D) **La polyurie, la soif, la polydipsie, la température, l'agitation, l'angoisse, lié à la déshydratation.**	☒

7) Afin de collaborer dans le diagnostic de la maladie de cushing, l'infirmier doit :

A) **Surveiller l'état du malade et noter l'apparition des modifications morphologiques, cutanées et psychiques ;**	☒
B) Faire les explorations hormonales (cortisolémie de 8 heures, de 16 heures, de 18 heures, cortisol libre urinaire dans les urines des 24 heures sous avis médical) ;	☐
C) Faire les examens biologiques prescrits par le médecin : NFS, ionogramme sanguin (kaliémie, calcémie, cholestérol) ;	☐
D) **Préparer le malade pour les explorations dynamiques (test de freinage à la dexaméthasone (DXM) et le test de la métopirone).**	☒

8) Parmi les précautions à prendre en considération pour une bonne préparation du malade à la scintigraphie thyroïdienne :

A) Conseiller les hormones thyroïdiennes absorbées de préférence le matin environ 30 minutes avant le petit déjeuner ;	☐
B) **Vérifier si le patient a absorbé dans les quatre semaines qui précédent l'examen, des hormones thyroïdiennes, des préparations iodées ou des médicaments inhibant la thyroïde ;**	☒
C) Vérifier l'efficacité du régime par la courbe pondérale du patient et le contrôle de la glycémie ;	☐
D) Planifier des examens avec des produits de contraste iodés et utiliser des antiseptiques iodés pour la désinfection de la peau.	☐

9) En cas de crise thyrotoxique (complication de l'hyperthyroïdie), l'infirmier doit :

A) **Administrer les antithyroïdiens de synthèse, iode, beta bloquant, corticoïdes en IV conformément à la prescription médicale ;**	☒
B) Effectuer le prélèvement de gorge pour culture bactériologique ;	☐
C) Administrer le traitement hypo-uricémies : colchicine prescrit par le médecin ;	☐
D) **Calmer le malade au moyen de la sédation médicamenteuse à la base de diazépam (valium) conformément à la prescription médicale.**	☒

10) Un porteur de germe :

A) Est une personne qui va assurer la diffusion de l'agent pathogène dans la collectivité ;	☐
B) **Peut-être un porteur sain ;**	☒
C) **Peut-être un porteur chronique ;**	☒
D) **Peut-être un incubant précoce.**	☒

11) La lutte contre la transmission des maladies transmissibles :

A) **L'hygiène individuelle et collective ;**	☒
B) **L'éducation sanitaire ;**	☒
C) **Le contrôle de la salubrité des aliments ;**	☒
D) **La lutte anti vectorielle.**	☒

12) Parmi les facteurs favorisant les mycoses :

A) L'utilisation fréquente de l'eau bicarbonatée ;	☐
B) **Les corticoïdes ;**	☐
C) **Le diabète ;**	☒
D) **Le milieu buccal acide.**	☒

13) Au Maroc la prévention de l'hépatite B est basée sur :

A) Le dépistage prénatal ;	☐
B) Le traitement antiviral ;	☐
C) **Le dépistage en transfusion sanguine ;**	☒
D) Le dépistage prénuptial.	☐

14) La prévention antipaludéenne :

A) En cas de fièvre, la goute épaisse est indiquée pour le dépistage ;	☒
B) Dépend de la zone du séjour ;	☒
C) Dépend des conditions de séjour ;	☒
D) Est basée sur la chimio prophylaxie.	☒

15) Les contres indications de la ponction biopsie du rein sont :

A) Atrophie rénale ;	☒
B) Insuffisance rénale aigue ;	☐
C) Troubles de la coagulation non corrigée ;	☒
D) Rein unique.	☒

16) Le dispositif intra utérin (DIU) :

A) Est un moyen contraceptif plus efficace que la pilule normo dosée ;	☒
B) Peut se compliquer d'une migration ;	☒
C) Doit être insérée à la 2ème partie du cycle ;	☐
D) L'infection génitale et la valvulopathie rhumatismale constituent des contre-indications.	☒

17) Les soins nécessaires chez les patients atteints de la goutte sont :

A) Inciter le malade à boire beaucoup afin d'augmenter la diurèse à 2L ;	☒
B) Conseiller une alimentation riche en purine ;	☐
C) Interdit tout apport de protéine ;	☐
D) Veuillez sur l'acidité des urines pour faciliter l'élimination de l'acide urique et s'opposer à la lithiase urique.	☒

18) Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque droite sont :

A) Expectoration rosée ;	☐
B) Dyspnée au repos et d'effort, cyanose ;	☐
C) Sang stagne dans la circulation générale ;	☐
D) Hépatomégalie, splénomégalie.	☒

19) Parmi les soins nécessaires en cas de syndromes néphrotiques :

A) **Mise en œuvre d'une thrombo prophylaxie rigoureuse ;**	☐
B) **Préparer le malade pour les examens : échographie rénale, ponction biopsie rénale ;**	☒
C) Faire les examens biologiques : dosage sanguin et urinaire l'amylasémie et amylasurie ;	☐
D) Interdit la consommation des produits laitiers.	☐

20) L'insuline est sécrétée par :

A) Les cellules d'hypophyse ;	☐
B) **Les cellules des ilots de Langerhans ;**	☒
C) Les cellules rénales ;	☐
D) Les cellules hépatiques.	☐

21) La fibroscopie est l'examen de première intention en cas de :

A) **L'ulcère gastrique ;**	☒
B) Le météorisme ;	☐
C) La pancréatite ;	☐
D) L'hépatite.	☐

22) Les voies aériennes supérieures comprennent :

A) Le diaphragme ;	☐
B) **Le pharynx ;**	☒
C) Les bronches ;	☐
D) **Les fosses nasales.**	☒

23) Les Diurétiques ont un effet :

A) **L'augmentation de la diurèse ;**	☒
B) L'élévation de la température ;	☐
C) **La résorption des œdèmes ;**	☒
D) **La diminution du poids.**	☒

24) Le diagnostic de la tuberculose est évoqué devant :

A) Une asthénie ;	☒
B) Un amaigrissement ;	☒
C) Toux persistante ;	☒
D) Bacillloscopie positive.	☐

25) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade soustraction sont :

A) La réfection du lit ;	☒
B) Les soins préventifs des escarres ;	☒
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) Le changement de la literie.	☒

26) Les mesures à prendre devant une transfusion sanguine :

A) Vérifier l'identité et groupage du patient ;	☒
B) Vérifier le groupe inscrit dans la poche de sang ;	☒
C) Vérifier la date de péremption du sang ;	☒
D) Faire un cross match.	☒

27) Les complications d'une hémorragie abondante sont :

A) Hypotension artérielle ;	☒
B) L'anémie ;	☒
C) Le déséquilibre hydro électrolytique ;	☐
D) Le choc hémorragique ;	☒

28) Les principaux conseils à donner à un autre diabétique non insulinodépendant sont :

A) Pratiquer du sport régulièrement ;	☒
B) Eviter les sucreries ;	☒
C) Suivre régulièrement le traitement ;	☒
D) Avoir une bonne hygiène corporelle.	☒

29) Hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) **Un rejet de sang par la bouche lors d'un effort de vomissement ;**	☒
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez.	☐

30) Les objectifs d'un plan de soins sont :

A) **Diagnostiquer le problème ;**	☒
B) **Identifier les besoins ;**	☒
C) **Planifier les soins ;**	☒
D) **Evaluer l'activité infirmière.**	☒


2013

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 24 مارس 2013)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Parmi les complications du décubitus, on note :

A) Anorexie ;	☐
B) Constipation ;	☐
C) Infection urinaire ;	☐
D) Atrophie musculaire.	☐

2) Pour prévenir la survenue des escarres chez un malade alité, il faut :

A) Lui donner à boire beaucoup ;	☐
B) Lui changer de position toutes les 30 minutes ;	☐
C) Lui changer de position toutes les 3 heures ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

3) Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie ?

A) Tremblement ;	☐
B) Sueur ;	☐
C) Trouble de comportement ;	☐
D) Haleine acétonique.	☐

4) La stérilisation est :

A) Est la lutte contre une infection déjà existante ;	☐
B) Est la protection et l'isolement des plaies par un pansement stérile ;	☐
C) Est la désinfection des mains ;	☐
D) Est la désinfection de tous les germes pathogènes ou non.	☐

5) Dans la planification des soins, il faut tenir compte de :

A) Besoin fondamentaux insatisfaits ;	☐
B) Signes cliniques ;	☐
C) Diagnostic médical.	☐

6) Le groupe sanguin dit donneur universel est :

A) Le groupe A ;	☐
B) Le groupe B ;	☐
C) Le groupe O ;	☐
D) Le groupe AB.	☐

7) Les avantages du dossier infirmier :

A) Diagnostiquer les problèmes du patient ; diagnostic infirmier ;	☐
B) Identifier les besoins du patient ;	☐
C) Planifier les soins ;	☐
D) Assurer les transmissions infirmières.	☐

8) Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

A) La méningite purulente ;	☐
B) Les infections ORL ;	☐
C) L'abcès du cerveau ;	☐
D) Le traumatisme crânien.	☐

9) Parmi les complications du diabète, on note :

A) Les rétinopathies ;	☐
B) Les néphropathies ;	☐
C) La phlébite ;	☐
D) L'hypertension artérielle.	☐

10) L'insuline est une hormone sécrétée par :

A) Le foie ;	☐
B) La rate ;	☐
C) Le pancréas exocrine ;	☐
D) Le pancréas endocrine.	☐

11) L'infarctus du myocarde c'est :

A) L'oblitération brutale de l'artère pulmonaire ;	☐
B) L'oblitération d'une veine d'un membre inférieur ;	☐
C) Une nécrose d'origine ischémique d'une partie du muscle cardiaque ;	☐
D) La rupture d'un vaisseau sanguin.	☐

12) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;	☐
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez.	☐

13) L'infarctus du myocarde c'est :

A) L'oblitération brutale de l'artère pulmonaire ;	☐
B) L'oblitération d'une veine d'un membre inférieur ;	☐
C) Une nécrose d'origine ischémique d'une partie du muscle cardiaque ;	☐
D) La rupture d'un vaisseau sanguin.	☐

14) Une infection nosocomiale peut se déclarer chez le malade hospitalisé :

A) Au moment de l'hospitalisation ;	☐
B) 24 heures après son hospitalisation ;	☐
C) 48 heures après son hospitalisation ;	☐
D) 48 heures après sa sortie de l'hôpital.	☐

15) Les conseils à donner à la mère d'un nourrisson fébrile sont :

A) Donner à boire au nourrisson en quantité abondante ;	☐
B) Dévêtir le nourrisson ;	☐
C) Lui administrer un bain d'eau froide ;	☐
D) Le réchauffer avec des couvertures en cas de frissons.	☐

16) Les soins palliatifs consistent à :

A) Donner des antalgiques ;	☐
B) Accompagner le cancéreux en fin de sa vie ;	☐
C) Accompagner le cancéreux en fin de vie et ses proches ;	☐
D) Parler de la maladie aux proches.	☐

17) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade sous traction sont :

A) La réfection du lit ;	☐
B) Les soins préventifs des escarres ;	☐
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) Le changement de la literie.	☐

18) L'embolie pulmonaire c'est :

A) Une thrombose coronaire aigue ;	☐
B) L'oblitération brutale de l'artère pulmonaire ;	☐
C) La respiration rapide et superficielle ;	☐
D) Les variations de la température, du rythme respiratoire.	☐

19) En cas de phlébite, quels sont les gestes infirmiers nécessaires pour le malade ?

A) Immobiliser le membre atteint ;	☐
B) Mettre le malade en position proclive ;	☐
C) Conseiller au malade de minimiser les mouvements ;	☐
D) Surveiller le pouls et la température.	☐

20) Les principaux conseils à donner à un adulte diabétique non insulinodépendant :

A) Pratiquer de sport régulièrement ;	☐
B) Eviter les sucreries ;	☐
C) Suivre régulièrement le traitement ;	☐
D) Adopter une alimentation diversifiée riche en glucides.	☐

21) Les avantages du premier lever de l'opéré :

A) Fonctionne le transit intestinal ;	☐
B) Baisser la température du patient ;	☐
C) Permettre au malade de faire sa toilette ;	☐
D) Faciliter la circulation sanguine.	☐

22) Les facteurs favorisants des escarres :

A) L'état nutritionnel ;	☐
B) L'immobilité ;	☐
C) L'incontinence urinaire ;	☐
D) La perte de la sensibilité.	☐

23) Signes généraux des hémorragies :

A) Pouls rapide filant, peu perceptible ;	☐
B) Respiration rapide et superficielle ;	☐
C) Pâleur, moiteur ou sueurs ;	☐
D) Bradycardie.	☐

24) La diurèse c'est :

A) Les boissons intégrées par une personne en 24h ;	☐
B) La quantité d'urine recueille en 24h ;	☐
C) La couleur jaune des urines ;	☐
D) Recueil d'urine, par l'intermédiaire d'une sonde.	☐

25) La pression différentielle de la TA correspond à :

A) L'élévation des deux chiffres ;	☐
B) L'abaissement des deux chiffres ;	☐
C) L'écartement entre les chiffres ;	☐
D) La tension diastolique.	☐

26) Le syndrome de Walkman touche un patient porteur de plâtre du membre inférieur :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

27) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade alité sont :

A) La réfection du lit ;	☐
B) Les soins préventifs des escarres ;	☐
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) Le changement de la literie.	☐

28) L'antagoniste de l'héparine est la vitamine K :

A) Vrai ;	☐
B) Faux ;	☐

29) En cas de phlébite, il faut mobiliser le membre atteint :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

30) Les frissons c'est un signe évocateur d'incidents et accidents transfusionnels :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

31) L'injection intramusculaire est à éviter chez un malade sous traitement anticoagulant :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

32) Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

33) Le bandage sert à maintenir un pansement :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

34) La méningite est une maladie manu portée :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

35) La pose d'un appareil plâtré se fait sur une fracture ouverte :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

36) Le diagnostic infirmier se fait selon les besoins fondamentaux :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 24 مارس 2013)

Correction proposée :

1) Parmi les complications du décubitus, on note :

A) **Anorexie ;**	☒
B) **Constipation ;**	☒
C) **Infection urinaire ;**	☒
D) **Atrophie musculaire.**	☒

2) Pour prévenir la survenue des escarres chez un malade alité, il faut :

A) Lui donner à boire beaucoup ;	☐
B) Lui changer de position toutes les 30 minutes ;	☐
C) **Lui changer de position toutes les 3 heures ;**	☒
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

3) Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie ?

A) **Tremblement ;**	☒
B) **Sueur ;**	☒
C) **Trouble de comportement ;**	☒
D) Haleine acétonique.	☐

4) La stérilisation est :

A) Est la lutte contre une infection déjà existante ;	☐
B) Est la protection et l'isolement des plaies par un pansement stérile ;	☐
C) Est la désinfection des mains ;	☐
D) **Est la désinfection de tous les germes pathogènes ou non.**	☒

5) Dans la planification des soins, il faut tenir compte de :

A) Besoin fondamentaux insatisfaits ;	☒
B) Signes cliniques ;	☒
C) Diagnostic médical.	☐

6) Le groupe sanguin dit donneur universel est :

A) Le groupe A ;	☐
B) Le groupe B ;	☐
C) Le groupe O ;	☒
D) Le groupe AB.	☐

7) Les avantages du dossier infirmier :

A) Diagnostiquer les problèmes du patient ; diagnostic infirmier ;	☒
B) Identifier les besoins du patient ;	☒
C) Planifier les soins ;	☒
D) Assurer les transmissions infirmières.	☒

8) Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

A) La méningite purulente ;	☒
B) Les infections ORL ;	☒
C) L'abcès du cerveau ;	☒
D) Le traumatisme crânien.	☒

9) Parmi les complications du diabète, on note :

A) Les rétinopathies ;	☒
B) Les néphropathies ;	☒
C) La phlébite ;	☐
D) L'hypertension artérielle.	☒

10) L'insuline est une hormone sécrétée par :

A) Le foie ;	☐
B) La rate ;	☐
C) Le pancréas exocrine ;	☐
D) Le pancréas endocrine.	☒

11) L'infarctus du myocarde c'est :

A) L'oblitération brutale de l'artère pulmonaire ;	☐
B) L'oblitération d'une veine d'un membre inférieur ;	☐
C) **Une nécrose d'origine ischémique d'une partie du muscle cardiaque ;**	☒
D) La rupture d'un vaisseau sanguin.	☐

12) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) **Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;**	☒
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez.	☐

13) L'infarctus du myocarde c'est :

A) L'oblitération brutale de l'artère pulmonaire ;	☐
B) L'oblitération d'une veine d'un membre inférieur ;	☐
C) **Une nécrose d'origine ischémique d'une partie du muscle cardiaque ;**	☒
D) La rupture d'un vaisseau sanguin.	☐

14) Une infection nosocomiale peut se déclarer chez le malade hospitalisé :

A) Au moment de l'hospitalisation ;	☐
B) 24 heures après son hospitalisation ;	☐
C) **48 heures après son hospitalisation ;**	☒
D) 48 heures après sa sortie de l'hôpital.	☐

15) Les conseils à donner à la mère d'un nourrisson fébrile sont :

A) **Donner à boire au nourrisson en quantité abondante ;**	☒
B) **Dévêtir le nourrisson ;**	☒
C) Lui administrer un bain d'eau froide ;	☐
D) Le réchauffer avec des couvertures en cas de frissons.	☐

16) Les soins palliatifs consistent à :

A) **Donner des antalgiques ;**	☒
B) Accompagner le cancéreux en fin de sa vie ;	☐
C) **Accompagner le cancéreux en fin de vie et ses proches ;**	☒
D) Parler de la maladie aux proches.	☐

17) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade sous traction sont :

A) **La réfection du lit ;**	☒
B) **Les soins préventifs des escarres ;**	☒
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) **Le changement de la literie.**	☒

18) L'embolie pulmonaire c'est :

A) Une thrombose coronaire aigue ;	☐
B) **L'oblitération brutale de l'artère pulmonaire ;**	☒
C) La respiration rapide et superficielle ;	☐
D) Les variations de la température, du rythme respiratoire.	☐

19) En cas de phlébite, quels sont les gestes infirmiers nécessaires pour le malade ?

A) **Immobiliser le membre atteint ;**	☒
B) Mettre le malade en position proclive ;	☐
C) **Conseiller au malade de minimiser les mouvements ;**	☒
D) **Surveiller le pouls et la température.**	☒

20) Les principaux conseils à donner à un adulte diabétique non insulinodépendant :

A) **Pratiquer de sport régulièrement ;**	☒
B) **Eviter les sucreries ;**	☒
C) **Suivre régulièrement le traitement ;**	☒
D) Adopter une alimentation diversifiée riche en glucides.	☐

21) Les avantages du premier lever de l'opéré :

A) Fonctionne le transit intestinal ;	☒
B) Baisser la température du patient ;	☐
C) Permettre au malade de faire sa toilette ;	☒
D) Faciliter la circulation sanguine.	☒

22) Les facteurs favorisants des escarres :

A) L'état nutritionnel ;	☒
B) L'immobilité ;	☒
C) L'incontinence urinaire ;	☒
D) La perte de la sensibilité.	☒

23) Signes généraux des hémorragies :

A) Pouls rapide filant, peu perceptible ;	☒
B) Respiration rapide et superficielle ;	☒
C) Pâleur, moiteur ou sueurs ;	☒
D) Bradycardie.	☐

24) La diurèse c'est :

A) Les boissons intégrées par une personne en 24h ;	☐
B) La quantité d'urine recueille en 24h ;	☒
C) La couleur jaune des urines ;	☐
D) Recueil d'urine, par l'intermédiaire d'une sonde.	☐

25) La pression différentielle de la TA correspond à :

A) L'élévation des deux chiffres ;	☐
B) L'abaissement des deux chiffres ;	☐
C) L'écartement entre les chiffres ;	☒
D) La tension diastolique.	☐

26) Le syndrome de Walkman touche un patient porteur de plâtre du membre inférieur :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

27) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade alité sont :

A) La réfection du lit ;	☒
B) Les soins préventifs des escarres ;	☒
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) Le changement de la literie.	☒

28) L'antagoniste de l'héparine est la vitamine K :

A) Vrai ;	☐
B) Faux ;	☒

29) En cas de phlébite, il faut mobiliser le membre atteint :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

30) Les frissons c'est un signe évocateur d'incidents et accidents transfusionnels :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

31) L'injection intramusculaire est à éviter chez un malade sous traitement anticoagulant :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

32) Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

33) Le bandage sert à maintenir un pansement :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

34) La méningite est une maladie manu portée :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

35) La pose d'un appareil plâtré se fait sur une fracture ouverte :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

36) Le diagnostic infirmier se fait selon les besoins fondamentaux :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

2012

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 03 مارس 2012)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) **Après la pose d'une perfusion, il faut surveiller :**

A) La conscience du malade ;	☐
B) Le débit ;	☐
C) Que la voie soit maintenue ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

2) **La cible tensionnelle systolique à atteindre chez les sujets de plus de 80 ans :**

A) < 140 mm Hg ;	☐
B) < 150 mm Hg ;	☐
C) < 160 mm Hg.	☐

3) **Dans quelle situation peut-on être amené à associer une sérothérapie à la vaccination ?**

A) Hépatite virale A ;	☐
B) Rage ;	☐
C) Tétanos ;	☐
D) Hépatite B ;	☐
E) Varicelle.	☐

4) **La prévention de l'infection prévoit plusieurs étapes, les quelles :**

A) Le lavage des mains ;	☐
B) Le port des gants ;	☐
C) Le traitement du matériel ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

5) La transmission de l'hépatite A se fait :

A) Par voie sexuelle ;	☐
B) Par voie parentérale ;	☐
C) Par voie materno-fœtale ;	☐
D) Par voie oro-fécale.	☐

6) Les signes cliniques du marasme chez un enfant sont :

A) Présence d'œdèmes constants ;	☐
B) Des cheveux ternes décolorés cassant se laissant arracher facilement ;	☐
C) Amaigrissement très net ;	☐
D) Enfant fatigué au regard anxieux.	☐

7) Les complications des angines à répétition mal traitées sont :

A) L'arthrite septique ;	☐
B) Le rhumatisme articulaire aiguë ;	☐
C) La glomérulonéphrite aiguë ;	☐
D) Les complications cardiaques.	☐

8) Vous veillez à la qualité des soins et à la sécurité des utilisateurs du service de SMI, dites comment vous conservez le vaccin B.C.G :

A) Au réfrigérateur entre 0 et +8° ;	☐
B) Au réfrigérateur entre 0 et +12° ;	☐
C) Au congélateur à -20° ;	☐
D) Au réfrigérateur entre 0 et +18° ;	☐
E) Au congélateur à -5°.	☐

NB : Actuellement, le vaccin (B.C.G) doit être entreposé entre **+2 °C et +8 °C**.

9) Quel régime faut-il conseiller pour un enfant atteint de syndrome néphrotique :

A) Régime sans sucre ;	☐
B) Régime sans sel ;	☐
C) Régime hyper protidique ;	☐
D) Régime hypo protidique ;	☐
E) Régime hypo glucidique.	☐

10) Les signes cliniques de la typhoïde sont :

A) Fièvre prolongée ;	☐
B) Céphalées/ Vertiges et asthénie ;	☐
C) Ascite ;	☐
D) Dissociation entre pouls et température.	☐

11) Le premier lever de l'opéré a pour but :

A) Eviter les complications de décubitus ;	☐
B) Faciliter la reprise du transit intestinal ;	☐
C) Améliorer les suites opératoires ;	☐
D) Prévenir la formation de la thrombose veineuse.	☐

12) Cochez les maladies à transmission hydrique :

A) La tuberculose ;	☐
B) La typhoïde ;	☐
C) La grippe ;	☐
D) Le choléra.	☐

13) Le programme national d'immunisation cible uniquement la population cible des :

A) Enfants âgés de 0 à 2 ans ;	☐
B) Enfants âgés de 0 à 5 ans ;	☐
C) Enfants âgés de 0 à 5 ans, et les femmes âgées de 15 ans à 45 ans ;	☐
D) Enfants âgés de 0 à 2 ans, et les femmes âgées de 15 ans à 45 ans.	☐

14) Dans le cadre de prévention du rachitisme, le PNI préconise la prise de la vitamine D à la dose :

A) 200.000 UI ;	☐
B) 400.000 UI ;	☐
C) 600.000 UI ;	☐
D) 800.000 UI ;	☐
E) 120.000 UI.	☐

15) La taille de l'enfant double :

A) 6 mois ;	☐
B) 1 an ;	☐
C) 2 ans ;	☐
D) 3 ans.	☐

16) La dentition définitive double vers l'âge de :

A) 6 mois ;	☐
B) 24 mois ;	☐
C) 3 ans ;	☐
D) 6 ans.	☐

17) La dose de la vitamine A à donner à l'enfant à 6 mois est :

A) 200.000 UI ;	☐
B) 10.000 UI ;	☐
C) 100.000 UI ;	☐
D) 20.000 UI.	☐

18) Après un accouchement la pose de DIU peut se faire :

A) 3 semaines après l'accouchement ;	☐
B) 4 semaines après l'accouchement ;	☐
C) 5 semaines après l'accouchement ;	☐
D) 6 semaines après l'accouchement.	☐

19) Vous recevez au niveau de la cellule de SMI une jeune accouchée depuis 5 jours qui présente un engorgement mammaire avec fièvre et qui allaite son enfant que faire :

A) Faire un bandage des seins ;	☐
B) Appliquer des compresses chaudes pour apaiser la douleur ;	☐
C) Appliquer des compresses froides entre les tétés ;	☐
D) Lui masser la nuque et le dos ;	☐
E) Lui montrer et l'aider à mettre son enfant au sein.	☐

20) Cochez le premier geste à faire devant un accident transfusionnel :

A) Placer le malade en position assise ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☐
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Réchauffer le malade ;	☐
E) Faire un cross match.	☐

21) L'intervalle minimum à respecter entre les différents doses d'un même vaccin est de :

A) 3 semaines ;	☐
B) 4 semaines ;	☐
C) 5 semaines ;	☐
D) 6 semaines.	☐

22) Une femme allaitante peut commencer la prise de la pilule micro progestative :

A) 3 semaines après l'accouchement ;	☐
B) 4 semaines après l'accouchement ;	☐
C) 5 semaines après l'accouchement ;	☐
D) 6 semaines après l'accouchement.	☐

23) Le régime hyposodé est indiqué dans les situations suivantes :

A) Etat œdémateux d'origine cardiaque ou hépatique.	☐
B) Insuffisance surrénalienne.	☐
C) Hypertension artérielle.	☐
D) Traitement par lithium.	☐
E) Corticothérapie.	☐

24) L'hystérosalpingographie est contre indiquée en cas :

A) Infection génitale ;	☐
B) Grossesse ;	☐
C) Fibrome utérin ;	☐
D) Allergie à l'iode.	☐

25) La radiographie pulmonaire permet de faire le diagnostic de certitude de la tuberculose :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

26) Les solutés hypertoniques peuvent être administrées par voie intraveineuse :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

27) La prévention du tétanos néonatal se fait par l'administration du SAT (sérum antitétanique) :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

28) Pour décontaminer le matériel souillé on utilise l'hypochlorite de sodium à 5% :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

29) Le moyen le plus sûr pour stériliser le linge du bloc opératoire est l'autoclave :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

30) La désinfection de haut niveau peut être efficace pour stériliser le matériel endoscopique :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 03 مارس 2012)

Correction proposée :

1) **Après la pose d'une perfusion, il faut surveiller :**

A) La conscience du malade ;	☐
B) Le débit ;	☐
C) Que la voie soit maintenue ;	☐
D) **Toutes les réponses sont justes.**	☒

2) **La cible tensionnelle systolique à atteindre chez les sujets de plus de 80 ans :**

A) < 140 mm Hg ;	☐
B) < 150 mm Hg ;	☐
C) **< 160 mm Hg.**	☒

3) **Dans quelle situation peut-on être amené à associer une sérothérapie à la vaccination ?**

A) Hépatite virale A ;	☐
B) **Rage ;**	☒
C) **Tétanos ;**	☒
D) Hépatite B ;	☐
E) Varicelle.	☐

4) **La prévention de l'infection prévoit plusieurs étapes, les quelles :**

A) Le lavage des mains ;	☐
B) Le port des gants ;	☐
C) Le traitement du matériel ;	☐
D) **Toutes les réponses sont justes.**	☒

5) La transmission de l'hépatite A se fait :

A) Par voie sexuelle ;	☐
B) Par voie parentérale ;	☐
C) Par voie materno-fœtale ;	☐
D) Par voie oro-fécale.	☒

6) Les signes cliniques du marasme chez un enfant sont :

A) Présence d'œdèmes constants ;	☐
B) Des cheveux ternes décolorés cassant se laissant arracher facilement ;	☐
C) Amaigrissement très net ;	☒
D) Enfant fatigué au regard anxieux.	☒

7) Les complications des angines à répétition mal traitées sont :

A) L'arthrite septique ;	☐
B) Le rhumatisme articulaire aiguë ;	☒
C) La glomérulonéphrite aiguë ;	☒
D) Les complications cardiaques.	☒

8) Vous veillez à la qualité des soins et à la sécurité des utilisateurs du service de SMI, dites comment vous conservez le vaccin B.C.G :

A) Au réfrigérateur entre 0 et +8° ;	☒
B) Au réfrigérateur entre 0 et +12° ;	☐
C) Au congélateur à -20° ;	☐
D) Au réfrigérateur entre 0 et +18° ;	☐
E) Au congélateur à -5°.	☐

NB : Actuellement, le vaccin (B.C.G) doit être entreposé entre **+2 °C et +8 °C**.

9) Quel régime faut-il conseiller pour un enfant atteint de syndrome néphrotique :

A) Régime sans sucre ;	☐
B) Régime sans sel ;	☒
C) Régime hyper protidique ;	☐
D) Régime hypo protidique ;	☐
E) Régime hypo glucidique.	☐

10) Les signes cliniques de la typhoïde sont :

A) Fièvre prolongée ;	☒
B) Céphalées/ Vertiges et asthénie ;	☒
C) Ascite ;	☐
D) Dissociation entre pouls et température.	☒

11) Le premier lever de l'opéré a pour but :

A) Eviter les complications de décubitus ;	☒
B) Faciliter la reprise du transit intestinal ;	☒
C) Améliorer les suites opératoires ;	☒
D) Prévenir la formation de la thrombose veineuse.	☒

12) Cochez les maladies à transmission hydrique :

A) La tuberculose ;	☐
B) La typhoïde ;	☒
C) La grippe ;	☐
D) Le choléra.	☒

13) Le programme national d'immunisation cible uniquement la population cible des :

A) Enfants âgés de 0 à 2 ans ;	☐
B) Enfants âgés de 0 à 5 ans ;	☐
C) Enfants âgés de 0 à 5 ans, et les femmes âgées de 15 ans à 45 ans ;	☒
D) Enfants âgés de 0 à 2 ans, et les femmes âgées de 15 ans à 45 ans.	☐

14) Dans le cadre de prévention du rachitisme, le PNI préconise la prise de la vitamine D à la dose :

A) 200.000 UI ;	☒
B) 400.000 UI ;	☐
C) 600.000 UI ;	☐
D) 800.000 UI ;	☐
E) 120.000 UI.	☐

15) La taille de l'enfant double :

A) 6 mois ;	☐
B) 1 an ;	☐
C) 2 ans ;	☐
D) 3 ans.	☒

16) La dentition définitive double vers l'âge de :

A) 6 mois ;	☐
B) 24 mois ;	☐
C) 3 ans ;	☐
D) 6 ans.	☒

17) La dose de la vitamine A à donner à l'enfant à 6 mois est :

A) 200.000 UI ;	☐
B) 10.000 UI ;	☐
C) 100.000 UI ;	☒
D) 20.000 UI.	☐

18) Après un accouchement la pose de DIU peut se faire :

A) 3 semaines après l'accouchement ;	☐
B) 4 semaines après l'accouchement ;	☐
C) 5 semaines après l'accouchement ;	☐
D) 6 semaines après l'accouchement.	☒

19) Vous recevez au niveau de la cellule de SMI une jeune accouchée depuis 5 jours qui présente un engorgement mammaire avec fièvre et qui allaite son enfant que faire :

A) Faire un bandage des seins ;	☐
B) Appliquer des compresses chaudes pour apaiser la douleur ;	☒
C) Appliquer des compresses froides entre les tétés ;	☐
D) Lui masser la nuque et le dos ;	☐
E) Lui montrer et l'aider à mettre son enfant au sein.	☒

20) Cochez le premier geste à faire devant un accident transfusionnel :

A) Placer le malade en position assise ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☒
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Réchauffer le malade ;	☐
E) Faire un cross match.	☐

21) L'intervalle minimum à respecter entre les différents doses d'un même vaccin est de :

A) 3 semaines ;	☐
B) 4 semaines ;	☒
C) 5 semaines ;	☐
D) 6 semaines.	☐

22) Une femme allaitante peut commencer la prise de la pilule micro progestative :

A) 3 semaines après l'accouchement ;	☐
B) 4 semaines après l'accouchement ;	☐
C) 5 semaines après l'accouchement ;	☐
D) 6 semaines après l'accouchement.	☒

23) Le régime hyposodé est indiqué dans les situations suivantes :

A) Etat œdémateux d'origine cardiaque ou hépatique.	☒
B) Insuffisance surrénalienne.	☐
C) Hypertension artérielle.	☒
D) Traitement par lithium.	☐
E) Corticothérapie.	☒

24) L'hystérosalpingographie est contre indiquée en cas :

A) Infection génitale ;	☒
B) Grossesse ;	☒
C) Fibrome utérin ;	☐
D) Allergie à l'iode.	☒

25) La radiographie pulmonaire permet de faire le diagnostic de certitude de la tuberculose :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

26) Les solutés hypertoniques peuvent être administrées par voie intraveineuse :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

27) La prévention du tétanos néonatal se fait par l'administration du SAT (sérum antitétanique) :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

28) Pour décontaminer le matériel souillé on utilise l'hypochlorite de sodium à 5% :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

29) Le moyen le plus sûr pour stériliser le linge du bloc opératoire est l'autoclave :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

30) La désinfection de haut niveau peut être efficace pour stériliser le matériel endoscopique :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

2011

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 12 فبراير 2011)

www.ispits.net

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Parmi les indications du lavage gastrique, on note :

A) En cas d'hémorragie ;	☐
B) Ingestion de produits caustiques ;	☐
C) Avant les interventions sur l'estomac ;	☐
D) Produits radio-opaques ;	☐
E) Antécédent de chirurgie gastrique.	☐

2) Le tubage gastrique est indiqué :

A) Pour étudier bactériologique des crachats ;	☐
B) En cas d'hémorragie digestive datant moins de 3 semaines ;	☐
C) Pour orienter le diagnostic vers l'ulcère, le cancer, ou la gastrite ;	☐
D) Pour préciser le diagnostic devant l'anémie ;	☐
E) Pour faire le test de restriction hydrique.	☐

3) Parmi les facteurs favorisant la formation d'un caillot du sang chez le malade atteint de la phlébite, on cite :

A) La modification du flux sanguin, principalement un ralentissement ;	☐
B) Les effets indésirables moteur de la dopa thérapie ;	☐
C) L'altération de la paroi d'un vaisseau ;	☐
D) Le dosage de sels biliaire, pigment biliaire en faveur d'une rétention biliaire ;	☐
E) La modification de la composition du sang, hypercoagubilité associé à certaines tumeurs.	☐

4) Au cours de la ponction pleurale, l'infirmier doit installer le malade :

A) En décubitus dorsal, tête basculée légèrement en arrière ;	☐
B) En position dorsale, la région thoracique est largement en arrière ;	☐
C) En position ventrale sur la table d'examen ;	☐
D) En position assise au bord du lit, les pieds posés sur une chaise, les bras reposant sur un oreiller posé sur les genoux ;	☐
E) En position dorsal, tête penchée en avant, avec un oreiller sur l'abdomen.	☐

5) Avant l'urographie intraveineuse, l'infirmier doit préparer le malade pour :

A) La prise des petits repas et fréquemment ;	☐
B) La prise des enzymes digestifs pour compenser le déficit sécrétoire externe ;	☐
C) La radiographie abdomen sans préparation ;	☐
D) Le test à l'iode ;	☐
E) Le régime sans résidus.	☐

6) Parmi les précautions à prendre en considération pour une bonne préparation du malade à la scintigraphie thyroïdienne :

A) Conseiller les hormones thyroïdiennes absorbées de préférence le matin, environ 30 min avant le petit déjeuner ;	☐
B) Vérifier si le patient a absorbé dans les 4 semaines qui précèdent l'examen, des hormones thyroïdiennes, des préparations iodées ou des médicaments inhibant la thyroïde ;	☐
C) Vérifier l'efficacité du régime par la courbe pondérale du patient et le contrôle de la glycémie ;	☐
D) Planifier des examens avec des produits de contraste iodés et utiliser des antiseptiques iodés pour la désinfection de la peau ;	☐
E) Après l'examen, inciter les patients à boire afin d'accélérer l'élimination de la substance radioactive.	☐

7) Devant le diabète insipide, l'infirmier doit surveiller :

A) Le dosage de la T3,de la T4 et la TSH ;	☐
B) La présence des symptômes d'un ralentissement physique et psychique ;	☐
C) l'augmentation de la néoglucogenèse hépatique ;	☐
D) Si le malade se plaint d'une sensibilité au froid, d'une prise de poids et des myxœdèmes ;	☐
E) La polyurie, la soif, la polydipsie, la température, l'agitation, l'angoisse liés à la déshydratation.	☐

8) Afin de collaborer dans le diagnostic de la maladie de Cushing, l'infirmier doit :

A) Surveiller l'état du malade et noter l'apparition des modifications morphologiques, cutanées et psychiques ;	☐
B) Faire les explorations hormonales (cortisol émie de 8 heures, de 16h ,de 18h,cortisol libre urinaire dans les urines des 24 h sous avis médical ;	☐
C) Faire les examens biologiques prescrits par le médecin : NFS ; ionogramme sanguin (Kalemie, calcémie, cholestérol) ;	☐
D) Prépare le malade pour les explorations dynamiques (test de freinage à la dexamethasonel (DXM) et le test à la métopirone ;	☐
E) Préparer le patient pour les examens radiologiques : TDM abdominal, échographie abdominale.	☐

9) En cas de crise de thyréotoxique (complication de l'hyperthyroïdie), l'infirmier doit :

A) Administrer les antithyroïdiens de synthèse, iode à forte dose ou lithium, bêtabloquant, corticoïdes en IV conformément à la prescription médicale ;	☐
B) Effectuer le prélèvement de gorge pour culture bactériologique ;	☐
C) Administrer le traitement hypo-uricémiant : colchicine prescrit par le médecin ;	☐
D) Hospitaliser immédiatement en soins intensifs et préparer le matériel de la réanimation ;	☐
E) Calmer le malade au moyen de la Sédation médicamenteuse à la base de diazépam (valium)conformément à la prescription médicale.	☐

10) L'insuline est sécrétée par :

A) Les acini pancréatiques ;	☐
B) Les cellules β des îlots de Langerhans ;	☐
C) Les cellules α des ilots de Langerhans ;	☐
D) Les cellules hépatiques.	☐

11) La fibroscopie est l'examen de 1ère intention en cas de :

A) L'ulcère gastrique ;	☐
B) Le météorisme ;	☐
C) La pancréatite ;	☐
D) L'hépatite C.	☐

12) Un porteur de germe :

A) Est une personne qui va assurer la diffusion de l'agent pathogène dans la collectivité ;	☐
B) Peut-être un porteur sain ;	☐
C) Peut-être un porteur chronique ;	☐
D) Peut-être un incubant précoce ;	☐
E) Peut-être un convalescent.	☐

13) La lutte contre la transmission des maladies transmissibles comporte :

A) L'hygiène individuelle et collective ;	☐
B) L'éducation sanitaire ;	☐
C) Le contrôle de la salubrité des aliments ;	☐
D) La lutte anti-vectorielle ;	☐
E) La protection personnelle (moustiquaires, répulsifs, condoms...).	☐

14) Parmi les facteurs favorisant la mycose :

A) L'utilisation fréquente de l'eau bicarbonatée ;	☐
B) Les corticoïdes ;	☐
C) Le diabète ;	☐
D) Le milieu buccal acide ;	☐
E) Les antibiotiques.	☐

15) Les voies aériennes supérieures comprennent :

A) Le larynx ;	☐
B) Le pharynx ;	☐
C) Les bronches ;	☐
D) Les fosses nasales.	☐

16) La prévention antipaludéenne chez les voyageurs internationaux :

A) Dépend de la durée de séjour ;	☐
B) Dépend de la zone de séjour ;	☐
C) Dépend des conditions de séjour ;	☐
D) Est basée sur la chimio-prophylaxie ;	☐
E) Est basée sur la prophylaxie des piquers d'anophèle.	☐

17) Au Maroc la prévention de l'Hépatite B est basée sur :

A) Le dépistage prénatal ;	☐
B) Le traitent anti-viral ;	☐
C) Le dépistage en transfusion sanguine ;	☐
D) Le dépistage prénuptial ;	☐
E) La vaccination dans le cadre du programme National d'immunisation.	☐

18) Les contre-indication de la ponction biopsique du rein sont :

A) Atrophie rénale ;	☐
B) Insuffisance rénale aigue ;	☐
C) Néphropathies ;	☐
D) Rein unique ;	☐
E) Syndrome néphrotique de l'adulte.	☐

19) Le traitement prolongé par les anti-inflammatoire stéroïdiens nécessite une surveillance biologique et radiologique par :

A) Radio des poumons ;	☐
B) Urétrocystoscope ;	☐
C) Temps de quick ;	☐
D) Radio du rachis ;	☐
E) Bilan rénal, cholestérol total, glycémie.	☐

20) Les soins nécessaires chez les patients atteints de la goutte :

A) Inciter le malade à boire beaucoup afin d'augmenter la diurèse à 2L ;	☐
B) Conseiller une alimentation riche en purine ;	☐
C) Interdit tout apport de protéine ;	☐
D) Veuillez sur l'acidité des urines pour faciliter l'élimination de l'acide urique et s'opposer à la lithiase urique ;	☐
E) Conseiller la consommation des sardines, par contre les produits laitiers sont interdits.	☐

21) Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque droite sont :

A) Expectoration rosée ;	☐
B) Dyspnée au repos et effort, cyanose ;	☐
C) Sang stagne dans la circulation générale ;	☐
D) Hépatomégalie, splénomégalie ;	☐
E) Œdèmes déclives au niveau des chevilles et des jambes.	☐

22) Parmi les soins nécessaires en cas de syndromes néphrotiques :

A) Mise en œuvre d'une thrombo-prophylaxie rigoureuse ;	☐
B) Préparer le malade pour les examens : ECG, radio du thorax ; Echographie rénale ; ponction biopsie rénale ;	☐
C) Faire les examens biologiques : dosage sanguin et urinaire l'amylasemie et amylasurie ;	☐
D) Interdit la consommation des produits laitiers ;	☐
E) Surveiller l'apparition des signes d'infection.	☐

23) Les diurétiques ont un effet sur :

A) L'augmentation de la diurèse ;	☐
B) L'élévation de la TA ;	☐
C) La résorption des œdèmes ;	☐
D) LA diminution de poids.	☐

24) Le diagnostic de la tuberculose est évoqué devant :

A) Une sthénie ;	☐
B) Amaigrissement ;	☐
C) Toux persistante ;	☐
D) Bacilloscopies positives.	☐

25) Les objectifs d'un plan de soins sont :

A) Diagnostiquer le problème ;	☐
B) Identifier les besoins ;	☐
C) Planifier les soins ;	☐
D) Evaluer l'activité infirmière ;	☐
E) Assurer les transmissions infirmières.	☐

26) Les précautions à prendre avant de démarrer une transfusion sanguine sont :

A) Vérifier l'identité et le groupage du patient ;	☐
B) Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang ;	☐
C) Vérifier la date de péremption du sang ;	☐
D) Faire le cross match ;	☐
E) Remplir la fiche transfusionnelle.	☐

27) Les complications d'une hémorragie abondante sont :

A) L'hypotension artérielle ;	☐
B) L'anémie ;	☐
C) Le déséquilibre hydro-electrolytique ;	☐
D) Le choc hémorragique ;	☐
E) Le choc anaphylactique.	☐

28) Les principaux conseils à donner à un diabétique non insulinodépendant sont :

A) Pratiquer du sport régulièrement ;	☐
B) Eviter les sucreries ;	☐
C) Suivre régulièrement le traitement ;	☐
D) Avoir une bonne hygiène corporelle ;	☐
E) Adopter une alimentation diversifiée riche en glucides.	☐

29) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;	☐
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez ;	☐
E) Un rejet de sang noirâtre par voie anale.	☐

30) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade sous traction sont :

A) La réfection du lit ;	☐
B) Les soins préventifs des escarres ;	☐
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) Le changement la literie ;	☐
E) La toilette intime.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 12 فبراير 2011)

Correction proposée :

1) Parmi les indications du lavage gastrique, on note :

A) **En cas d'hémorragie ;**	☒
B) Ingestion de produits caustiques ;	☐
C) **Avant les interventions sur l'estomac ;**	☒
D) **Produits radio-opaques ;**	☒
E) Antécédent de chirurgie gastrique.	☐

2) Le tubage gastrique est indiqué :

A) **Pour étudier bactériologique des crachats ;**	☒
B) En cas d'hémorragie digestive datant moins de 3 semaines ;	☐
C) **Pour orienter le diagnostic vers l'ulcère, le cancer, ou la gastrite ;**	☒
D) **Pour préciser le diagnostic devant l'anémie ;**	☒
E) Pour faire le test de restriction hydrique.	☐

3) Parmi les facteurs favorisant la formation d'un caillot du sang chez le malade atteint de la phlébite, on cite :

A) **La modification du flux sanguin, principalement un ralentissement ;**	☒
B) Les effets indésirables moteur de la dopa thérapie ;	☐
C) **L'altération de la paroi d'un vaisseau ;**	☒
D) Le dosage de sels biliaire, pigment biliaire en faveur d'une rétention biliaire ;	☐
E) **La modification de la composition du sang, hypercoagubilité associé à certaines tumeurs.**	☒

4) Au cours de la ponction pleurale, l'infirmier doit installer le malade :

A) En décubitus dorsal, tête basculée légèrement en arrière ;	☐
B) En position dorsale, la région thoracique est largement en arrière ;	☐
C) En position ventrale sur la table d'examen ;	☐
D) **En position assise au bord du lit, les pieds posés sur une chaise, les bras reposant sur un oreiller posé sur les genoux ;**	☒
E) En position dorsal, tête penchée en avant, avec un oreiller sur l'abdomen.	☐

5) Avant l'urographie intraveineuse, l'infirmier doit préparer le malade pour :

A) La prise des petits repas et fréquemment ;	☐
B) La prise des enzymes digestifs pour compenser le déficit sécrétoire externe ;	☐
C) **La radiographie abdomen sans préparation ;**	☒
D) **Le test à l'iode ;**	☒
E) **Le régime sans résidus.**	☒

6) Parmi les précautions à prendre en considération pour une bonne préparation du malade à la scintigraphie thyroïdienne :

A) Conseiller les hormones thyroïdiennes absorbées de préférence le matin, environ 30 min avant le petit déjeuner ;	☐
B) **Vérifier si le patient a absorbé dans les 4 semaines qui précèdent l'examen, des hormones thyroïdiennes, des préparations iodées ou des médicaments inhibant la thyroïde ;**	☒
C) Vérifier l'efficacité du régime par la courbe pondérale du patient et le contrôle de la glycémie ;	☐
D) Planifier des examens avec des produits de contraste iodés et utiliser des antiseptiques iodés pour la désinfection de la peau ;	☐
E) **Après l'examen, inciter les patients à boire afin d'accélérer l'élimination de la substance radioactive.**	☒

7) Devant le diabète insipide, l'infirmier doit surveiller :

A) Le dosage de la T3,de la T4 et la TSH ;	☐
B) La présence des symptômes d'un ralentissement physique et psychique ;	☐
C) l'augmentation de la néoglucogenèse hépatique ;	☐
D) Si le malade se plaint d'une sensibilité au froid, d'une prise de poids et des myxœdèmes ;	☐
E) **La polyurie, la soif, la polydipsie, la température, l'agitation, l'angoisse liés à la déshydratation.**	☒

8) Afin de collaborer dans le diagnostic de la maladie de Cushing, l'infirmier doit :

A) **Surveiller l'état du malade et noter l'apparition des modifications morphologiques, cutanées et psychiques ;**	☒
B) Faire les explorations hormonales (cortisol émie de 8 heures, de 16h ,de 18h,cortisol libre urinaire dans les urines des 24 h sous avis médical ;	☐
C) Faire les examens biologiques prescrits par le médecin : NFS ; ionogramme sanguin (Kalemie, calcémie, cholestérol) ;	☐
D) **Prépare le malade pour les explorations dynamiques (test de freinage à la dexamethasonel (DXM) et le test à la métopirone ;**	☒
E) Préparer le patient pour les examens radiologiques : TDM abdominal, échographie abdominale.	☐

9) En cas de crise de thyréotoxique (complication de l'hyperthyroïdie), l'infirmier doit :

A) **Administrer les antithyroïdiens de synthèse, iode à forte dose ou lithium, bêtabloquant, corticoïdes en IV conformément à la prescription médicale ;**	☒
B) Effectuer le prélèvement de gorge pour culture bactériologique ;	☐
C) Administrer le traitement hypo-uricémiant : colchicine prescrit par le médecin ;	☐
D) **Hospitaliser immédiatement en soins intensifs et préparer le matériel de la réanimation ;**	☒
E) **Calmer le malade au moyen de la Sédation médicamenteuse à la base de diazépam (valium)conformément à la prescription médicale.**	☒

10) L'insuline est sécrétée par :

A) Les acini pancréatiques ;	☐
B) **Les cellules β des îlots de Langerhans ;**	☒
C) Les cellules α des ilots de Langerhans ;	☐
D) Les cellules hépatiques.	☐

11) La fibroscopie est l'examen de 1ère intention en cas de :

A) **L'ulcère gastrique ;**	☒
B) Le météorisme ;	☐
C) La pancréatite ;	☐
D) L'hépatite C.	☐

12) Un porteur de germe :

A) Est une personne qui va assurer la diffusion de l'agent pathogène dans la collectivité ;	☒
B) Peut-être un porteur sain ;	☒
C) Peut-être un porteur chronique ;	☒
D) Peut-être un incubant précoce ;	☐
E) Peut-être un convalescent.	☒

13) La lutte contre la transmission des maladies transmissibles comporte :

A) L'hygiène individuelle et collective ;	☒
B) L'éducation sanitaire ;	☒
C) Le contrôle de la salubrité des aliments ;	☒
D) La lutte anti-vectorielle ;	☒
E) La protection personnelle (moustiquaires, répulsifs, condoms...).	☒

14) Parmi les facteurs favorisant la mycose :

A) L'utilisation fréquente de l'eau bicarbonatée ;	☐
B) Les corticoïdes ;	☒
C) Le diabète ;	☒
D) Le milieu buccal acide ;	☐
E) Les antibiotiques.	☒

15) Les voies aériennes supérieures comprennent :

A) Le larynx ;	☒
B) Le pharynx ;	☒
C) Les bronches ;	☐
D) Les fosses nasales.	☒

16) La prévention antipaludéenne chez les voyageurs internationaux :

A) Dépend de la durée de séjour ;	☐
B) Dépend de la zone de séjour ;	☒
C) Dépend des conditions de séjour ;	☐
D) Est basée sur la chimio-prophylaxie ;	☒
E) Est basée sur la prophylaxie des piquers d'anophèle.	☐

17) Au Maroc la prévention de l'Hépatite B est basée sur :

A) Le dépistage prénatal ;	☐
B) Le traitent anti-viral ;	☐
C) **Le dépistage en transfusion sanguine ;**	☒
D) Le dépistage prénuptial ;	☐
E) **La vaccination dans le cadre du programme National d'immunisation.**	☒

18) Les contre-indication de la ponction biopsique du rein sont :

A) **Atrophie rénale ;**	☒
B) Insuffisance rénale aigue ;	☐
C) Néphropathies ;	☐
D) **Rein unique ;**	☒
E) Syndrome néphrotique de l'adulte.	☐

19) Le traitement prolongé par les anti-inflammatoire stéroïdiens nécessite une surveillance biologique et radiologique par :

A) **Radio des poumons ;**	☒
B) Urétrocystoscope ;	☐
C) Temps de quick ;	☐
D) **Radio du rachis ;**	☒
E) **Bilan rénal, cholestérol total, glycémie.**	☒

20) Les soins nécessaires chez les patients atteints de la goutte :

A) **Inciter le malade à boire beaucoup afin d'augmenter la diurèse à 2L ;**	☒
B) Conseiller une alimentation riche en purine ;	☐
C) Interdit tout apport de protéine ;	☐
D) **Veuillez sur l'acidité des urines pour faciliter l'élimination de l'acide urique et s'opposer à la lithiase urique ;**	☒
E) Conseiller la consommation des sardines, par contre les produits laitiers sont interdits.	☐

21) Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque droite sont :

A) Expectoration rosée ;	☐
B) Dyspnée au repos et effort, cyanose ;	☐
C) Sang stagne dans la circulation générale ;	☐
D) **Hépatomégalie, splénomégalie ;**	☒
E) **Œdèmes déclives au niveau des chevilles et des jambes.**	☒

22) Parmi les soins nécessaires en cas de syndromes néphrotiques :

A) **Mise en œuvre d'une thrombo-prophylaxie rigoureuse ;**	☒
B) **Préparer le malade pour les examens : ECG, radio du thorax ; Echographie rénale ; ponction biopsie rénale ;**	☒
C) Faire les examens biologiques : dosage sanguin et urinaire l'amylasemie et amylasurie ;	☐
D) Interdit la consommation des produits laitiers ;	☐
E) **Surveiller l'apparition des signes d'infection.**	☒

23) Les diurétiques ont un effet sur :

A) **L'augmentation de la diurèse ;**	☒
B) L'élévation de la TA ;	☐
C) **La résorption des œdèmes ;**	☒
D) **LA diminution de poids.**	☒

24) Le diagnostic de la tuberculose est évoqué devant :

A) **Une sthénie ;**	☒
B) **Amaigrissement ;**	☒
C) **Toux persistante ;**	☒
D) Bacilloscopies positives.	☐

25) Les objectifs d'un plan de soins sont :

A) **Diagnostiquer le problème ;**	☒
B) **Identifier les besoins ;**	☒
C) **Planifier les soins ;**	☒
D) **Evaluer l'activité infirmière ;**	☒
E) **Assurer les transmissions infirmières.**	☒

26) Les précautions à prendre avant de démarrer une transfusion sanguine sont :

A) Vérifier l'identité et le groupage du patient ;	☒
B) Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang ;	☒
C) Vérifier la date de péremption du sang ;	☒
D) Faire le cross match ;	☒
E) Remplir la fiche transfusionnelle.	☒

27) Les complications d'une hémorragie abondante sont :

A) L'hypotension artérielle ;	☒
B) L'anémie ;	☒
C) Le déséquilibre hydro-electrolytique ;	☒
D) Le choc hémorragique ;	☒
E) Le choc anaphylactique.	☐

28) Les principaux conseils à donner à un diabétique non insulinodépendant sont :

A) Pratiquer du sport régulièrement ;	☒
B) Eviter les sucreries ;	☒
C) Suivre régulièrement le traitement ;	☒
D) Avoir une bonne hygiène corporelle ;	☒
E) Adopter une alimentation diversifiée riche en glucides.	☐

29) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;	☒
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez ;	☐
E) Un rejet de sang noirâtre par voie anale.	☐

30) Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade sous traction sont :

A) **La réfection du lit ;**	☒
B) **Les soins préventifs des escarres ;**	☒
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) **Le changement la literie ;**	☒
E) **La toilette intime.**	☒


2010

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 13 فبراير 2010)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La surveillance d'un patient sous héparine consiste à :

A) Faire un bilan de l'hémogramme chaque jour ;	☐
B) Vérifier si le patient rend des anti-inflammatoires ;	☐
C) Assurer une alimentation riche en lipides ;	☐
D) Contrôler les constantes (TA, T°, Pouls).	☐

2) La réparation du futur opéré est basée sur :

A) Le diagnostic du patient ;	☐
B) La compétence de l'équipe chirurgicale ;	☐
C) Les caractéristiques du patient ;	☐
D) La disponibilité du matériel opératoire.	☐

3) Un malade alité qui ne se déplace pas risque de faire :

A) Une infection urinaire ;	☐
B) Une phlébothrombose ;	☐
C) Des escarres ;	☐
D) Des constipations ;	☐
E) Des broncho-pneumopathies.	☐

4) Le diagnostic de certitude d'une tumeur maligne du poumon est fait :

A) L'IRM ;	☐
B) La tomodensitométrie ;	☐
C) L'examen anatomopathologique ;	☐
D) La biopsie.	☐

5) L'infection nosocomiale est une infection :

A) Intra hospitalière ;	☐
B) Communautaire ;	☐
C) Survenant 48 heures après l'hospitalisation ;	☐
D) Survenant quatre jours après l'hospitalisation.	☐

6) Un patient qui a un choc hémorragique présente les signes suivants :

A) Tension artérielle basse et pouls rapide ;	☐
B) Pâleur, frisson, angoisse, sueur froide ;	☐
C) Marbrure cutanée, soif intense ;	☐
D) Pouls filant, extrémités froides, cyanose.	☐

7) La torsion testiculaire est une urgence chirurgicale, peut-elle se compliquer par :

A) Une nécrose testiculaire ;	☐
B) Une stérilité ;	☐
C) Une anoxie et mortification testiculaire ;	☐
D) Une augmentation du volume du testicule atteint.	☐

8) Pour éviter les complications de décubitus, l'infirmier doit :

A) Faire marcher le patient ;	☐
B) Donner à boire aux malades au moins 1,5 litre par jour ;	☐
C) Placer un matelas anti escarre ;	☐
D) Faire des changements de position.	☐

9) Les premiers moyens de lutte contre l'infection nosocomiale sont :

A) Tenue complète et propre ;	☐
B) Hygiène des locaux et évacuation correcte des déchets ;	☐
C) Observance du lavage des mains ;	☐
D) Stérilisation du matériel ;	☐
E) Désinfection du matériel.	☐

10) Le dispositif intra utérin(DIU) est une méthode contraceptive indiquée :

A) Chez une femme nullipare ;	☐
B) Chez une femme allaitante ;	☐
C) Chez une femme ayant une contre-indication à une grossesse ;	☐
D) Chez une femme acceptant les troubles du cycle que pourrait induire le DIU ;	☐
E) Chez une femme en septième semaine en post-partum.	☐

11) Les méthodes contraceptives très efficaces (indice de Pearl < 1%AF) regroupent :

A) La vasectomie ;	☐
B) La stérilisation tubaire ;	☐
C) Les injectables ;	☐
D) Les implants ;	☐
E) La pilule œstro-progestative.	☐

12) La grippe A-H1N1 :

A) C'est une maladie pandémique ;	☐
B) D'origine porcine, aviaire et humaine ;	☐
C) D'origine porcine et humaine ;	☐
D) D'origine porcine, et aviaire.	☐

13) Les oreillons, c'est maladie Virale qui atteint :

A) Derrière les oreilles ;	☐
B) Les glandes salivaires ;	☐
C) Les oreilles ;	☐
D) Devant les oreilles.	☐

14) Les complications de la pneumonie sont :

A) Choc septique ;	☐
B) Pneumothorax ;	☐
C) Hémothorax ;	☐
D) Pyothorax.	☐

15) La contamination de la méningite se fait par :

A) Voie aérienne ;	☐
B) Voie digestive ;	☐
C) Voie sanguine ;	☐
D) Les gouttelettes de FLUGGE.	☐

16) La prise en charge du patient au niveau des urgences est :

A) Assurée selon un circuit standard quelque soit le degré de l'urgence ;	☐
B) Conditionnée par le triage systématique des patients ;	☐
C) Basée sur le principe du 1er venu est le 1er servi ;	☐
D) Tributaire de l'état de santé du patient.	☐

17) La reprise de l'alimentation de l'opéré est systématique le 2ème jour quelque soit la pathologie :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

18) La rougeole est une maladie immunisante :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

19) Le signe évocateur d'une méningite cérébrospinale est surtout la raideur de la nuque :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

20) La pose d'un appareil plâtré est indiquée en cas de fracture ouverte de la jambe :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 13 فبراير 2010)

Correction proposée :

1) La surveillance d'un patient sous héparine consiste à :

A) Faire un bilan de l'hémogramme chaque jour ;	☐
B) **Vérifier si le patient rend des anti-inflammatoires ;**	☒
C) Assurer une alimentation riche en lipides ;	☐
D) **Contrôler les constantes (TA, T°, Pouls).**	☒

2) La réparation du futur opéré est basée sur :

A) **Le diagnostic du patient ;**	☒
B) La compétence de l'équipe chirurgicale ;	☐
C) **Les caractéristiques du patient ;**	☒
D) **La disponibilité du matériel opératoire.**	☒

3) Un malade alité qui ne se déplace pas risque de faire :

A) **Une infection urinaire ;**	☒
B) **Une phlébothrombose ;**	☒
C) **Des escarres ;**	☒
D) **Des constipations ;**	☒
E) **Des broncho-pneumopathies.**	☒

4) Le diagnostic de certitude d'une tumeur maligne du poumon est fait :

A) L'IRM ;	☐
B) La tomodensitométrie ;	☐
C) **L'examen anatomopathologique ;**	☒
D) La biopsie.	☐

5) L'infection nosocomiale est une infection :

A) **Intra hospitalière ;**	☒
B) Communautaire ;	☐
C) **Survenant 48 heures après l'hospitalisation ;**	☒
D) Survenant quatre jours après l'hospitalisation.	☐

6) Un patient qui a un choc hémorragique présente les signes suivants :

A) **Tension artérielle basse et pouls rapide ;**	☒
B) **Pâleur, frisson, angoisse, sueur froide ;**	☒
C) **Marbrure cutanée, soif intense ;**	☒
D) Pouls filant, extrémités froides, cyanose.	☐

7) La torsion testiculaire est une urgence chirurgicale, peut-elle se compliquer par :

A) **Une nécrose testiculaire ;**	☒
B) **Une stérilité ;**	☒
C) **Une anoxie et mortification testiculaire ;**	☒
D) Une augmentation du volume du testicule atteint.	☐

8) Pour éviter les complications de décubitus, l'infirmier doit :

A) **Faire marcher le patient ;**	☒
B) **Donner à boire aux malades au moins 1,5 litre par jour ;**	☒
C) **Placer un matelas anti escarre ;**	☒
D) **Faire des changements de position.**	☒

9) Les premiers moyens de lutte contre l'infection nosocomiale sont :

A) **Tenue complète et propre ;**	☒
B) **Hygiène des locaux et évacuation correcte des déchets ;**	☒
C) **Observance du lavage des mains ;**	☒
D) **Stérilisation du matériel ;**	☒
E) Désinfection du matériel.	☐

10) Le dispositif intra utérin(DIU) est une méthode contraceptive indiquée :

A) Chez une femme nullipare ;	☐
B) **Chez une femme allaitante ;**	☒
C) **Chez une femme ayant une contre-indication à une grossesse ;**	☒
D) **Chez une femme acceptant les troubles du cycle que pourrait induire le DIU ;**	☒
E) **Chez une femme en septième semaine en post-partum.**	☒

11) Les méthodes contraceptives très efficaces (indice de Pearl < 1%AF) regroupent :

A) **La vasectomie ;**	☒
B) **La stérilisation tubaire ;**	☒
C) **Les injectables ;**	☒
D) **Les implants ;**	☒
E) **La pilule œstro-progestative.**	☒

12) La grippe A-H1N1 :

A) **C'est une maladie pandémique ;**	☒
B) **D'origine porcine, aviaire et humaine ;**	☒
C) D'origine porcine et humaine ;	☐
D) D'origine porcine, et aviaire.	☐

13) Les oreillons, c'est maladie Virale qui atteint :

A) Derrière les oreilles ;	☐
B) **Les glandes salivaires ;**	☒
C) Les oreilles ;	☐
D) Devant les oreilles.	☐

14) Les complications de la pneumonie sont :

A) **Choc septique ;**	☒
B) **Pneumothorax ;**	☒
C) Hémothorax ;	☐
D) **Pyothorax.**	☒

15) La contamination de la méningite se fait par :

A) Voie aérienne ;	☒
B) Voie digestive ;	☐
C) Voie sanguine ;	☐
D) Les gouttelettes de FLUGGE.	☒

16) La prise en charge du patient au niveau des urgences est :

A) Assurée selon un circuit standard quelque soit le degré de l'urgence ;	☐
B) Conditionnée par le triage systématique des patients ;	☐
C) Basée sur le principe du 1er venu est le 1er servi ;	☐
D) Tributaire de l'état de santé du patient.	☒

17) La reprise de l'alimentation de l'opéré est systématique le 2ème jour quelque soit la pathologie :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

18) La rougeole est une maladie immunisante :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

19) Le signe évocateur d'une méningite cérébrospinale est surtout la raideur de la nuque :

A) Vrai ;	☒
B) Faux.	☐

20) La pose d'un appareil plâtré est indiquée en cas de fracture ouverte de la jambe :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☒

2009

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 21 نونبر 2009)

www.ispits.net

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) **Vous recevez un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, vous devez faire en urgence :**

A) Couvrir l'enfant d'un linge chaud ;	☐
B) Administrer un antibiotique à l'enfant ;	☐
C) Donner un bain tiède à l'enfant ;	☐
D) Administrer à l'enfant du Valium.	☐

2) **Le score de Glasgow, évaluant la profondeur d'un coma, apprécie l'état de paramètres suivants :**

A) La réponse verbale ;	☐
B) L'ouverture des yeux ;	☐
C) L'activité motrice ;	☐
D) La fréquence respiratoire ;	☐
E) La coloration des téguments.	☐

3) **Devant les signes suivants : un malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse, observés chez un patient sous transfusion sanguine. De quel accident transfusionnel s'agit-il :**

A) Un occident de surcharge ;	☐
B) Un accident de contamination ;	☐
C) Un accident d'incompatibilité sanguine ;	☐
D) Un accident de choc opératoire ;	☐
E) Un accident d'hémolyse.	☐

4) L'indication de pose d'une sonde gastrique est en cas de :

A) Occlusion intestinale aigüe ;	☐
B) Ulcère gastrique ;	☐
C) Intoxication médicamenteuse ;	☐
D) Fibroscopie gastrique.	☐

5) Le syndrome de Volkmann est dû à :

A) Une lésion nerveuse ;	☐
B) Une lésion veineuse ;	☐
C) Une lésion artérielle ;	☐
D) Une lésion tendineuse.	☐

6) Les activités que vous devriez entreprendre dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur sont :

A) Faire le découpage sanitaire ;	☐
B) Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique ;	☐
C) Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité ;	☐
D) Tenir à jour le dossier du secteur.	☐

7) Le développement du kyste hydatique chez l'homme se fait par :

A) La consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) La respiration ;	☐
C) L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans les déchets du chien ;	☐
D) La consommation des viscères du mouton contaminé par le parasite.	☐

8) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) Après la toilette des organes génitaux externes ;	☐
C) En recueillant les urines du premier jet ;	☐
D) En recueillant les urines du milieu du jet ;	☐
E) Après avoir éliminé le premier jet contaminant.	☐

9) La crise convulsive généralisée chez le jeune enfant peut être observée en cos de :

A) Hypothermie ;	☐
B) Hypokaliémie ;	☐
C) Hyperthermie ;	☐
D) Hypoglycémie.	☐

10) Vous recevez un patient mordu par un chien errant, quelle(s) action(s) vous entreprenez :

A) Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique ;	☐
B) Suturer la plaie ;	☐
C) Faire un pansement ;	☐
D) Administrer le sérum antitétanique ;	☐
E) Adresser le patient vers un centre spécialisé pour recevoir un vaccin antirabique.	☐

11) Vous prenez en charge un patient présentant une phlébite du membre inférieur, quelle(s) action(s) entreprenez-vous ? :

A) Mobiliser le membre du patient ;	☐
B) Mettre le malade en position déclive ;	☐
C) Immobiliser le membre atteint ;	☐
D) Conseiller au malade de faire de l'exercice physique.	☐

12) Lesquels des signes suivants, doivent faire redouter un choc septique :

A) Une hypertension ;	☐
B) Une hypotension ;	☐
C) Une température > à 40 ;	☐
D) Des frissons.	☐

13) La prévention primaire sert à :

A) Réduire l'apparition ;	☐
B) Réduire 10 durée d'une maladie ;	☐
C) Réduire 10 prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) Diminuer l'incidence d'une maladie.	☐

14) Les maladies à transport hydrique sont :

A) Les hépatites virales A ;	☐
B) La fièvre typhoïde ;	☐
C) Le paludisme ;	☐
D) Le choléra.	☐

15) Dans la préparation d'un patient pour une intubation trachéale, le malade doit être installé en :

A) Position demi assise, tête en hyper extension ;	☐
B) Position déclive tête en hyper extension ;	☐
C) Décubitus dorsal, tête en hyper extension ;	☐
D) Position latérale gauche, tête en hyper extension.	☐

16) Votre conduite à tenir devant un accident transfusionnel est :

A) Réchauffer le malade ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☐
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Placer le malade en position assise.	☐

17) Pour prévenir les complications du plâtre de l'avant-bras vous devez :

A) Administrer un antalgique ;	☐
B) Surveiller les extrémités ;	☐
C) Vérifier que le plâtre n'est pas serré ;	☐
D) Surélever le membre par une écharpe.	☐

18) Le régime alimentaire que doit suivre un enfant éteint de syndrome néphrotique est :

A) Sans sels ;	☐
B) Sans sucre ;	☐
C) Hyper protidique ;	☐
D) Hypo protidique.	☐

19) Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de :

A) Douleurs abdominales, vomissement et fièvre ;	☐
B) Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre ;	☐
C) Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz ;	☐
D) Défense abdominale, vomissement et fièvre.	☐

20) Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie :

A) Tremblement ;	☐
B) Sueur ;	☐
C) Troubles de comportement ;	☐
D) Haleine acétonique.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 21 نونبر 2009)

Correction proposée :

1) **Vous recevez un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, vous devez faire en urgence :**

A) Couvrir l'enfant d'un linge chaud ;	☐
B) Administrer un antibiotique à l'enfant ;	☐
C) Donner un bain tiède à l'enfant ;	☒
D) Administrer à l'enfant du Valium.	☐

2) **Le score de Glasgow, évaluant la profondeur d'un coma, apprécie l'état de paramètres suivants :**

A) La réponse verbale ;	☒
B) L'ouverture des yeux ;	☒
C) L'activité motrice ;	☐
D) La fréquence respiratoire ;	☐
E) La coloration des téguments.	☐

3) **Devant les signes suivants : un malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse, observés chez un patient sous transfusion sanguine. De quel accident transfusionnel s'agit-il :**

A) Un occident de surcharge ;	☐
B) Un accident de contamination ;	☒
C) Un accident d'incompatibilité sanguine ;	☐
D) Un accident de choc opératoire ;	☐
E) Un accident d'hémolyse.	☐

4) L'indication de pose d'une sonde gastrique est en cas de :

A) Occlusion intestinale aigüe ;	☒
B) Ulcère gastrique ;	☐
C) Intoxication médicamenteuse ;	☒
D) Fibroscopie gastrique.	☐

5) Le syndrome de Volkmann est dû à :

A) Une lésion nerveuse ;	☒
B) Une lésion veineuse ;	☐
C) Une lésion artérielle ;	☒
D) Une lésion tendineuse.	☐

6) Les activités que vous devriez entreprendre dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur sont :

A) Faire le découpage sanitaire ;	☐
B) Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique ;	☒
C) Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité ;	☒
D) Tenir à jour le dossier du secteur.	☒

7) Le développement du kyste hydatique chez l'homme se fait par :

A) La consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) La respiration ;	☐
C) L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans les déchets du chien ;	☒
D) La consommation des viscères du mouton contaminé par le parasite.	☐

8) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) Après la toilette des organes génitaux externes ;	☒
C) En recueillant les urines du premier jet ;	☐
D) En recueillant les urines du milieu du jet ;	☒
E) Après avoir éliminé le premier jet contaminant.	☒

9) La crise convulsive généralisée chez le jeune enfant peut être observée en cos de :

A) Hypothermie ;	☐
B) Hypokaliémie ;	☒
C) Hyperthermie ;	☒
D) Hypoglycémie.	☒

10) Vous recevez un patient mordu par un chien errant, quelle(s) action(s) vous entreprenez :

A) Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique ;	☒
B) Suturer la plaie ;	☐
C) Faire un pansement ;	☐
D) Administrer le sérum antitétanique ;	☒
E) Adresser le patient vers un centre spécialisé pour recevoir un vaccin antirabique.	☒

11) Vous prenez en charge un patient présentant une phlébite du membre inférieur, quelle(s) action(s) entreprenez-vous ? :

A) Mobiliser le membre du patient ;	☐
B) Mettre le malade en position déclive ;	☒
C) Immobiliser le membre atteint ;	☒
D) Conseiller au malade de faire de l'exercice physique.	☐

12) Lesquels des signes suivants, doivent faire redouter un choc septique :

A) Une hypertension ;	☐
B) Une hypotension ;	☒
C) Une température > à 40 ;	☒
D) Des frissons.	☒

13) La prévention primaire sert à :

A) Réduire l'apparition ;	☒
B) Réduire 10 durée d'une maladie ;	☐
C) Réduire 10 prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) Diminuer l'incidence d'une maladie.	☒

14) Les maladies à transport hydrique sont :

A) Les hépatites virales A ;	☒
B) La fièvre typhoïde ;	☒
C) Le paludisme ;	☐
D) Le choléra.	☒

15) Dans la préparation d'un patient pour une intubation trachéale, le malade doit être installé en :

A) Position demi assise, tête en hyper extension ;	☐
B) Position déclive tête en hyper extension ;	☐
C) Décubitus dorsal, tête en hyper extension ;	☒
D) Position latérale gauche, tête en hyper extension.	☐

16) Votre conduite à tenir devant un accident transfusionnel est :

A) Réchauffer le malade ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☒
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Placer le malade en position assise.	☐

17) Pour prévenir les complications du plâtre de l'avant-bras vous devez :

A) Administrer un antalgique ;	☐
B) Surveiller les extrémités ;	☒
C) Vérifier que le plâtre n'est pas serré ;	☒
D) Surélever le membre par une écharpe.	☒

18) Le régime alimentaire que doit suivre un enfant éteint de syndrome néphrotique est :

A) Sans sels ;	☒
B) Sans sucre ;	☐
C) Hyper protidique ;	☐
D) Hypo protidique.	☐

19) Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de :

A) Douleurs abdominales, vomissement et fièvre ;	☐
B) Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre ;	☐
C) Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz ;	☒
D) Défense abdominale, vomissement et fièvre.	☐

20) Quels sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie :

A) Tremblement ;	☒
B) Sueur ;	☒
C) Troubles de comportement ;	☒
D) Haleine acétonique.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 15 فبراير 2009)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) **Devant une morsure par un chien errant, l'infirmier doit :**

A) Nettoyer la plaie avec un sérum physiologique ;	☐
B) Suturer la plaie ;	☐
C) Faire un pansement ;	☐
D) Administrer le sérum antitétanique ;	☐
E) Adresser le patient vers un centre spécialisé pour recevoir vaccin antirabique.	☐

2) **Parmi les pathologies suivantes, les quelles peuvent entrainer une crise convulsive généralisée chez le jeune enfant :**

A) Hypothermie ;	☐
B) Hypokaliémie ;	☐
C) Hyperthermie ;	☐
D) Hypoglycémie.	☐

3) **Devant un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, l'infirmier doit faire en urgence :**

A) Couvrir l'enfant d'un linge chaud ;	☐
B) Administrer un antibiotique à l'enfant ;	☐
C) Donner un bain tiède à l'enfant ;	☐
D) Administrer à l'enfant du Valium.	☐

4) **Dans la préparation d'un malade pour une intubation trachéale, le malade doit être installé en :**

A) Décubitus dorsal, la tête en hyper extension ;	☐
B) Position déclive tête en hyper extension ;	☐
C) Position demi assise, tête en hyper extension ;	☐
D) Position latérale gauche, tête en hyper extension.	☐

5) **La pose d'une sonde gastrique est indispensable en cas de :**

A) Occlusion intestinale aigüe ;	☐
B) Ulcère gastrique ;	☐
C) Intoxication médicamenteuse ;	☐
D) Fibroscopie gastrique.	☐

6) **Parmi les gestes à faire pour éviter les complications du plâtre de l'avant-bras :**

A) Administrer un antalgique ;	☐
B) Surveiller les extrémités ;	☐
C) Vérifier que le plâtre n'est pas serré ;	☐
D) Surélever le membre par une écharpe.	☐

7) **Dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur, l'infirmier doit :**

A) Faire le découpage sanitaire ;	☐
B) Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique ;	☐
C) Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité ;	☐
D) Tenir à jour le dossier du secteur.	☐

8) **Quelles sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie :**

A) Tremblement ;	☐
B) Sueur ;	☐
C) Troubles de comportement ;	☐
D) Haleine acétonique.	☐

9) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) Après la toilette des organes génitaux externes ;	☐
C) En recueillant Les urines du premier jet ;	☐
D) En recueillant les urines du milieu du jet ;	☐
E) Après avoir éliminé le premier jet contaminant.	☐

10) Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit :

A) Mobiliser le membre du patient ;	☐
B) Mettre le patient en position déclive ;	☐
C) Immobiliser le membre atteint ;	☐
D) Conseiller au malade de faire de l'exercice physique.	☐

11) Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de :

A) Douleurs abdominales, vomissement et fièvre ;	☐
B) Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre ;	☐
C) Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz ;	☐
D) Défense abdominale, vomissement et fièvre.	☐

12) La prévention primaire sert à :

A) Réduire l'apparition de nouveaux cas d'une maladie ;	☐
B) Réduire la durée d'une maladie ;	☐
C) Réduire la prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) Diminuer l'incidence d'une maladie.	☐

13) L'homme développe le kyste hydatique par :

A) La consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) La respiration ;	☐
C) L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans les déchets du chien ;	☐
D) La consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite.	☐

14) Le syndrome de Volkman est dû à :

A) Une lésion nerveuse ;	☐
B) Une lésion veineuse ;	☐
C) Une lésion artérielle ;	☐
D) Une lésion tendineuse.	☐

15) Devant un accident transfusionnel, l'infirmier doit :

A) Placer le malade en position assise ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☐
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Réchauffer le malade.	☐

16) Les maladies à transport hydrique sont :

A) Le choléra ;	☐
B) La fièvre typhoïde ;	☐
C) Le paludisme ;	☐
D) Les hépatites virales A.	☐

17) Le score de Glasgow, évaluant la profondeur d'un coma, apprécie l'état da paramètres suivants :

A) La réponse verbale ;	☐
B) L'ouverture des yeux ;	☐
C) L'activité motrice ;	☐
D) La fréquence respiratoire ;	☐
E) La coloration des téguments.	☐

18) Le régime alimentaire que doit suivre un enfant atteint de syndrome néphrotique est :

A) Sans sels ;	☐
B) Sans sucre ;	☐
C) Hyper-protidique ;	☐
D) Hypo-protidique.	☐

19) Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : un malaise, des frissons, violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse. De quel accident transfusionnel s'agit-il :

A) Un accident de surcharge ;	☐
B) Un accident de contamination ;	☐
C) Un accident d'incompatibilité sanguine ;	☐
D) Un accident d'hémolyse.	☐

20) Parmi les signes suivants, les quelles doivent faire redouter un choc :

A) Une hypertension ;	☐
B) Une hypotension ;	☐
C) Une température ≥ 40 ;	☐
D) Frissons.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 15 فبراير 2009)

Correction proposée :

1) **Devant une morsure par un chien errant, l'infirmier doit :**

A) **Nettoyer la plaie avec un sérum physiologique ;**	☒
B) Suturer la plaie ;	☐
C) Faire un pansement ;	☐
D) **Administrer le sérum antitétanique ;**	☒
E) **Adresser le patient vers un centre spécialisé pour recevoir vaccin antirabique.**	☒

2) **Parmi les pathologies suivantes, les quelles peuvent entrainer une crise convulsive généralisée chez le jeune enfant :**

A) Hypothermie ;	☐
B) **Hypokaliémie ;**	☒
C) **Hyperthermie ;**	☒
D) **Hypoglycémie.**	☒

3) **Devant un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, l'infirmier doit faire en urgence :**

A) Couvrir l'enfant d'un linge chaud ;	☐
B) Administrer un antibiotique à l'enfant ;	☐
C) **Donner un bain tiède à l'enfant ;**	☒
D) Administrer à l'enfant du Valium.	☐

4) Dans la préparation d'un malade pour une intubation trachéale, le malade doit être installé en :

A) Décubitus dorsal, la tête en hyper extension ;	☒
B) Position déclive tête en hyper extension ;	☐
C) Position demi assise, tête en hyper extension ;	☐
D) Position latérale gauche, tête en hyper extension.	☐

5) La pose d'une sonde gastrique est indispensable en cas de :

A) Occlusion intestinale aigüe ;	☒
B) Ulcère gastrique ;	☐
C) Intoxication médicamenteuse ;	☒
D) Fibroscopie gastrique.	☐

6) Parmi les gestes à faire pour éviter les complications du plâtre de l'avant-bras :

A) Administrer un antalgique ;	☐
B) Surveiller les extrémités ;	☒
C) Vérifier que le plâtre n'est pas serré ;	☒
D) Surélever le membre par une écharpe.	☒

7) Dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur, l'infirmier doit :

A) Faire le découpage sanitaire ;	☐
B) Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique ;	☒
C) Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité ;	☒
D) Tenir à jour le dossier du secteur.	☒

8) Quelles sont les signes d'alarme d'une hypoglycémie :

A) Tremblement ;	☒
B) Sueur ;	☒
C) Troubles de comportement ;	☒
D) Haleine acétonique.	☐

9) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) Après la toilette des organes génitaux externes ;	☒
C) En recueillant Les urines du premier jet ;	☐
D) En recueillant les urines du milieu du jet ;	☒
E) Après avoir éliminé le premier jet contaminant.	☒

10) Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit :

A) Mobiliser le membre du patient ;	☐
B) Mettre le patient en position déclive ;	☒
C) Immobiliser le membre atteint ;	☒
D) Conseiller au malade de faire de l'exercice physique.	☐

11) Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de :

A) Douleurs abdominales, vomissement et fièvre ;	☐
B) Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre ;	☐
C) Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz ;	☒
D) Défense abdominale, vomissement et fièvre.	☐

12) La prévention primaire sert à :

A) Réduire l'apparition de nouveaux cas d'une maladie ;	☒
B) Réduire la durée d'une maladie ;	☐
C) Réduire la prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) Diminuer l'incidence d'une maladie.	☒

13) L'homme développe le kyste hydatique par :

A) La consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) La respiration ;	☐
C) L'ingestion de produits contaminés par 1 œuf de parasite existant dans les déchets du chien ;	☒
D) La consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite.	☐

14) Le syndrome de Volkman est dû à :

A) Une lésion nerveuse ;	☒
B) Une lésion veineuse ;	☐
C) Une lésion artérielle ;	☒
D) Une lésion tendineuse.	☐

15) Devant un accident transfusionnel, l'infirmier doit :

A) Placer le malade en position assise ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☒
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Réchauffer le malade.	☐

16) Les maladies à transport hydrique sont :

A) Le choléra ;	☒
B) La fièvre typhoïde ;	☒
C) Le paludisme ;	☐
D) Les hépatites virales A.	☒

17) Le score de Glasgow, évaluant la profondeur d'un coma, apprécie l'état da paramètres suivants :

A) La réponse verbale ;	☒
B) L'ouverture des yeux ;	☒
C) L'activité motrice ;	☐
D) La fréquence respiratoire ;	☐
E) La coloration des téguments.	☐

18) Le régime alimentaire que doit suivre un enfant atteint de syndrome néphrotique est :

A) Sans sels ;	☒
B) Sans sucre ;	☐
C) Hyper-protidique ;	☐
D) Hypo-protidique.	☐

19) Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : un malaise, des frissons, violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse. De quel accident transfusionnel s'agit-il :

A) Un accident de surcharge ;	☐
B) **Un accident de contamination ;**	☒
C) Un accident d'incompatibilité sanguine ;	☐
D) Un accident d'hémolyse.	☐

20) Parmi les signes suivants, les quelles doivent faire redouter un choc :

A) Une hypertension ;	☐
B) **Une hypotension ;**	☒
C) **Une température ≥ 40 ;**	☒
D) **Frissons.**	☒

2008

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 21 يونيو 2008)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La pose d'une sonde gastrique est indispensable en cas de :

A) Occlusion intestinale aigüe ;	☐
B) Ulcère gastrique ;	☐
C) Intoxication médicamenteuse ;	☐
D) Fibroscope gastrique.	☐

2) Après la pose d'un appareil plâtré, l'infirmier doit surveiller chez le patient :

A) La conscience du malade ;	☐
B) La douleur sous plâtre ;	☐
C) La tension artérielle	☐
D) La sensibilité du membre.	☐

3) En cas de tarissement de l'écoulement d'un drain de Kher, l'infirmier peut :

A) Injecter du sérum physiologique pour le déboucher ;	☐
B) Le faire bouger ;	☐
C) Aspirer la bile par une seringue ;	☐
D) Retirer le drain.	☐

4) En cas de déshydratation extracellulaire avec signes d'insuffisance circulatoire, le geste que doit faire l'infirmier est :

A) Réhydratation à l'aide de solution glucosé ;	☐
B) Réhydratation à l'aide de solution salée ;	☐
C) Perfusion de macromolécules ;	☐
D) Administration du soluté bicarbonate 14%.	☐

5) **Devant un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, l'infirmier doit faire en urgence :**

A) Couvrir l'enfant d'un linge chaud ;	☐
B) Administrer un antibiotique à l'enfant ;	☐
C) Donner un bain tiède à l'enfant ;	☐
D) Administrer à l'enfant du Valium.	☐

6) **Devant un accident transfusionnel, l'infirmier doit :**

A) Placer le malade en position assise ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☐
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Réchauffer le malade.	☐

7) **Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit :**

A) Mobiliser le membre du patient ;	☐
B) Mettre le patient en position déclive ;	☐
C) Immobiliser le membre atteint ;	☐
D) Conseiller au malade de faire de l'exercice physique.	☐

8) **Le régime alimentaire que doit suivre un enfant atteint de syndrome néphrétique est :**

A) Sans sels ;	☐
B) Sans sucre ;	☐
C) Hyper protidique ;	☐
D) Hypo protidique.	☐

9) **Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent entraîner une crise convulsive généralisée chez le jeune enfant :**

A) Hypothermie ;	☐
B) Hypokaliémie ;	☐
C) Hyperthermie ;	☐
D) Hypoglycémie.	☐

10) Parmi les examens suivants, lequel ou lesquels, permettent de faire le diagnostic de l'amibiase colique :

A) L'examen parasitologique des selles ;	☐
B) L'interrogatoire ;	☐
C) L'hémoculture ;	☐
D) La sérologie d'amibiase.	☐

11) Parmi les signes suivants, lesquels doivent faire redouter un choc septique :

A) Une hypertension ;	☐
B) Une hypotension ;	☐
C) Une température > 40° ;	☐
D) Des frissons.	☐

12) Parmi les gestes à faire pour éviter les complications du plâtre de l'avant-bras, il faut :

A) Administrer un antalgique ;	☐
B) Surveiller les extrémités ;	☐
C) Vérifier que le plâtre n'est pas serré ;	☐
D) Surélever le membre par une écharpe.	☐

13) Lors d'une ventilation artificielle, l'infirmier doit changer le filtre anti bactérien :

A) Toutes les 4 heures ;	☐
B) Toutes les 6 heures ;	☐
C) Chaque jour ;	☐
D) Tous les 2 jours.	☐

14) En tant qu'infirmier polyvalent, vous voulez confier un soin à un infirmier auxiliaire. L'élément le plus important à vérifier avant la prise de cette décision est :

A) L'infirmier auxiliaire est très expérimenté ;	☐
B) L'infirmier auxiliaire maîtrise bien le soin ;	☐
C) Le soin fait partie des compétences de l'infirmier auxiliaire ;	☐
D) L'infirmier auxiliaire est estimé par l'équipe soignante.	☐

15) Parmi les complications mécaniques de l'alimentation entérale :

A) Vomissements ;	☐
B) Constipation ;	☐
C) Régurgitation ;	☐
D) Dyspnée.	☐

16) Dans la préparation d'un patient pour une intubation trachéale, le malade doit être installé en :

A) Décubitus dorsal, tête en hypertension ;	☐
B) Position déclive, tête en hypertension ;	☐
C) Position demie assise, tête en hypertension ;	☐
D) Position latérale gauche, tête en hypertension.	☐

17) La ou les phrases exprimé (es) en terme d'objectif (s) de soins est (sont) :

A) Le patient sera capable de réaliser seul ses injections d'insuline d'ici 8 jours ;	☐
B) Aider le patient à se mettre au lit tous les soirs ;	☐
C) Proposer au patient des frictions à l'eau de Cologne ;	☐
D) Le patient ira à la selle d'ici 4 jours.	☐

18) Parmi les activités qui doivent être entreprises par l'infirmier dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur :

A) Faire le découpage sanitaire ;	☐
B) Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique ;	☐
C) Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité ;	☐
D) Tenir à jour le dossier secteur.	☐

19) Parmi les critères qui doivent être pris en considération par l'infirmier lors de la réalisation d'un prélèvement de sang sur lame, dans le cadre de dépistage du paludisme dans une zone indemne de paludisme :

A) Antécédents fébriles ;	☐
B) Fièvre inexpliquée ;	☐
C) Céphalées ;	☐
D) Fièvre associée à une toux, ou à une angine.	☐

20) Le dépistage de masse organisé dans le cadre du programme national de la lutte contre la schistosomiase inclut :

A) Les prélèvements réalisés chez les patients aux moments des consultations médicales ;	☐
B) Les prélèvements faits dans le cadre d'une enquête autour d'un cas de bilharziose ;	☐
C) Les prélèvements faits lors d'un circuit de surveillance ;	☐
D) Les prélèvements réalisés dans les foyers importants de transmission de la maladie.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

المدة : ساعتان

(دورة 21 يونيو 2008)

Correction proposée :

1) La pose d'une sonde gastrique est indispensable en cas de :

A) **Occlusion intestinale aigüe ;**	☒
B) Ulcère gastrique ;	☐
C) **Intoxication médicamenteuse ;**	☒
D) Fibroscope gastrique.	☐

2) Après la pose d'un appareil plâtré, l'infirmier doit surveiller chez le patient :

A) La conscience du malade ;	☐
B) **La douleur sous plâtre ;**	☒
C) **La tension artérielle**	☒
D) **La sensibilité du membre.**	☒

3) En cas de tarissement de l'écoulement d'un drain de Kher, l'infirmier peut :

A) Injecter du sérum physiologique pour le déboucher ;	☐
B) **Le faire bouger ;**	☒
C) Aspirer la bile par une seringue ;	☐
D) Retirer le drain.	☐

4) En cas de déshydratation extracellulaire avec signes d'insuffisance circulatoire, le geste que doit faire l'infirmier est :

A) Réhydratation à l'aide de solution glucosé ;	☐
B) Réhydratation à l'aide de solution salée ;	☐
C) **Perfusion de macromolécules ;**	☒
D) Administration du soluté bicarbonate 14%.	☐

5) **Devant un enfant, âgé de deux ans, présentant une fièvre à 40°, l'infirmier doit faire en urgence :**

A) Couvrir l'enfant d'un linge chaud ;	☐
B) Administrer un antibiotique à l'enfant ;	☐
C) Donner un bain tiède à l'enfant ;	☒
D) Administrer à l'enfant du Valium.	☐

6) **Devant un accident transfusionnel, l'infirmier doit :**

A) Placer le malade en position assise ;	☐
B) Arrêter la transfusion ;	☒
C) Administrer au malade des anticoagulants ;	☐
D) Réchauffer le malade.	☐

7) **Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit :**

A) Mobiliser le membre du patient ;	☐
B) Mettre le patient en position déclive ;	☒
C) Immobiliser le membre atteint ;	☒
D) Conseiller au malade de faire de l'exercice physique.	☐

8) **Le régime alimentaire que doit suivre un enfant atteint de syndrome néphrétique est :**

A) Sans sels ;	☒
B) Sans sucre ;	☐
C) Hyper protidique ;	☐
D) Hypo protidique.	☐

9) **Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent entraîner une crise convulsive généralisée chez le jeune enfant :**

A) Hypothermie ;	☐
B) Hypokaliémie ;	☒
C) Hyperthermie ;	☒
D) Hypoglycémie.	☒

10) Parmi les examens suivants, lequel ou lesquels, permettent de faire le diagnostic de l'amibiase colique :

A) L'examen parasitologique des selles ;	☒
B) L'interrogatoire ;	☐
C) L'hémoculture ;	☐
D) La sérologie d'amibiase.	☒

11) Parmi les signes suivants, lesquels doivent faire redouter un choc septique :

A) Une hypertension ;	☐
B) Une hypotension ;	☒
C) Une température > 40° ;	☒
D) Des frissons.	☒

12) Parmi les gestes à faire pour éviter les complications du plâtre de l'avant-bras, il faut :

A) Administrer un antalgique ;	☐
B) Surveiller les extrémités ;	☒
C) Vérifier que le plâtre n'est pas serré ;	☒
D) Surélever le membre par une écharpe.	☒

13) Lors d'une ventilation artificielle, l'infirmier doit changer le filtre anti bactérien :

A) Toutes les 4 heures ;	☐
B) Toutes les 6 heures ;	☐
C) Chaque jour ;	☒
D) Tous les 2 jours.	☐

14) En tant qu'infirmier polyvalent, vous voulez confier un soin à un infirmier auxiliaire. L'élément le plus important à vérifier avant la prise de cette décision est :

A) L'infirmier auxiliaire est très expérimenté ;	☐
B) L'infirmier auxiliaire maîtrise bien le soin ;	☐
C) Le soin fait partie des compétences de l'infirmier auxiliaire ;	☒
D) L'infirmier auxiliaire est estimé par l'équipe soignante.	☐

15) Parmi les complications mécaniques de l'alimentation entérale :

A) Vomissements ;	☒
B) Constipation ;	☐
C) Régurgitation ;	☒
D) Dyspnée.	☒

16) Dans la préparation d'un patient pour une intubation trachéale, le malade doit être installé en :

A) Décubitus dorsal, tête en hypertension ;	☒
B) Position déclive, tête en hypertension ;	☐
C) Position demie assise, tête en hypertension ;	☐
D) Position latérale gauche, tête en hypertension.	☐

17) La ou les phrases exprimé (es) en terme d'objectif (s) de soins est (sont) :

A) Le patient sera capable de réaliser seul ses injections d'insuline d'ici 8 jours ;	☒
B) Aider le patient à se mettre au lit tous les soirs ;	☐
C) Proposer au patient des frictions à l'eau de Cologne ;	☐
D) Le patient ira à la selle d'ici 4 jours.	☐

18) Parmi les activités qui doivent être entreprises par l'infirmier dans le cadre d'un circuit de surveillance d'un secteur :

A) Faire le découpage sanitaire ;	☐
B) Mettre à jour les données de la reconnaissance géographique ;	☒
C) Vérifier l'état de l'accessibilité des routes de la localité ;	☒
D) Tenir à jour le dossier secteur.	☒

19) Parmi les critères qui doivent être pris en considération par l'infirmier lors de la réalisation d'un prélèvement de sang sur lame, dans le cadre de dépistage du paludisme dans une zone indemne de paludisme :

A) Antécédents fébriles ;	☐
B) Fièvre inexpliquée ;	☒
C) Céphalées ;	☒
D) Fièvre associée à une toux, ou à une angine.	☐

20) Le dépistage de masse organisé dans le cadre du programme national de la lutte contre la schistosomiase inclut :

A) Les prélèvements réalisés chez les patients aux moments des consultations médicales ;	☐
B) **Les prélèvements faits dans le cadre d'une enquête autour d'un cas de bilharziose ;**	☒
C) Les prélèvements faits lors d'un circuit de surveillance ;	☐
D) **Les prélèvements réalisés dans les foyers importants de transmission de la maladie.**	☒

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء -

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

(دورة 18 ماي 2008)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) **Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade sous traction sont :**

A) La réfection du lit ;	☐
B) Les soins préventifs des escarres ;	☐
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) Le changement de la literie ;	☐
E) La toilette intime.	☐

2) **Les précautions à prendre avent de démarrer une transfusion sanguine sont :**

A) Vérifier l'identité et le groupage du patient ;	☐
B) Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang ;	☐
C) Vérifier la date de péremption du sang ;	☐
D) Faire un cross match ;	☐
E) Remplir la fiche transfusionnelle.	☐

3) **Les principaux conseils à donner à un adulte diabétique non insulino-dépendant sont :**

A) Pratiquer du sport régulièrement ;	☐
B) Éviter les sucreries ;	☐
C) Suivre régulièrement le traitement ;	☐
D) Avoir une bonne hygiène corporelle ;	☐
E) Adopter une alimentation diversifiée riche en glucides.	☐

4) Les complications d'une hémorragie abondante sont :

A) L'hypotension artérielle ;	☐
B) L'anémie ;	☐
C) Le déséquilibre hydro-électrolytique ;	☐
D) Le choc hémorragique ;	☐
E) Le choc anaphylactique.	☐

5) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;	☐
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez ;	☐
E) Un rejet de sang noirâtre par voie anale.	☐

6) La préparation d'un biberon de lait de 120 ml nécessite :

A) Le lavage des mains ;	☐
B) Un biberon stérilisé ;	☐
C) Quatre cuillères mesure rase de lait en poudre ;	☐
D) Le port de gants stériles ;	☐
E) 120 ml d'eau.	☐

7) Les actions à entreprendre pour assurer aux nourrissons un bon état nutritionnel sont :

A) La promotion de l'allaitement maternel ;	☐
B) Conseiller la diversification alimentaire à partir de l'âge de six mois ;	☐
C) Conseiller le suivi régulier de la croissance staturo-pondérale ;	☐
D) L'éducation nutritionnelle des parents ;	☐
E) Conseiller le sevrage brutal des nourrissons au sein.	☐

8) Les objets d'un plan de soins sont :

A) Diagnostiquer le problème ;	☐
B) Identifier les besoins ;	☐
C) Planifier les soins ;	☐
D) Evaluer l'activité infirmière ;	☐
E) Assurer les transmissions infirmières.	☐

9) Les moyens de transmission de l'infection à VIH sont :

A) Les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée ;	☐
B) La transfusion de produits sanguins infectés ;	☐
C) Les piqûres par des objets piquants et tranchants souillés ;	☐
D) L'utilisation d'ustensiles appartenant à une personne séropositive ;	☐
E) La transmission fœto-maternelle.	☐

10) Le dossier de soins infirmiers est un moyen pour :

A) Evaluer les soins infirmiers ;	☐
B) Planifier les soins infirmiers ;	☐
C) Contrôler la présence des infirmiers ;	☐
D) Assurer une continuité des soins ;	☐
E) Assurer les transmissions infirmières.	☐

11) Pour prévenir les accidents liés à l'exposition au sang, les infirmiers doivent respecter les règles suivantes :

A) Porter des gants ;	☐
B) Utiliser des containers pour les objets piquants et tranchants ;	☐
C) Eviter de re-capuchonner les aiguilles après leur utilisation ;	☐
D) Jeter les aiguilles utilisées dans les sacs poubelle ;	☐
E) Utiliser les vacutaners.	☐

12) Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

A) La méningite purulente ;	☐
B) Les infestions ORL ;	☐
C) L'abcès du cerveau ;	☐
D) Le traumatisme crânien ;	☐
E) L'encéphalite aigue.	☐

13) Les conseils d'hygiène bucco-dentaire que vous devez donner à un enfant scolarisé sont :

A) Se brosser les dents uniquement le soir avant de se coucher ;	☐
B) Eviter l'abus de sucreries ;	☐
C) Avoir une brosse à dents individuelle ;	☐
D) Changer de brosse à dents tous les 3 mois ;	☐
E) Consulter un dentiste périodiquement.	☐

14) Les maladies concernées par les programmes de lutte contre les maladies parasitaires sont :

A) Le paludisme ;	☐
B) La bilharziose ;	☐
C) La leishmaniose ;	☐
D) Le kyste hydatique ;	☐
E) L'amibiase.	☐

15) Les complications de l'alitement prolongé :

A) Les escarres ;	☐
B) Les raideurs des articulations ;	☐
C) La Phlébite ;	☐
D) Les infections pulmonaires ;	☐
E) La paraplégie.	☐

16) Les trois complications de la diarrhée aigues chez le nourrisson :

A) La perte de poids ;	☐
B) Les troubles hydro- électrolytiques ;	☐
C) La déshydratation ;	☐
D) Les œdèmes des membres inférieurs ;	☐
E) L'hydrocéphalie.	☐

17) Les organes hématopoïétiques sont :

A) Le foie ;	☐
B) La moelle épinière ;	☐
C) La rate ;	☐
D) La moelle osseuse ;	☐
E) Le rein.	☐

18) L'insuline est sécrétée par :

A) Le foie ;	☐
B) La rate ;	☐
C) Le pancréas ;	☐
D) La thyroïde ;	☐
E) L'estomac.	☐

19) Les précautions à prendre avant d'administrer un médicament à un patient sont :

A) Vérifier la prescription médicale ;	☐
B) Vérifier la date de péremption ;	☐
C) Vérifier la voie d'administration ;	☐
D) Vérifier la dose prescrite ;	☐
E) Vérifier la date de fabrication.	☐

20) Une infection nosocomiale peut se déclarer chez le malade hospitalisé :

A) Au moment de l'hospitalisation ;	☐
B) 24 heures après son hospitalisation ;	☐
C) 48 heures après son hospitalisation ;	☐
D) 48 heures après sa sortie de l'hôpital ;	☐
E) 48 heures avant son hospitalisation.	☐

21) Les conseils à donner à la mère d'un nourrisson fébrile sont :

A) Donner à boire au nourrisson en quantité abondante ;	☐
B) Dévêtir le nourrisson ;	☐
C) Lui administrer un bain d'eau froide ;	☐
D) Le réchauffer avec des couvertures en cas de frissons ;	☐
E) Apprendre à chiffrer la température à l'aide d'un thermomètre.	☐

22) Parmi les maladies infectieuses à déclaration obligatoire, vous retenez :

A) La gale ;	☐
B) La tuberculose ;	☐
C) La méningite bactérienne ;	☐
D) La paralysie flasque aigue ;	☐
E) L'infection à VIH.	☐

23) Le rôle de l'infirmier devant une fracture ouverte de la jambe qui saigne consiste à :

A) Désinfecter la plaie ;	☐
B) Faire un pansement compressif ;	☐
C) Immobiliser le membre ;	☐
D) Suturer la plaie ;	☐
E) Administrer le sérum antitétanique sur prescription médicale.	☐

24) Les signes annonciateurs de la bilharziose sont :

A) Un méléna ;	☐
B) Une hématémèse ;	☐
C) Une hématurie ;	☐
D) Un épistaxis ;	☐
E) Une hémoptysie.	☐

25) Les signes cliniques de la typhoïde sont :

A) Une fièvre prolongée ;	☐
B) Des céphalées, vertiges et asthénie ;	☐
C) Des épistaxis ;	☐
D) Une ascite ;	☐
E) Une dissociation du pouls avec la température.	☐

26) Les signes cliniques d'une phlébite de la jambe sont :

A) Une douleur du mollet ;	☐
B) Un œdème de jambe ;	☐
C) Une augmentation de la chaleur locale ;	☐
D) Une cyanose et une dilatation des veines superficielles ;	☐
E) Une hypertension artérielle.	☐

27) Les missions d'un hôpital universitaire sont :

A) Les soins ;	☐
B) La recherche ;	☐
C) La formation ;	☐
D) La restauration ;	☐
E) L'hôtellerie.	☐

28) Les causes de convulsions sans fièvre de l'enfant sont :

A) L'hypoglycémie.	☐
B) L'hypocalcémie.	☐
C) La tumeur cérébrale.	☐
D) Le traumatisme crânien.	☐
E) L'otite.	☐

29) Les éléments à apprécier en urgence par l'infirmier chez un patient qui a une contusion thoracique sont :

A) L'état hémodynamique ;	☐
B) L'état de la respiration ;	☐
C) La survenue d'une hémoptysie ;	☐
D) La présence d'un emphysème sous- cutané ;	☐
E) La survenue d'une hématurie.	☐

30) Le moyen à utiliser pour une stérilisation correcte des compresses en milieu hospitalier est :

A) Le formol ;	☐
B) L'autoclave ;	☐
C) Le poupinel ;	☐
D) Le fer à repasser ;	☐
E) Le four.	☐

31) Parmi ces valeurs biologiques, quelles sont celles qui sont normales chez l'adulte :

A) Un taux d'hémoglobine à 13g/dl ;	☐
B) Des globules blancs à 15.000 / mm3 ;	☐
C) Des plaquettes à 600.000 / mm3 ;	☐
D) Un taux d'urée à 0,45 g/l ;	☐
E) Une glycémie à 0,90 g/litre.	☐

32) Les gestes à faire avant de pratiquer un soin aseptique sont :

A) Le lavage des mains à l'eau et au savon ;	☐
B) Le port de gants propres ;	☐
C) La désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique ;	☐
D) La désinfection des mains à l'alcool ;	☐
E) Le port des gants stériles.	☐

33) La préparation d'un malade pour une intervention chirurgicale en traumatologie comporte :

A) La vérification du dossier du patient ;	☐
B) La préparation du champ opératoire ;	☐
C) La préparation psychologique du patient ;	☐
D) L'administration d'un laxatif au patient ;	☐
E) La prémédication du patient selon la prescription médicale.	☐

34) Le centre hospitalier Ibn Rochd est :

A) Un hôpital autonome ;	☐
B) Un hôpital universitaire ;	☐
C) Un établissement public ;	☐
D) Un hôpital en régie ;	☐
E) Un hôpital SEGMA.	☐

35) La vaccination contre la tuberculose par le BCG selon le calendrier vaccinal national se fait :

A) Deux mois après la naissance ;	☐
B) A l'âge de trois mois ;	☐
C) A la naissance ;	☐
D) A six mois ;	☐
E) A 12 mois.	☐

36) La vaccination contre le tétanos chez le nourrisson selon le calendrier vaccinal national se fait à l'âge suivant :

A) 6 semaines ;	☐
B) 14 semaines ;	☐
C) 8 semaines ;	☐
D) A la naissance ;	☐
E) 10 semaines.	☐

37) Devant un cas de brûlure de 3ième degré aux urgences, l'infirmier doit :

A) Nettoyer avec du sérum physiologique ;	☐
B) Prendre une voix veineuse ;	☐
C) Apprécier l'état hémodynamique du patient ;	☐
D) Appliquer les compresses bitadinés ;	☐
E) Administrer le sérum antitétanique.	☐

38) Les complications des angines à répétition mal traitées sont :

A) L'arthrite septique ;	☐
B) Le rhumatisme articulaire aigu ;	☐
C) La glomérulonéphrite aigue ;	☐
D) Les complications cardiaques ;	☐
E) La polyarthrite rhumatoïde.	☐

39) Les éléments à surveiller les 48 premières heures chez un malade opéré d'une occlusion intestinale sont :

A) Les constantes : température, tension artérielle ;	☐
B) La permutabilité des drains ;	☐
C) Les entrées et sorties liquidiens ;	☐
D) L'émission des gaz ;	☐
E) La survenue des escarres.	☐

40) La manifestation clinique la plus grave du rhumatisme articulaire aigu est :

A) L'atteinte articulaire ;	☐
B) L'atteinte rénale ;	☐
C) L'atteinte cardiaque ;	☐
D) L'atteinte pulmonaire ;	☐
E) L'atteinte cérébrale.	☐

41) Les facteurs favorisants la survenue de la tuberculose pulmonaire sont :

A) La promiscuité et l'habitat insalubre ;	☐
B) L'absence de vaccination par le BCG ;	☐
C) Le terrain allergique ;	☐
D) Le mauvais état nutritionnel ;	☐
E) Le bas niveau socio-économique.	☐

42) Parmi ces maladies, celles qui sont immunisantes sont :

A) La rougeole ;	☐
B) Le choléra ;	☐
C) La rubéole ;	☐
D) La scarlatine ;	☐
E) La typhoïde.	☐

43) Le matériel nécessaire pour réaliser un sondage vésical à demeure est :

A) Un désinfectant et lubrifiant ;	☐
B) Des gants propre ;	☐
C) Une sonde stérile ;	☐
D) Une poche à urine propre ;	☐
E) Un champs stérile.	☐

44) Les signes cliniques d'un œdème aigu du poumon sont :

A) La dyspnée ;	☐
B) La cyanose ;	☐
C) La toux avec expectorations mousseuses ;	☐
D) La fièvre ;	☐
E) L'hémoptysie.	☐

45) Devant une morsure par un chien errant, l'infirmier doit :

A) Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique ;	☐
B) Suturer la plaie ;	☐
C) Faire un pansement ;	☐
D) Administrer le sérum antitétanique ;	☐
E) Adresser le patient dans un centre spécialisé pour recevoir un vaccin antirabique.	☐

46) Les conseils hygiéniques à donner aux parents d'un enfant porteur d'une gale sont :

A) Changement de vêtement à chaque application de traitement ;	☐
B) Désinfection des vêtements et de la literie avec un antiparasitaire ;	☐
C) Ne pas échanger les vêtements entre frères et sœurs ;	☐
D) Prendre une douche avant chaque application de traitement ;	☐
E) Ne pas utiliser les mêmes ustensiles que le reste de la famille.	☐

47) Les actions infirmières à entreprendre pour prévenir les escarres chez un patient alité sont :

A) Les soins préventifs des escarres ;	☐
B) Les changements de position une fois par jour ;	☐
C) La mise en place d'un matelas alternating ;	☐
D) La surveillance quotidienne des Zones d'appui ;	☐
E) Les soins préventifs des escarres.	☐

48) Parmi les signes évocateurs d'incidents et accidents transfusionnels vous retenez :

A) Les frissons ;	☐
B) Les douleurs lombaires ;	☐
C) L'hyperthermie ;	☐
D) L'hématurie ;	☐
E) L'état de choc.	☐

49) Les étiologies des ictères chez l'adulte :

A) L'ictère par hémolyse ;	☐
B) Les hépatites virales ;	☐
C) L'anémie ;	☐
D) L'ictère par rétention ;	☐
E) L'ictère post transfusionnel.	☐

50) Les attributions du service des soins infirmiers sont :

A) La planification et l'utilisation du personnel infirmier ;	☐
B) La formation continue ;	☐
C) La supervision et l'évaluation des soins ;	☐
D) La supervision de l'hygiène hospitalière ;	☐
E) La gestion des produits pharmaceutiques.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء -

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

(دورة 18 ماي 2008)

Correction proposée :

1) **Les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade sous traction sont :**

A) **La réfection du lit ;**	☒
B) **Les soins préventifs des escarres ;**	☒
C) Le sondage urinaire ;	☐
D) **Le changement de la literie ;**	☒
E) **La toilette intime.**	☒

2) **Les précautions à prendre avent de démarrer une transfusion sanguine sont :**

A) **Vérifier l'identité et le groupage du patient ;**	☒
B) **Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang ;**	☒
C) **Vérifier la date de péremption du sang ;**	☒
D) **Faire un cross match ;**	☒
E) **Remplir la fiche transfusionnelle.**	☒

3) **Les principaux conseils à donner à un adulte diabétique non insulino-dépendant sont :**

A) **Pratiquer du sport régulièrement ;**	☒
B) **Éviter les sucreries ;**	☒
C) **Suivre régulièrement le traitement ;**	☒
D) **Avoir une bonne hygiène corporelle ;**	☒
E) Adopter une alimentation diversifiée riche en glucides.	☐

4) Les complications d'une hémorragie abondante sont :

A) L'hypotension artérielle ;	☒
B) L'anémie ;	☒
C) Le déséquilibre hydro-électrolytique ;	☐
D) Le choc hémorragique ;	☒
E) Le choc anaphylactique.	☐

5) L'hématémèse se définit comme :

A) Un rejet de sang rouge par voie anale ;	☐
B) Un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement ;	☒
C) Un rejet de sang provenant des bronches lors d'un effort de toux ;	☐
D) Un rejet de sang provenant du nez ;	☐
E) Un rejet de sang noirâtre par voie anale.	☐

6) La préparation d'un biberon de lait de 120 ml nécessite :

A) Le lavage des mains ;	☒
B) Un biberon stérilisé ;	☒
C) Quatre cuillères mesure rase de lait en poudre ;	☒
D) Le port de gants stériles ;	☐
E) 120 ml d'eau.	☒

7) Les actions à entreprendre pour assurer aux nourrissons un bon état nutritionnel sont :

A) La promotion de l'allaitement maternel ;	☒
B) Conseiller la diversification alimentaire à partir de l'âge de six mois ;	☒
C) Conseiller le suivi régulier de la croissance staturo-pondérale ;	☒
D) L'éducation nutritionnelle des parents ;	☒
E) Conseiller le sevrage brutal des nourrissons au sein.	☐

8) Les objets d'un plan de soins sont :

A) Diagnostiquer le problème ;	☒
B) Identifier les besoins ;	☒
C) Planifier les soins ;	☒
D) Evaluer l'activité infirmière ;	☒
E) Assurer les transmissions infirmières.	☐

9) Les moyens de transmission de l'infection à VIH sont :

A) Les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée ;	☒
B) La transfusion de produits sanguins infectés ;	☒
C) Les piqûres par des objets piquants et tranchants souillés ;	☒
D) L'utilisation d'ustensiles appartenant à une personne séropositive ;	☐
E) La transmission fœto-maternelle.	☒

10) Le dossier de soins infirmiers est un moyen pour :

A) Evaluer les soins infirmiers ;	☒
B) Planifier les soins infirmiers ;	☒
C) Contrôler la présence des infirmiers ;	☐
D) Assurer une continuité des soins ;	☒
E) Assurer les transmissions infirmières.	☒

11) Pour prévenir les accidents liés à l'exposition au sang, les infirmiers doivent respecter les règles suivantes :

A) Porter des gants ;	☒
B) Utiliser des containers pour les objets piquants et tranchants ;	☒
C) Eviter de re-capuchonner les aiguilles après leur utilisation ;	☒
D) Jeter les aiguilles utilisées dans les sacs poubelle ;	☐
E) Utiliser les vacutaners.	☒

12) Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont :

A) La méningite purulente ;	☒
B) Les infestions ORL ;	☒
C) L'abcès du cerveau ;	☒
D) Le traumatisme crânien ;	☒
E) L'encéphalite aigue.	☒

13) Les conseils d'hygiène bucco-dentaire que vous devez donner à un enfant scolarisé sont :

A) Se brosser les dents uniquement le soir avant de se coucher ;	☐
B) Eviter l'abus de sucreries ;	☒
C) Avoir une brosse à dents individuelle ;	☒
D) Changer de brosse à dents tous les 3 mois ;	☒
E) Consulter un dentiste périodiquement.	☒

14) Les maladies concernées par les programmes de lutte contre les maladies parasitaires sont :

A) Le paludisme ;	☒
B) La bilharziose ;	☒
C) La leishmaniose ;	☒
D) Le kyste hydatique ;	☒
E) L'amibiase.	☐

15) Les complications de l'alitement prolongé :

A) Les escarres ;	☒
B) Les raideurs des articulations ;	☐
C) La Phlébite ;	☒
D) Les infections pulmonaires ;	☒
E) La paraplégie.	☐

16) Les trois complications de la diarrhée aigues chez le nourrisson :

A) La perte de poids ;	☒
B) Les troubles hydro- électrolytiques ;	☒
C) La déshydratation ;	☒
D) Les œdèmes des membres inférieurs ;	☐
E) L'hydrocéphalie.	☐

17) Les organes hématopoïétiques sont :

A) Le foie ;	☒
B) La moelle épinière ;	☐
C) La rate ;	☒
D) La moelle osseuse ;	☒
E) Le rein.	☒

18) L'insuline est sécrétée par :

A) Le foie ;	☐
B) La rate ;	☐
C) Le pancréas ;	☒
D) La thyroïde ;	☐
E) L'estomac.	☐

19) Les précautions à prendre avant d'administrer un médicament à un patient sont :

A) Vérifier la prescription médicale ;	☒
B) Vérifier la date de péremption ;	☒
C) Vérifier la voie d'administration ;	☒
D) Vérifier la dose prescrite ;	☒
E) Vérifier la date de fabrication.	☐

20) Une infection nosocomiale peut se déclarer chez le malade hospitalisé :

A) Au moment de l'hospitalisation ;	☐
B) 24 heures après son hospitalisation ;	☐
C) 48 heures après son hospitalisation ;	☒
D) 48 heures après sa sortie de l'hôpital ;	☐
E) 48 heures avant son hospitalisation.	☐

21) Les conseils à donner à la mère d'un nourrisson fébrile sont :

A) Donner à boire au nourrisson en quantité abondante ;	☒
B) Dévêtir le nourrisson ;	☒
C) Lui administrer un bain d'eau froide ;	☐
D) Le réchauffer avec des couvertures en cas de frissons ;	☐
E) Apprendre à chiffrer la température à l'aide d'un thermomètre.	☒

22) Parmi les maladies infectieuses à déclaration obligatoire, vous retenez :

A) La gale ;	☐
B) La tuberculose ;	☒
C) La méningite bactérienne ;	☒
D) La paralysie flasque aigue ;	☐
E) L'infection à VIH.	☒

23) Le rôle de l'infirmier devant une fracture ouverte de la jambe qui saigne consiste à :

A) Désinfecter la plaie ;	☒
B) Faire un pansement compressif ;	☐
C) Immobiliser le membre ;	☒
D) Suturer la plaie ;	☐
E) Administrer le sérum antitétanique sur prescription médicale.	☒

24) Les signes annonciateurs de la bilharziose sont :

A) Un méléna ;	☐
B) Une hématémèse ;	☐
C) Une hématurie ;	☒
D) Un épistaxis ;	☐
E) Une hémoptysie.	☐

25) Les signes cliniques de la typhoïde sont :

A) Une fièvre prolongée ;	☒
B) Des céphalées, vertiges et asthénie ;	☒
C) Des épistaxis ;	☒
D) Une ascite ;	☐
E) Une dissociation du pouls avec la température.	☒

26) Les signes cliniques d'une phlébite de la jambe sont :

A) Une douleur du mollet ;	☒
B) Un œdème de jambe ;	☒
C) Une augmentation de la chaleur locale ;	☒
D) Une cyanose et une dilatation des veines superficielles ;	☒
E) Une hypertension artérielle.	☐

27) Les missions d'un hôpital universitaire sont :

A) Les soins ;	☒
B) La recherche ;	☒
C) La formation ;	☒
D) La restauration ;	☒
E) L'hôtellerie.	☒

28) Les causes de convulsions sans fièvre de l'enfant sont :

A) L'hypoglycémie.	☒
B) L'hypocalcémie.	☒
C) La tumeur cérébrale.	☒
D) Le traumatisme crânien.	☒
E) L'otite.	☒

29) Les éléments à apprécier en urgence par l'infirmier chez un patient qui a une contusion thoracique sont :

A) L'état hémodynamique ;	☒
B) L'état de la respiration ;	☒
C) La survenue d'une hémoptysie ;	☒
D) La présence d'un emphysème sous- cutané ;	☐
E) La survenue d'une hématurie.	☐

30) Le moyen à utiliser pour une stérilisation correcte des compresses en milieu hospitalier est :

A) Le formol ;	☐
B) L'autoclave ;	☒
C) Le poupinel ;	☐
D) Le fer à repasser ;	☐
E) Le four.	☐

31) Parmi ces valeurs biologiques, quelles sont celles qui sont normales chez l'adulte :

A) Un taux d'hémoglobine à 13g/dl ;	☒
B) Des globules blancs à 15.000 / mm^3 ;	☐
C) Des plaquettes à 600.000 / mm^3 ;	☐
D) Un taux d'urée à 0,45 g/l ;	☒
E) Une glycémie à 0,90 g/litre.	☒

32) Les gestes à faire avant de pratiquer un soin aseptique sont :

A) **Le lavage des mains à l'eau et au savon ;**	☒
B) Le port de gants propres ;	☐
C) La désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique ;	☐
D) La désinfection des mains à l'alcool ;	☐
E) **Le port des gants stériles.**	☒

33) La préparation d'un malade pour une intervention chirurgicale en traumatologie comporte :

A) **La vérification du dossier du patient ;**	☒
B) **La préparation du champ opératoire ;**	☒
C) **La préparation psychologique du patient ;**	☒
D) L'administration d'un laxatif au patient ;	☐
E) **La prémédication du patient selon la prescription médicale.**	☒

34) Le centre hospitalier Ibn Rochd est :

A) **Un hôpital autonome ;**	☒
B) **Un hôpital universitaire ;**	☒
C) Un établissement public ;	☐
D) Un hôpital en régie ;	☐
E) Un hôpital SEGMA.	☐

35) La vaccination contre la tuberculose par le BCG selon le calendrier vaccinal national se fait :

A) Deux mois après la naissance ;	☐
B) A l'âge de trois mois ;	☐
C) **A la naissance ;**	☒
D) A six mois ;	☐
E) A 12 mois.	☐

36) La vaccination contre le tétanos chez le nourrisson selon le calendrier vaccinal national se fait à l'âge suivant :

A) 6 semaines ;	☐
B) 14 semaines ;	☐
C) 8 semaines ;	☒
D) A la naissance ;	☐
E) 10 semaines.	☐

37) Devant un cas de brûlure de 3ième degré aux urgences, l'infirmier doit :

A) Nettoyer avec du sérum physiologique ;	☒
B) Prendre une voix veineuse ;	☐
C) Apprécier l'état hémodynamique du patient ;	☒
D) Appliquer les compresses bitadinés ;	☐
E) Administrer le sérum antitétanique.	☒

38) Les complications des angines à répétition mal traitées sont :

A) L'arthrite septique ;	☐
B) Le rhumatisme articulaire aigu ;	☒
C) La glomérulonéphrite aigue ;	☒
D) Les complications cardiaques ;	☐
E) La polyarthrite rhumatoïde.	☒

39) Les éléments à surveiller les 48 premières heures chez un malade opéré d'une occlusion intestinale sont :

A) Les constantes : température, tension artérielle ;	☒
B) La permutabilité des drains ;	☒
C) Les entrées et sorties liquidiens ;	☒
D) L'émission des gaz ;	☒
E) La survenue des escarres.	☐

40) La manifestation clinique la plus grave du rhumatisme articulaire aigu est :

A) L'atteinte articulaire ;	☐
B) L'atteinte rénale ;	☐
C) L'atteinte cardiaque ;	☒
D) L'atteinte pulmonaire ;	☐
E) L'atteinte cérébrale.	☐

41) Les facteurs favorisants la survenue de la tuberculose pulmonaire sont :

A) La promiscuité et l'habitat insalubre ;	☒
B) L'absence de vaccination par le BCG ;	☒
C) Le terrain allergique ;	☐
D) Le mauvais état nutritionnel ;	☒
E) Le bas niveau socio-économique.	☒

42) Parmi ces maladies, celles qui sont immunisantes sont :

A) La rougeole ;	☒
B) Le choléra ;	☐
C) La rubéole ;	☒
D) La scarlatine ;	☒
E) La typhoïde.	☐

43) Le matériel nécessaire pour réaliser un sondage vésical à demeure est :

A) Un désinfectant et lubrifiant ;	☒
B) Des gants propre ;	☐
C) Une sonde stérile ;	☒
D) Une poche à urine propre ;	☐
E) Un champs stérile.	☒

44) Les signes cliniques d'un œdème aigu du poumon sont :

A) La dyspnée ;	☒
B) La cyanose ;	☒
C) La toux avec expectorations mousseuses ;	☒
D) La fièvre ;	☐
E) L'hémoptysie.	☒

45) Devant une morsure par un chien errant, l'infirmier doit :

A) Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique ;	☒
B) Suturer la plaie ;	☐
C) Faire un pansement ;	☐
D) Administrer le sérum antitétanique ;	☒
E) Adresser le patient dans un centre spécialisé pour recevoir un vaccin antirabique.	☒

46) Les conseils hygiéniques à donner aux parents d'un enfant porteur d'une gale sont :

A) Changement de vêtement à chaque application de traitement ;	☒
B) Désinfection des vêtements et de la literie avec un antiparasitaire ;	☒
C) Ne pas échanger les vêtements entre frères et sœurs ;	☒
D) Prendre une douche avant chaque application de traitement ;	☒
E) Ne pas utiliser les mêmes ustensiles que le reste de la famille.	☒

47) Les actions infirmières à entreprendre pour prévenir les escarres chez un patient alité sont :

A) Les soins préventifs des escarres ;	☒
B) Les changements de position une fois par jour ;	☐
C) La mise en place d'un matelas alternating ;	☒
D) La surveillance quotidienne des Zones d'appui ;	☒
E) Les soins préventifs des escarres.	☒

48) Parmi les signes évocateurs d'incidents et accidents transfusionnels vous retenez :

A) Les frissons ;	☒
B) Les douleurs lombaires ;	☒
C) L'hyperthermie ;	☒
D) L'hématurie ;	☒
E) L'état de choc.	☒

49) Les étiologies des ictères chez l'adulte :

A) L'ictère par hémolyse ;	☒
B) Les hépatites virales ;	☒
C) L'anémie ;	☐
D) L'ictère par rétention ;	☐
E) L'ictère post transfusionnel.	☒

50) Les attributions du service des soins infirmiers sont :

A) La planification et l'utilisation du personnel infirmier ;	☒
B) La formation continue ;	☒
C) La supervision et l'évaluation des soins ;	☒
D) La supervision de l'hygiène hospitalière ;	☒
E) La gestion des produits pharmaceutiques.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس- مراكش-

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

(دورة 2008)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les complications aigues du diabète sont :

A) Le coma acidocétosique ;	☐
B) Le coma hypoglycémique ;	☐
C) L'obésité ;	☐
D) L'acidose lactique ;	☐
E) Le coma hyperosmolaire.	☐

2) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) Après la toilette des organes génitaux externes ;	☐
C) En recueillant les urines du premier jet ;	☐
D) En recueillant les urines du milieu du jet ;	☐
E) Après avoir éliminé le premier jet contaminant.	☐

3) Au cours d'un sondage vésical, l'infirmier(e) doit savoir que les plus grandes précautions d'asepsie sont indispensables, car la vessie, souvent distendue, s'infecte facilement. Parmi les indications du sondage, on note :

A) Rétention d'urines post opératoire ;	☐
B) Affections de la moelle ;	☐
C) Avant une intervention sur le petit bassin ;	☐
D) Rupture de l'urètre ;	☐
E) Urétrite.	☐

4) La cause la plus fréquente de la pleurésie est :

A) La tuberculose ;	☐
B) Le cancer des bronches ;	☐
C) Le pneumocoque ;	☐
D) La virose ;	☐
E) Le staphylocoque.	☐

5) En post opératoire, la prévention des complications de l'immobilisation se base sur un certain nombre de gestes que l'infirmier ne doit en aucun cas oublier, ces gestes sont :

A) Premier levé précoce ;	☐
B) Pansement avec respect de l'asepsie ;	☐
C) Administration d'antibiotiques à heure fixe ;	☐
D) Administration d'anticoagulants si prescrits ;	☐
E) Mobilisation fréquente des membres inférieurs avec surveillance des mollets.	☐

6) Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : un malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse. De quel accident transfusionnel s'agit -il :

A) Un accident de surcharge ;	☐
B) Un accident de contamination ;	☐
C) Un accident d'incompatibilité sanguine ;	☐
D) Un accident de choc opératoire ;	☐
E) Un accident d'hémolyse.	☐

7) Les maladies à transport hydriques sont :

A) Le choléra ;	☐
B) La fièvre typhoïde ;	☐
C) Le paludisme ;	☐
D) Les hépatites virales A.	☐

8) La période d'état de la méningite cérébro-spinale est caractérisée par :

A) Un syndrome méningé avec céphalées et raideur de la nuque ;	☐
B) Un syndrome infectieux avec fièvre entre 39-40°C ;	☐
C) Un syndrome abdominal.	☐

9) Actuellement, les principales portes d'entrée du Tétanos sont :

A) Le post-partum ;	☐
B) Ombilicale ;	☐
C) Chirurgical.	☐

10) Le(s) moyen(s) préventif(s) des maladies Transmissibles est (sont) :

A) Les mesures d'hygiènes rigoureuses ;	☐
B) L'isolement et le traitement des malades infectés ;	☐
C) La vaccination contre ces maladies.	☐

11) Le traitement d'urgence d'une brûlure consiste à :

A) Désinfecter la brûlure avec un antiseptique ;	☐
B) Mettre un pansement gras ;	☐
C) Refroidir la brûlure avec des glaçons + pommade ;	☐
D) Refroidir la brûlure avec de l'eau du robinet + pommade.	☐

12) L'ostéomyélite aigue est une affection qui touche :

A) La diaphyse d'un os chez l'enfant ;	☐
B) La métaphyse d'un os chez l'adulte ;	☐
C) La métaphyse d'un os chez l'enfant ;	☐
D) La diaphyse d'un os chez l'adulte.	☐

13) Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de :

A) Douleurs abdominales, vomissement et fièvre ;	☐
B) Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre ;	☐
C) Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz ;	☐
D) Défense abdominale, vomissement et fièvre.	☐

14) L'homme développe le kyste hydatique :

A) Par la consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) Par la respiration ;	☐
C) Par l'ingestion de produits contaminés par l œufs de parasite existant dans les déchets du chien ;	☐
D) Par la consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite.	☐

15) Le syndrome do Volkmann est dû à :

A) Une lésion nerveuse ;	☐
B) Une lésion veineuse ;	☐
C) Une lésion artérielle ;	☐
D) Une lésion tendineuse.	☐

16) Le choc septique est dû à :

A) Une hémorragie ;	☐
B) Une insuffisance circulatoire d'origine infectieuse ;	☐
C) Un choc vagal ;	☐
D) Une diarrhée grave.	☐

17) L'infection est définie par :

A) L'invasion d'un ou plusieurs tissus par un micro-organisme avec réaction inflammatoire avec ou sans symptômes ;	☐
B) L'invasion d'un ou plusieurs tissus par un micro-organisme avec réaction inflammatoire et symptômes ;	☐
C) La présence d'un agent pathogène dans les tissus ;	☐
D) L'aptitude d'un germes à se développer chez l'hôte et y secréter des toxines.	☐

18) Le réservoir des micro-organismes est :

A) Le véhicule de germes ;	☐
B) L'homme ;	☐
C) L'environnement ;	☐
D) L'agent causal ;	☐
E) L'animal.	☐

19) La prévention primaire sert à :

A) Réduire l'apparition de nouveau cas d'une maladie ;	☐
B) Réduire la durée d'une maladie ;	☐
C) Réduire la prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) Diminuer l'incidence d'une maladie.	☐

20) Une augmentation soudaine et inhabituelle de la fréquence d'une maladie est appelée :

A) Une épidémie ;	☐
B) Une pandémie ;	☐
C) Une endémie ;	☐
D) Sporadique.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس- مراكش-

الإطار: الممرضين الإختصاص : ممرض متعدد التخصصات

(دورة 2008)

Correction proposée :

1) Les complications aigues du diabète sont :

A) **Le coma acidocétosique ;**	☒
B) **Le coma hypoglycémique ;**	☒
C) L'obésité ;	☐
D) **L'acidose lactique ;**	☒
E) **Le coma hyperosmolaire.**	☒

2) L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A) Avant la toilette des organes génitaux externes ;	☐
B) **Après la toilette des organes génitaux externes ;**	☒
C) En recueillant les urines du premier jet ;	☐
D) **En recueillant les urines du milieu du jet ;**	☒
E) **Après avoir éliminé le premier jet contaminant.**	☒

3) Au cours d'un sondage vésical, l'infirmier(e) doit savoir que les plus grandes précautions d'asepsie sont indispensables, car la vessie, souvent distendue, s'infecte facilement. Parmi les indications du sondage, on note :

A) **Rétention d'urines post opératoire ;**	☒
B) Affections de la moelle ;	☐
C) **Avant une intervention sur le petit bassin ;**	☒
D) Rupture de l'urètre ;	☐
E) Urétrite.	☐

4) La cause la plus fréquente de la pleurésie est :

A) **La tuberculose ;**	☒
B) Le cancer des bronches ;	☐
C) Le pneumocoque ;	☐
D) La virose ;	☐
E) Le staphylocoque.	☐

5) En post opératoire, la prévention des complications de l'immobilisation se base sur un certain nombre de gestes que l'infirmier ne doit en aucun cas oublier, ces gestes sont :

A) **Premier levé précoce ;**	☒
B) Pansement avec respect de l'asepsie ;	☐
C) Administration d'antibiotiques à heure fixe ;	☐
D) **Administration d'anticoagulants si prescrits ;**	☒
E) **Mobilisation fréquente des membres inférieurs avec surveillance des mollets.**	☒

6) Au cours d'une transfusion sanguine, le patient pourrait présenter les signes suivants : un malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, diarrhée profuse. De quel accident transfusionnel s'agit -il :

A) Un accident de surcharge ;	☐
B) **Un accident de contamination ;**	☒
C) Un accident d'incompatibilité sanguine ;	☐
D) Un accident de choc opératoire ;	☐
E) Un accident d'hémolyse.	☐

7) Les maladies à transport hydriques sont :

A) **Le choléra ;**	☒
B) **La fièvre typhoïde ;**	☒
C) Le paludisme ;	☐
D) **Les hépatites virales A.**	☒

8) La période d'état de la méningite cérébro-spinale est caractérisée par :

A) Un syndrome méningé avec céphalées et raideur de la nuque ;	☒
B) Un syndrome infectieux avec fièvre entre 39-40°C ;	☒
C) Un syndrome abdominal.	☐

9) Actuellement, les principales portes d'entrée du Tétanos sont :

A) Le post-partum ;	☒
B) Ombilicale ;	☒
C) Chirurgical.	☐

10) Le(s) moyen(s) préventif(s) des maladies Transmissibles est (sont) :

A) Les mesures d'hygiènes rigoureuses ;	☒
B) L'isolement et le traitement des malades infectés ;	☒
C) La vaccination contre ces maladies.	☒

11) Le traitement d'urgence d'une brûlure consiste à :

A) Désinfecter la brûlure avec un antiseptique ;	☐
B) Mettre un pansement gras ;	☐
C) Refroidir la brûlure avec des glaçons + pommade ;	☐
D) Refroidir la brûlure avec de l'eau du robinet + pommade.	☒

12) L'ostéomyélite aigue est une affection qui touche :

A) La diaphyse d'un os chez l'enfant ;	☐
B) La métaphyse d'un os chez l'adulte ;	☐
C) La métaphyse d'un os chez l'enfant ;	☒
D) La diaphyse d'un os chez l'adulte.	☐

13) Le syndrome occlusif est caractérisé par l'association de :

A) Douleurs abdominales, vomissement et fièvre ;	☐
B) Douleurs abdominales, contractions abdominales, fièvre ;	☐
C) Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz ;	☒
D) Défense abdominale, vomissement et fièvre.	☐

14) L'homme développe le kyste hydatique :

A) Par la consommation de la viande mal cuite ;	☐
B) Par la respiration ;	☐
C) **Par l'ingestion de produits contaminés par l œufs de parasite existant dans les déchets du chien ;**	☒
D) Par la consommation des viscères du mouton contaminés par le parasite.	☐

15) Le syndrome do Volkmann est dû à :

A) **Une lésion nerveuse ;**	☒
B) Une lésion veineuse ;	☐
C) **Une lésion artérielle ;**	☒
D) Une lésion tendineuse.	☐

16) Le choc septique est dû à :

A) Une hémorragie ;	☐
B) **Une insuffisance circulatoire d'origine infectieuse ;**	☒
C) Un choc vagal ;	☐
D) Une diarrhée grave.	☐

17) L'infection est définie par :

A) **L'invasion d'un ou plusieurs tissus par un micro-organisme avec réaction inflammatoire avec ou sans symptômes ;**	☒
B) L'invasion d'un ou plusieurs tissus par un micro-organisme avec réaction inflammatoire et symptômes ;	☐
C) La présence d'un agent pathogène dans les tissus ;	☐
D) L'aptitude d'un germes à se développer chez l'hôte et y secréter des toxines.	☐

18) Le réservoir des micro-organismes est :

A) Le véhicule de germes ;	☐
B) **L'homme ;**	☒
C) **L'environnement ;**	☒
D) L'agent causal ;	☐
E) **L'animal.**	☒

19) La prévention primaire sert à :

A) **Réduire l'apparition de nouveau cas d'une maladie ;**	☒
B) Réduire la durée d'une maladie ;	☐
C) Réduire la prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) **Diminuer l'incidence d'une maladie.**	☒

20) Une augmentation soudaine et inhabituelle de la fréquence d'une maladie est appelée :

A) **Une épidémie ;**	☒
B) Une pandémie ;	☐
C) Une endémie ;	☐
D) Sporadique.	☐

JNAINI **HAMZA**

Orthoptiste au CHP HASSAN II SETTAT

+2126 66 67 19 67

hamza.jnaini@gmail.com

JE **PRÉPARE**

JE RÉUSSIS MON CONCOURS !

LA CONNAISSANCE N'A DE SENS QUE PARTAGÉE.